

Додаток 4  
до Порядку здійснення фармаконагляду  
(підпункт 4 пункту 2 розділу III)

**СТРОКИ РОЗВИТКУ**

**клінічних проявів побічних реакцій при застосуванні вакцин, туберкуліну за кодами**

Вакцини, туберкулін	Клінічні прояви побічних реакцій при застосуванні вакцин, туберкуліну за кодами та строки їх розвитку																					
	1-2	3.1-4.3	5	6-8	9	10.1-10.4	11	12.1-12.2	13	14	15	16.1-16.2	17	18.1-18.2	19	20	21*	22	23	24	25	26.1-26.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
АКДП, АДП, АДП-М***	<72 год.	<48 год., до 7 діб**	<7 діб	<48 год.	-	<72 год.	-	-	-	-	<14 діб	<48 год.	<72 год.	-	<48 год.	7-14 доба	2-3 доба	-	-	-	-	-
АаКДП, комбіновані вакцини на основі АаКДП***	<48 год.	<72 год., до 7 діб**	<7 діб	<48 год.	-	<72 год.	срн	срн	-	срн	<14 діб	<48 год.	<48 год.	-	<48 год.	7-14 доба	2-3 доба	-	-	-	-	-
Вакцини для профілакти- ки кору, паротиту, краснухи***	4-10 доба	24 год., до 7 діб**	4- 10 доб а	4-10 доба	7-10 доба	срн	6-15 доба	4-10 доба	7-10 доба	12- 25 доба	<14 діб	<48 год.	<72 год.	-	6-12 доба	-	-	-	-	-	-	-
БЦЖ***	срн	ср	-	срн	-	-	-	-	-	-	-	<48 год.	срн	-	-	-	срн	1,5-6 міс.	1,5-6 міс.	1-12 міс.	5-12 міс.	1-24 міс.
ОПВ***	срн	-	-	<72 год.	-	<72 год.	-	срн	-	-	-	-	срн	4-30 доба	-	-	срн	-	-	-	-	-

## Продовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ПВ***	<48 год.	<48 год., до 7 діб**	срн	<48 год.	-	срн	-	<48 год.	-	-	<14 діб	<48 год.	<72 год.	-	срн	-	срн	-	-	-	-	-
Вакцини для профілактики гепатиту В***	<72 год.	<48 год., до 7 діб**	срн	<72 год.	-	<5 діб	<72 год.	<72 год.	-	-	<14 діб	<48 год.	<72 год.	-	<48 год.	<72 год.	срн	-	-	-	-	-
Полісахаридні вакцини (НіВ)***	<72 год.	<48 год., до 7 діб**	-	<48 год.	<72 год.	<72 год.	-	<72 год.	-	-	<14 діб	<48 год.	<72 год.	-	<48 год.	срн	2-3 доба	-	-	-	-	-
Туберкулін***	<48 год.	Біль у місці ін'єкції або дискомфорт, подразнення або свербіж <72 год.	-	Головний біль <48 год.	-	-	-	-	-	-	-	-	срн	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* У глибоко недоношених дітей, що народилися на 28 тижні вагітності або раніше.

\*\* Тільки для пунктів 4.1- 4.3.

\*\*\*Перелік не є вичерпним, необхідно користуватися інструкцією для застосування відповідних вакцин та алергенів туберкульозних, зареєстрованих в Україні.

Примітка. ср – специфічна реакція на введення вакцини БЦЖ; срн – строки розвитку невідомі.