

 АТ «Галичфарм»	РЕЗЮМЕ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ	Номер версії: 0.1
	МУКАЛТИН® ФОРТЕ, таблетки жувальні по 100 мг	
	<u>АТ «Галичфарм»</u> (найменування підприємства)	Стор. 1 з 3

VI.2. ЕЛЕМЕНТИ РЕЗЮМЕ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

VI.2.1. Огляд епідеміології захворювань

Кашель при гострих та хронічних захворюваннях дихальних шляхів: бронхіти, пневмонії, бронхоектатична хвороба, бронхіальна астма, туберкульоз легень з явищами неспецифічного бронхіту.

Кашель є одним з найбільш поширеніх причин, за якими люди звертаються до лікаря. Функція кашлю - очистити дихальні шляхи і захистити легені від проникнення в них чужорідних частин. Кашель може описуватися як сухий (непродуктивний) або продуктивний, тобто з виділенням крові або мокроти (слизу). Мокрота представляє собою суміш слизу, чужорідних речовин і клітин, що виділяються легенями. При сильному натужному кашлі у людей можуть напружуватися міжреберні м'язи або реберні хрящі, викликаючи біль у грудях, особливо на вдиху, при русі або кашлі. Кашель може викликати неспокій і перешкоджати сну.

Кашель – це симптом, що може бути присутнім при багатьох нозологіях тому точно кількісно оцінити захворюваність чи поширеність не є можливим. Причиною кашлю можуть бути як інфекційні агенти (віруси, бактерії, грибки), так і неінфекційні (вади розвитку, обмінні порушення, застійна серцева недостатність). Переважна кількість випадків кашлю пов'язана з вірусною або бактеріальною інфекцією.

VI.2.2. Резюме результатів лікування

Власних клінічних досліджень заявником ЛЗ МУКАЛТИН® ФОРТЕ, таблетки жувальні по 100 мг, не проводилося. Дані про ефективність та безпеку застосування препарату ґрунтуються на тривалому ефективному застосуванні в медичній практиці діючої речовини ЛЗ – екстракту коренів алтеї лікарської.

За даними аналізу результатів лікування 599 пацієнтів 53 лікарями узагальнено досвід застосування препарату з екстракту коренів алтеї лікарської для показань "подразнення слизової оболонки ротової порожнини та глотки з супутнім сухим кашлем" у дітей до 12 років. Препарат приймали 1-6 разів на добу у всіх вікових групах. Тривалість лікування становила в середньому 7,5 днів, але варіювала від 3 днів до 2 тижнів. Ефективність оцінювалася як "дуже добре" або "добре" у понад 90% випадків у всіх вікових групах. Жодних несприятливих ефектів не було відзначено.

 АТ «Галичфарм»	РЕЗЮМЕ ПЛАНУ УПРАЛІННЯ РИЗИКАМИ	Номер версії: 0.1
	МУКАЛТИН® ФОРТЕ, таблетки жувальні по 100 мг	
	<u>АТ «Галичфарм»</u> (найменування підприємства)	Стор. 2 з 3

VI.2.3. Невідомі дані щодо ефективності лікування

Відсутні відомості щодо можливих відмінностей у результатах лікування пацієнтів залежно від статі, раси чи етнічної приналежності. Відсутні дані про несприятливий вплив препарату у період вагітності або годування груддю відсутні. Тому застосування препарату можливе, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини. Застосовується дітям з 3 років.

VI.2.4. Резюме проблем безпеки.

ВАЖЛИВІ ІДЕНТИФІКОВАНІ РИЗИКИ

Ризик	Що відомо	Запобіжні заходи
Одночасне застосування з препаратами, які пригнічують кашель	Не призначати одночасно з препаратами, що пригнічують кашель (кодеїн). Препарат можна одночасно приймати з іншими протикашльовими та відхаркувальними засобами	При відсутності ефективності або виникненні побічних реакцій слід відмінити прийом препарату і звернутися до лікаря

ВАЖЛИВІ ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ

Ризик	Що відомо
Реакції гіперчутливості	У деяких випадках можливі алергічні реакції, включаючи крапив'янку, свербіж. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

ВІДСУТНЯ ІНФОРМАЦІЯ

**РЕЗЮМЕ
ПЛАНУ УПРАЛІННЯ РИЗИКАМИ**



**МУКАЛТИН® ФОРТЕ,
таблетки жувальні по 100 мг**

Номер версії: 0.1

АТ «Галичфарм»
(найменування підприємства)

Стор. 3 з 3

Ризик	Що відомо
Застосування у період вагітності або годування груддю	Досвід застосування у період вагітності або годування груддю відсутній

VI.2.5. Резюме заходів з мінімізації ризиків дляожної проблеми безпеки

До препарату МУКАЛТИН® ФОРТЕ, таблетки жувальні по 100 мг додається інструкція для медичного застосування, що містить інформацію про застосування лікарського засобу, про ризики та рекомендації щодо їх мінімізації. Запобіжні заходи, що містяться в цьому документі, відомі як рутинні заходи з мінімізації ризиків. Лікарський засіб МУКАЛТИН® ФОРТЕ, таблетки жувальні по 100 мг не має додаткових заходів з мінімізації ризиків.

VI.2.6. План післяреєстраційного розвитку (заплановані заходи у післяреєстраційному періоді)

Лікарський засіб МУКАЛТИН® ФОРТЕ, таблетки жувальні по 100 мг в плані післяреєстраційного розвитку не запланований.

VI.2.7. Зведена таблиця змін у плані управління ризиками з часом

План управління ризиками надається вперше для перереєстрації лікарського засобу МУКАЛТИН® ФОРТЕ, таблетки жувальні по 100 мг.