

 <b>ARTERIUM</b> АТ «Галичфарм»	<b>РЕЗЮМЕ</b> <b>ПЛАНУ УПРАЛІННЯ РИЗИКАМИ</b>	Номер версії: 0.2
	<b>СТРЕПТОЦИД,</b> таблетки по 300мг	
	<u>АТ «Галичфарм»</u> (найменування підприємства)	Стор. 1 з 5

## VI.2. ЕЛЕМЕНТИ РЕЗЮМЕ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

### VI.2.1. Огляд епідеміології захворювань

Інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливими до препарату мікроорганізмами: інфекційні захворювання шкіри та слизових оболонок (рани, виразки, пролежні). Інфекції шкіри і м'яких тканин – найчастіша причина звернення пацієнтів за хірургічною допомогою: 10% усіх госпіталізацій у Великобританії. У Сполучених Штатах Америки інфекції шкіри і м'яких тканин стають причиною 330 000 госпіталізацій в рік [Trilla A., Miro JM. Identifying high-risk patients for *Staphylococcus aureus* infections: skin and soft tissue infections // J Chemother. – 1995. – №7. – P.27-33]. Найчастішим збудником таких захворювань є бактерії стафілококи (70-90%).

Основними умовами розвитку гнійно-запальних захворювань шкіри і підшкірно-жирової клітковини є: зниження місцевої опірності тканин; зниження загальної опірності та імунного захисту організму; наявність бактеріального зараження. В загальній структурі шкірних захворювань інфекції шкіри складають 17-43%. В економічно розвинутих країнах вони зустрічаються у третини пацієнтів, що страждають інфекційними захворюваннями.

*Ентероколіт* – одночасне запалення тонкої та товстої кишок. Одне з найчастіших захворювань системи травлення, яке призводить до ураження слизової оболонки та порушення функцій кишківника. Якщо причиною запалення є інфекція, то тоді ентероколіт відносять до кишкових інфекційних захворювань.

Захворювання органів травлення займають одне з провідних місць в структурі захворюваності населення, схильні до хронічного протікання із періодичними загостреннями, уражають осіб працездатного віку, знижують якість життя і наносять величезну соціально-економічну шкоду. Ентероколіт найбільш широко розповсюджений в розвинутих країнах, зокрема в Європі та Північній Америці. Частота виникнення коливається від 4 до 20 випадків на 100 тисяч населення. Найбільша кількість випадків припадає на вік 20–40 років [Курилович С.А., Решетников О.В. Эпидемиологические аспекты основных заболеваний гастроэнтерологического профиля // Консилиум. – 1999. – №4. – С.8-13].

*Пієліт* – запальний процес в оболонці ниркових мисок, частіше виявляється у дівчаток дошкільного віку. Найчастіше пієліт виникає на тлі запалення сечовипускального каналу або сечового міхура. Запальний процес часто поширюється з оболонки на тканину нирки з розвитком пієлонефриту. Пієлонефрит належить до

 АТ «Галичфарм»	<b>РЕЗЮМЕ</b> <b>ПЛАНУ УПРАЛІННЯ РИЗИКАМИ</b>	Номер версії: 0.2
	<b>СТРЕПТОЦІД,</b> таблетки по 300мг	
	АТ «Галичфарм» (найменування підприємства)	Стор. 2 з 5

досить частих захворювань. В дитячому віці його частота, за даними різних авторів коливається в межах 7,3-27,5 випадків на 1000 осіб, у дорослих дещо менше – 0,82-1,46 на 1000. Найбільший ризик виникнення післонефриту мають дівчата, вагітні, породіллі, особи похилого віку.

*Цистит* – запалення слизової оболонки сечового міхура. Розповсюдженість гострого циститу в Україні становить 314 на 100 тис. населення, хронічного циститу – 135 на 100 тис. населення. Більшість хворих – жінки молодого віку та жінки у період клімаксу. У середньому кожен випадок гострого циститу у жінок пов’язаний з наявністю симптомів частого і болісного сечовипускання, обмеженням та неможливістю відвідувати заняття або роботу [Пасечніков С.П. Цистит: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування // Український медичний часопис. – 2016. – Режим доступу: <https://www.umj.com.ua/?p=99100>].

### VI.2.2. Резюме результатів лікування

Власних клінічних досліджень заявником лікарського засобу СТРЕПТОЦІД, таблетки по 300мг, не проводилося. Дані про ефективність та безпеку застосування препарату ґрунтуються на тривалому ефективному застосуванні в медичній практиці діючої речовини – сульфаніламіду, у складі різних лікарських засобів.

Ефективність застосування сульфаніламіду була підтверджена у порівняльному клінічному дослідженні за участю 270 пацієнтів для лікування інфекції шкіри. В кінці першого дня після початку лікування вогнище інфекційного ураження припинило розширення у 59% хворих, у яких застосовували ультрафіолетове випромінювання, в той час як у пацієнтів у яких застосовували сульфаніламід - цей показник склав 96,9%. Підвищення температури тіла тривало протягом більше трьох днів тільки у 9,6% пацієнтів, які отримували сульфаніламід. У пацієнтів, у яких застосовували ультрафіолетове випромінювання підвищення температури тіла спостерігалося у 40% [Snodgrass W.R., Anderson T. / Sulphanilamide in the Treatment of Erysipelas // Br Med J. – 1937, Dec 11. - №2(4014). – Р. 1156-1159.].

### VI.2.3. Невідомі дані щодо ефективності лікування

Відсутні відомості щодо можливих відмінностей у результатах лікування пацієнтів залежно від віку та статі. Не існує доказів того, що результати застосування відрізнятимуться у пацієнтів іншої расової чи етнічної приналежності. Препарат

застосовується лише дорослим та дітям від 3 років. Досвід застосування препарату в період вагітності або годування груддю недостатній.

#### VI.2.4. Резюме проблем безпеки

#### ВАЖЛИВІ ІДЕНТИФІКОВАНІ РИЗИКИ

Ризик	Що відомо	Запобіжні заходи
Реакції підвищеної чутливості	Можливі побічні реакції з боку імунної системи в тому числі тяжкі реакції підвищеної чутливості, що загрожують життю	При прояві таких побічних реакцій необхідно відмінити застосування препарату і звернутися до лікаря
Порушення системи крові та лімфатичної системи	Стрептоцид може викликати побічні реакції з боку системи крові та лімфатичної системи (зменшення кількості клітин крові: еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів).	При прояві таких побічних реакцій необхідно відмінити застосування препарату і звернутися до лікаря
Негативний вплив на нирки	При застосуванні препарату можливі побічні реакції негативного впливу на нирки (запалення, порушення функції нирок)	При прояві таких побічних реакцій необхідно відмінити застосування препарату і звернутися до лікаря
Порушення функції печінки та жовчовивідних шляхів	Стрептоцид може викликати побічні реакції у вигляді порушення функції печінки та жовчовивідних шляхів з (запалення, жовтяниця, застій жовчі).	При прояві таких побічних реакцій необхідно відмінити застосування препарату і звернутися до лікаря
Порушення з боку нервової системи	Можливе виникнення порушень з боку нервової системи при прийомі лікарського засобу Стрептоцид, таблетки, в тому числі: головний біль, порушення координації рухів, судоми, запаморочення, сонливість/безсоння, почуття втоми, депресію.	При прояві таких побічних реакцій необхідно відмінити застосування препарату і звернутися до лікаря
Порушення з боку	При застосування препарату можливі	При прояві таких побічних

травного тракту (запалення кишківника)	побічні реакції з боку травного тракту (в тому числі запалення кишківника)	реакцій необхідно відмінити застосування препарату і звернутися до лікаря
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій	<p>При одночасному застосуванні Стрептоциду з іншими лікарськими засобами можливе виникнення наступних взаємодій:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з протизапальними препаратами</li> <li>- антидіабетичними препаратами</li> <li>- препаратами, що впливають на згортання крові;</li> <li>- з антибіотиками та іншими протимікробними засобами</li> <li>- з протизаплідними засобами контрацептивами - знижується дія цих препаратів;</li> <li>- з місцевими знеболювальними препаратами, що містять (наприклад новокаїн), - зменшується ефективність стрептоциду.</li> </ul>	<p>Обмежити застосування Стрептоциду із зазначеними лікарськими засобами.</p> <p>При прояві таких побічних реакцій необхідно відмінити застосування препарату і звернутися до лікаря</p>

## ВАЖЛИВІ ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ

Ризик	Що відомо
Неналежне виконання пацієнтом вказівок лікаря щодо режиму дозування та терміну застосування	<p>Необхідний повноцінний курс терапії для запобігання повторної інфекції і розвитку стійких форм мікроорганізмів.</p> <p>Під час лікування необхідно дотримуватися режиму дозування, застосовувати рекомендовану дозу з інтервалом у 24 години, не пропускати прийому препарату. У випадку пропуску дози не подвоювати наступну дозу.</p>

## ВІДСУТНЯ ІНФОРМАЦІЯ

Ризик	Що відомо
Недостатній досвід застосування Стрептоциду	Слід уникати призначення препарату пацієнтам віком від 65 років у зв'язку з підвищеним ризиком виникнення

 АТ «Галичфарм»	<b>РЕЗЮМЕ</b> <b>ПЛАНУ УПРАЛІННЯ РИЗИКАМИ</b>	Номер версії: 0.2
	<b>СТРЕПТОЦИД,</b> таблетки по 300мг	
	<u>АТ «Галичфарм»</u> (найменування підприємства)	Стор. 5 з 5

пацієнтами віком від 65 років	тяжких побічних реакцій.
-------------------------------	--------------------------

#### **VI.2.5. Резюме заходів з мінімізації ризиків дляожної проблеми безпеки**

До препарату СТРЕПТОЦИД, таблетки по 300мг додається інструкція для медичного застосування, що містить інформацію про застосування лікарського засобу, про ризики та рекомендації щодо їх мінімізації. Запобіжні заходи, що містяться в цьому документі, відомі як рутинні заходи з мінімізації ризиків.

Лікарський засіб СТРЕПТОЦИД, таблетки по 300мг не має додаткових заходів з мінімізації ризиків.

#### **VI.2.6. План післяреєстраційного розвитку (заплановані заходи у післяреєстраційному періоді)**

Лікарський засіб СТРЕПТОЦИД, таблетки по 300мг в плані післяреєстраційного розвитку не заплановані.

#### **VI.2.7. Зведенна таблиця змін у плані управління ризиками з часом**

План управління ризиками надається вперше для перереєстрації ЛЗ СТРЕПТОЦИД, таблетки по 300мг.