


ПРОБЛЕМИ КОРИСТІ-РІЗИКУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА ГОДУВАННЯ ГРУДДЮ




РЕАЛЬНІСТЬ:

У країнах з високим рівнем доходу 90% жінок застосовують лікарські засоби під час вагітності та годування груддю.

25% з них — для лікування хронічних захворювань: астми, депресії, діабету, епілепсії, ВІЛ/СНІДу, гіпертонії і т.д.

Інші причини застосування препаратів під час вагітності включають необхідність лікувати інфекції або ускладнення вагітності. Крім того, багато жінок застосовують ліки, поки не знають що вагітні.

ПРОБЛЕМИ КОРИСТІ-РІЗИКУ



ОПТИМАЛЬНЕ СУКУПНЕ РІШЕННЯ

враховуючи життєвий цикл лікарського засобу

НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗРОБКИ:

Виправдане виключення вагітних та годуючих груддю через недостатність інформації про лікарський засіб.

НА ПІЗНІХ ЕТАПАХ РОЗРОБКИ:

Враховувати дану групу пацієнтів.

Під час вагітності та годування груддю жінки регулярно спілкуються з медпрацівниками.

Ці дані необхідно збирати, аналізувати та використовувати в якості доказової бази для прийняття рішення.

ВАЖЛИВО:

Рішення щодо лікування вагітних

та жінок, які годують груддю,

варто приймати, враховуючи данні, які надають:

пацієнт/клініцист/дослідник/розробник/регулятор.

ВАЖЛИВО:

В лікуванні та профілактиці COVID-19 під час вагітності та годування груддю, використовують підхід оптимально-сукупного рішення



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

В даний час ЕМА розробляє розділ про належну практику фармаконагляду (GVP) спеціально присвячений моніторингу безпеки лікарських засобів у вагітних та жінок, що годують груддю!