



ПАРАМОЛ

Калькулятор доз (35-50 кг)

розчин для інфузій, 1000 мг/100 мл

100 мл розчину (1 контейнер) містить парацетамолу 1000 мг.

Спосіб застосування та дози¹.

Парамол, розчин для інфузій 1000 мг/100 мл, застосовують внутрішньовенно.

Дозування залежить від маси тіла пацієнта.

Дозування дорослим, підліткам та дітям з масою тіла більше 33 кг

УВАГА! З метою уникнення помилок дозування, пов'язаного з невідповідністю між міліграмами (мг) та мілілітрами (мл), необхідно ретельно розраховувати дози при призначенні та введенні препарату ПАРАМОЛ розчин для інфузій. Така невідповідність може спричинити випадкове передозування та навіть летальний наслідок. При виписуванні рецептів слід вказувати загальну дозу і в мг, і в мл.

В таблиці нижче наведений калькулятор доз від 35 кг до 50 кг з кроком 1 кг.

Калькулятор дозування для визначення правильної дози та об'єму для вибраної маси тіла пацієнта.

Маса тіла	Доза, що вводиться до 4 разів на добу		Максимальна доза протягом 24 год		Розмір контейнера	Маса тіла	Доза, що вводиться до 4 разів на добу		Максимальна доза протягом 24 год		Розмір контейнера
35 кг	525 мг	52,5 мл	2100 мг	210 мл	100 мл	36 кг	540 мг	54,0 мл	2160 мг	216 мл	100 мл
37 кг	555 мг	55,5 мл	2220 мг	222 мл		38 кг	570 мг	57,0 мл	2280 мг	228 мл	
39 кг	585 мг	58,5 мл	2340 мг	234 мл		40 кг	600 мг	60,0 мл	2400 мг	240 мл	
41 кг	615 мг	61,5 мл	2460 мг	246 мл		42 кг	630 мг	63,0 мл	2520 мг	252 мл	
43 кг	645 мг	64,5 мл	2580 мг	258 мл		44 кг	660 мг	66,0 мл	2640 мг	264 мл	
45 кг	675 мг	67,5 мл	2700 мг	270 мл		46 кг	690 мг	69,0 мл	2760 мг	276 мл	
47 кг	705 мг	70,5 мл	2820 мг	282 мл		48 кг	720 мг	72,0 мл	2880 мг	288 мл	
49 кг	735 мг	73,5 мл	2940 мг	294 мл		50 кг	750 мг	75 мл	3000 мг	300 мл	

Розчин парацетамолу вводять шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 15 хвилин.

Засіб слід застосувати негайно після відкриття упаковки.

Будь-яку кількість невикористаного розчину для інфузій слід знищити.

Не використовувати, якщо герметичність порушена або вміст контейнера непрозорий.

Детальна інформація також наведена в поточній версії інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Також з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу можна ознайомитися за посиланням <https://www.drlz.com.ua>Детальна інформація також наведена в поточній версії інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Крім того, на сайті <https://www.dec.gov.ua> розміщено інформаційний лист до спеціалістів системи охорони здоров'я щодо ризику випадкового передозування у новонароджених, немовлят та дорослих зі зниженою масою тіла, а також доступний калькулятор.