



ПАРАМОЛ

розчин для інфузій, 1000 мг/100 мл

Показання¹.

Короткочасне лікування больового синдрому середньої інтенсивності, особливо у післяопераційний період, та короткочасне лікування гіпертермічних реакцій, коли внутрішньовенне застосування є клінічно обґрунтованим або інші способи застосування неприйнятні.

УВАГА!

Ризик передозування лікарським засобом ПАРАМОЛ, розчин для інфузій, 10 мг/мл, особливо у дітей, внаслідок помилок при застосуванні через плутанину між міліграмами (мг) і мілілітрами (мл).

Парамол, розчин для інфузій 1000 мг/100 мл, застосовують внутрішньовенно.
Дозування залежить від маси тіла пацієнта.

Дозування дорослим, підліткам та дітям з масою тіла більше 33 кг.

Маса тіла пацієнта	Одноразова доза	Об'єм на один прийом	Максимальний об'єм препарату на один прийом відповідно до верхніх меж маси тіла для групи (мл)*	Максимальна добова доза **
$> 33 \text{ кг} \leq 50 \text{ кг}$	15 мг/кг	1,5 мл/кг	75 мл	60 мг/кг, але не більше 3 г
$> 50 \text{ кг}$, за наявності факторів ризику розвитку гепатотоксичності	1 г	100 мл	100 мл	3 г
$> 50 \text{ кг}$, при відсутності факторів ризику розвитку гепатотоксичності	1 г	100 мл	100 мл	4 г

* Пацієнти з нижчою масою тіла потребують менших об'ємів.

Мінімальний інтервал між введеннями повинен становити щонайменше 4 години. Курс лікування зазвичай не перевищує 4 інфузій протягом однієї доби.

Мінімальний інтервал між введеннями у пацієнтів з нирковою недостатністю тяжкого ступеня повинен становити щонайменше 6 годин.

** Максимальна добова доза: максимальна добова доза призначена для пацієнтів, які не отримують інші лікарські засоби, що містять парацетамол, і повинна бути відповідним чином скоригована у разі застосування таких препаратів.

Детальна інформація також наведена в поточній версії інструкції для медичного застосування лікарського засобу¹. Також з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу можна ознайомитися за посиланням <https://www.drlz.com.ua>

Детальна інформація також наведена в поточній версії інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Крім того, на сайті <https://www.dec.gov.ua> розміщено інформаційний лист до спеціалістів системи охорони здоров'я щодо ризику випадкового передозування у новонароджених, немовлят та дорослих зі зниженою масою тіла, а також доступний калькулятор.