

Жовтень 2025

КАРТКА ПАЦІЄНТА,
який застосовує лікарський засіб
ТІОКОЛХІКОЗИД, розчин для ін'єкцій, 4 мг/2 мл по 2 мл в ампулах, по 5
ампул у блістері з плівки, по 1 або 2 блістери в пачці з картону
(тіоколхікозид для системного застосування)

Ця картка пацієнта містить важливу інформацію про безпеку, яку слід знати пацієнтам та/або батькам/опікунам пацієнтів до, під час та після лікування лікарським засобом ТІОКОЛХІКОЗИД, розчин для ін'єкцій, 4 мг/2 мл по 2 мл в ампулах, по 5 ампул у блістері з плівки, по 1 або 2 блістери в пачці з картону (далі – ЛЗ ТІОКОЛХІКОЗИД) (тіоколхікозид для системного застосування).

ЛЗ ТІОКОЛХІКОЗИД (тіоколхікозид для системного застосування) є м'язовим релаксантом. Він використовується у дорослих і дітей віком від 16 років як додаткова терапія болісних м'язових контрактур у випадках гострих патологій хребта.

АТ «Лубнифарм», власник реєстраційного посвідчення вищевказаного ЛЗ, відповідно до рекомендацій Європейської медичної агенції (ЕМА) та за погодженням Державного експертного центру МОЗ України, повідомляє Вам важливу інформацію щодо безпеки застосування лікарського засобу ТІОКОЛХІКОЗИД.

ПЕРЕД ПРИЙОМОМ ЛЗ ТІОКОЛХІКОЗИД, (ТІОКОЛХІКОЗИД ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ), СЛІД ЗНАТИ НАСТУПНЕ:

Один із продуктів, що утворюється у вашому організмі під час прийому тіоколхікозиду, спричиняє пошкодження деяких клітин (аномальна кількість хромосом) у дослідженнях на тваринах та в лабораторних дослідженнях у пробірці. У людей цей тип пошкодження клітин є фактором ризику для ненародженої дитини, для чоловічої фертильності та потенційним фактором ризику розвитку раку.

При прийомі ЛЗ ТІОКОЛХІКОЗИД (тіоколхікозид для системного застосування), слідуєте вказівкам лікаря або фармацевта.

НЕ СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ ЛЗ ТІОКОЛХІКОЗИД (ТІОКОЛХІКОЗИД ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ), ЯКЩО:

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

- Ви вагітні або думаєте, що можете бути вагітними.
- Ви годуєте немовля груддю.
- Ви є жінкою з репродуктивним потенціалом та не застосовуєте ефективних методів контрацепції під час лікування лікарським засобом та протягом одного місяця після припинення лікування.
- Ви є чоловіком з репродуктивним потенціалом та не застосовуєте ефективних методів контрацепції під час лікування лікарським засобом та протягом трьох місяців після припинення лікування.

НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ РЕКОМЕНДОВАНІ ДОЗИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЛІКУВАННЯ, А САМЕ:

- 4 мг кожні 12 годин (тобто 8 мг на день) для внутрішньом'язового введення. Лікування не повинно перевищувати 5 днів поспіль.
- Представлені дані є лише коротким викладом найбільш важливої інформації щодо мінімізації ризиків, пов'язаних із застосуванням ЛЗ. Будь-ласка ознайомтесь із інструкцією для медичного застосування перед застосуванням ЛЗ ТІОКОЛХІКОЗИД (затверджений текст інструкції доступний на сайті Державного реєстру лікарських засобів України за посиланням <http://www.drlz.com.ua/>).

Зверніться до лікаря при підозрі на вагітність негайно!

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРЮВАНІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

Якщо у Вас виникли будь-які побічні реакції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не зазначених у інструкції для медичного застосування.

Ви також можете повідомити про побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>.

У разі виникнення побічних реакцій при застосуванні лікарського засобу ТІОКОЛХІКОЗИД, заявником якого є АТ «Лубнифарм» або будь-яких запитань щодо інших лікарських засобів АТ «Лубнифарм», будь ласка, звертайтеся за адресою: вул. Барвінкова, 16. м. Лубни, Полтавська область, 37500. Тел. +380503519952 цілодобово або за електронною адресою: cezik@lf.com.ua. Заповніть карту-повідомлення на офіційному вебсайті АТ «Лубнифарм» <https://lubnypharm.com>.

Повідомляючи про побічні реакції, ви допомагаєте надати більше інформації про безпеку цього лікарського засобу.

**З повагою,
Уповноважена особа,
відповідальна за фармаконагляд**



Наталія ЛАЗЕНКО