

Ризик онкологічних захворювань

РІНВОК® може потенційно збільшити ризик розвитку онкологічних захворювань, особливо раку шкіри.

Повідомте лікаря, якщо ви помітили будь-які зміни у зовнішньому вигляді ділянки шкіри або помітили новоутворення на шкірі.

Ризик перфорації шлунково-кишкового тракту

РІНВОК® може підвищити ризик перфорації шлунково-кишкового тракту, особливо якщо у Вас хвороба Крона. Відразу повідомте лікаря якщо у Вас з'явився незрозумілий чи неочікуваний біль у животі.

Показуйте цю картку усім медичним працівникам, які надають Вам медичну допомогу - наприклад, стоматологу чи лікарю швидкої допомоги.

Щоб повідомити про будь-які побічні реакції, зв'яжіться з представництвом ЕббВі Біофармасьютикалз ГмбХ в Україні:

тел.: +380 (44) 498 0800,
email: ua_ppd_pv_mailbox@abbvie.com.

Про небажані реакції слід також повідомити Державний експертний центр МОЗ України заповнивши повідомлення за посиланням <https://aisf.dec.gov.ua>

Ваше прізвище та ім'я:

Прізвище та ім'я лікаря, який призначив РІНВОК®:

Номер телефону лікаря:

Дата початку лікування препаратом РІНВОК®:



Версія 3.0, грудень 2025
UA-RNQ-260003

abbvie

Картка пацієнта

Зберігайте цю картку постійно при собі

Інформація для пацієнтів щодо безпеки лікарського засобу РІНВОК®

- Ця картка містить важливу інформацію з безпеки, яку Вам слід знати до та під час лікування препаратом РІНВОК®.
- Для отримання додаткової інформації прочитайте інструкцію для медичного застосування.

Ризик інфекцій

РІНВОК® може погіршити перебіг існуючої інфекції або підвищити ймовірність зараження новою інфекцією – наприклад, туберкульозом, оперізуючим герпесом або вірусним гепатитом.

Негайно повідомте лікаря, якщо ви помітите такі ознаки інфекції, як:

- Лихоманка, пітливість, озноб, втрата ваги або тривалий кашель – це можуть бути ознаки туберкульозу.
- Болючий висип на шкірі з пухирцями – це може бути ознакою оперізуючого герпесу.
- Відчуття втоми або задишки – це можуть бути ознаки пневмонії.

Повідомте лікаря якщо:

- У Вас було нещодавно діагностовано туберкульоз або Ви колись хворіли на туберкульоз.
- Ви нещодавно контактували із кимось хворим на туберкульоз.

Вакцини, що застосовуються для профілактики інфекцій

Під час лікування та безпосередньо перед початком лікування лікарським засобом РІНВОК® не слід застосовувати живі вакцини (наприклад, вакцина проти грипу у формі назального спрею, вітряної віспи, кору/паротиту/краснухи).

Перш ніж застосовувати будь-які вакцини, поговоріть з лікарем – він знатиме, які вакцини вам не слід застосовувати до або під час лікування лікарським засобом РІНВОК®.

Ризик серцевих захворювань

Лікування лікарським засобом РІНВОК® було пов'язане з підвищенням холестерину. Тому під час лікування лікарським засобом РІНВОК® лікар перевірятиме у вас рівень холестерину.

Негайно повідомте лікаря, якщо помітите такі симптоми як біль або стиснення у грудях, оскільки це можуть бути симптоми серцевого захворювання.

Контрацепція, вагітність та грудне вигодовування

РІНВОК® не можна застосовувати під час вагітності.

- Використовуйте ефективну контрацепцію під час лікування лікарським засобом РІНВОК® та протягом 4 тижнів після прийому останньої дози лікарського засобу. Поговоріть зі своїм лікарем щодо ефективної контрацепції.
- Негайно повідомте лікаря, якщо ви хочете завагітніти або завагітніли.
- Не годуйте грудьми під час застосування лікарського засобу РІНВОК®.

Ризик утворення тромбів у венах або легенях

При застосуванні лікарського засобу РІНВОК® відмічали випадки утворення тромбів у венах або легенях. Негайно повідомте лікаря, якщо у вас з'явилися такі ознаки тромбів у венах чи легенях, як болючий набряк ніг або біль у грудях.