

Жовтень 2026

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

Інформаційна картка для пацієнтів щодо лікарського засобу ХЕЛІПРОЗАН

Нагадування про потенційні ризики з безпеки при медичному застосуванні

Ця картка містить важливу інформацію, яку необхідно знати під час лікування лікарським засобом ХЕЛІПРОЗАН (вонопразан). Будь ласка, уважно прочитайте її та зберігайте протягом усього періоду лікування.

Лікарський засіб ХЕЛІПРОЗАН у своєму складі містить діючу речовину вонопразан, відноситься до групи препаратів, відомих як інгібітори протонної помпи (ІПП). Вони знижують кількість кислоти, що виробляється в шлунку, та застосовують для лікування кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з наведеними рекомендаціями.

1. Що потрібно знати при застосуванні лікарського засобу ХЕЛІПРОЗАН (вонопразан):

- **Механізм дії:** вонопразан знижує вироблення кислоти у шлунку, що сприяє загоєнню виразок та зменшенню болю у шлунку. Однак зменшення кислотності може мати побічні реакції, особливо при тривалому застосуванні.

- **Тривале застосування:** При тривалому застосуванні вонопразану можуть виникати деякі ризики, тому важливо регулярно консультиватися з лікарем і проводити необхідні обстеження.

2. Можливі ризики та побічні реакції:

- **Підвищення рівня гастрину:** Тривале застосування вонопразану може призвести до підвищення рівня гастрину — гормону, який стимулює вироблення шлункової кислоти. Підвищений рівень гастрину розглядається як потенційний фактор ризику розвитку рідкісного виду пухлин (нейроендокринних пухлин). Необхідно дотримуватися рекомендацій лікаря щодо тривалості лікування та проходити призначені контрольні обстеження.

- **Проблеми з печінкою:** Застосування лікарського засобу може впливати на роботу печінки. У рідкісних випадках можуть підвищуватися печінкові ферменти, що свідчить про можливі порушення функцій печінки. Зверніться до лікаря, якщо помітили зміни в кольорі шкіри або очей (жовтяниця), або якщо виник біль у животі.

- **Підвищений ризик переломів:** Тривале застосування може призвести до зменшення всмоктування кальцію в організмі, що може впливати на кістки і підвищувати ризик переломів, особливо у пацієнтів літнього віку.

- **Інфекції шлунково-кишкового тракту:** застосування лікарського засобу може знижувати кислотність шлунка, що створює умови для росту шкідливих бактерій, таких як *Clostridium difficile*, що може призвести до діареї та інших шлунково-кишкових проблем.

- **Захворювання дихальної системи:** застосування лікарського засобу ХЕЛІПРОЗАН може бути пов'язано з підвищеним ризиком захворювань дихальної системи. Пацієнти, які приймають цей препарат, особливо літнього віку або з наявними проблемами з легенями, повинні уважно слідкувати за симптомами кашлю, задишки або інших симптомів з боку дихальної системи.

3. Що робити під час лікування:

- **Контроль стану печінки:** Якщо ви маєте захворювання печінки або приймаєте інші ліки, що можуть впливати на печінку, повідомте про це лікаря. У разі необхідності лікар може призначити обстеження для контролю функції печінки.

- **Слідкуйте за станом кісток:** Якщо у вас є фактори ризику для остеопорозу (наприклад, недостатня фізична активність або низька маса тіла або недостатнє споживання вітаміну D і кальцію тощо), обговоріть з лікарем можливість перевірки стану ваших кісток.

- **Звертайтеся до лікаря, якщо виникли проблеми з травленням:** Якщо ви відчуваєте незвичні симптоми, такі як діарея, болі в животі, або у вас виникли симптоми, які вказують на інфекцію (наприклад, температура, втрата апетиту), негайно зверніться до лікаря.

- **Звертайте увагу на симптоми з боку дихальної системи:** Якщо у вас з'явилися симптоми кашлю, задишки чи інші проблеми з диханням, особливо якщо ви старшого віку або маєте хронічні захворювання легень, повідомте про це свого лікаря.

4. Коли звертатися до лікаря:

- Якщо у вас з'являються нові або незвичні симптоми, такі як біль в животі, зміни у кольорі шкіри, або ви відчуваєте, що ваш стан погіршується, зверніться до лікаря.

- Якщо ви страждаєте від частих переломів або маєте інші проблеми з кістками, обговоріть це з лікарем.

- Повідомте лікаря, якщо ви відчуваєте ознаки інфекції або будь-які респіраторні симптоми.

Важливо!

Ця картка не замінює консультацію з лікарем. Завжди звертайтеся до лікаря для отримання додаткових рекомендацій та індивідуальної консультації. Застосовуйте лікарський засіб ХЕЛІПРОЗАН (вонопразан) відповідно до призначення лікаря, повідомляйте про будь-які зміни у вашому стані та не пропускайте заплановані візити до лікаря для контролю вашого лікування.

З інструкцією для медичного застосування можна ознайомитись за посиланням <http://www.drlz.com.ua>

Інформація щодо інформування про побічні реакції:

Звітування про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити безперервний моніторинг співвідношення користь/ризик, пов'язаний із застосуванням цього лікарського засобу.

Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року №898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за №73/13340, слід повідомляти про усі підозрювані побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>

Просимо Вас повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції до АТ «Фармак», що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63 та на електронну адресу vigilance@farmak.ua, або за телефоном call-центру +38 044 496 87 87.

З повагою,
Уповноважена особа,
відповідальна за фармаконагляд
АТ «Фармак»



Галина Кордеро