



07.2026

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

Інформаційний лист-звернення до спеціалістів системи охорони здоров'я

ЕДОКСАБАН.

Лікарський засіб Едоксакорд (едоксабан), таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Ризик виникнення кровотеч (включаючи кровотечу внаслідок застосування з іншими лікарськими засобами, що збільшують ризик кровотеч, або невміння зменшити дози, де це рекомендовано).

Дана комунікація має за мету звернути увагу лікарів на ризик виникнення кровотеч при застосуванні лікарського засобу та на особливості його застосування.

Шановний спеціалісте системи охорони здоров'я!

АТ «Київський вітамінний завод», власник реєстраційного посвідчення лікарського засобу Едоксакорд, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, за погодженням Державного експертного центру МОЗ України інформує Вас про важливі аспекти безпечного застосування лікарського засобу Едоксакорд (діюча речовина - едоксабан).

Резюме

- Едоксакорд показаний для профілактики інсульту та системної емболії у дорослих пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь та факторами ризику, а також для лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ), тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) та профілактики їх рецидивів.
- Найбільш серйозною побічною реакцією під час терапії едоксабаном є кровотеча, яка може виникати у будь-якому органі або тканині та призводити до тяжких або летальних наслідків.
- Перед початком лікування та під час терапії необхідно оцінювати ризик кровотечі, функцію нирок, масу тіла пацієнта та супутню медикаментозну терапію.
- Рекомендована доза едоксабану становить 60 мг один раз на добу. Дозу слід зменшити до 30 мг один раз на добу у пацієнтів із кліренсом креатиніну 15–50 мл/хв, масою тіла ≤ 60 кг або при одночасному застосуванні певних інгібіторів Р-глікопротеїну.
- Необхідно уникати одночасного застосування з іншими антикоагулянтами, якщо таке застосування не є клінічно обґрунтованим.

Будь ласка, ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування для отримання повної інформації про призначення. Доступно за адресою: <http://www.drlz.com.ua>

Інформація щодо безпеки

Едоксабан є прямим інгібітором фактора Ха та знижує утворення тромбіну і формування тромбів. Як і інші антикоагулянти, едоксабан підвищує ризик кровотеч, включаючи шлунково-кишкові, урогенітальні, внутрішньочерепні та інші серйозні кровотечі.

Особливу увагу слід приділяти пацієнтам:

- літнього віку; з порушенням функції нирок;
- з низькою масою тіла;
- які одночасно отримують антитромбоцитарні препарати, нестероїдні протизапальні засоби або інші лікарські засоби, що впливають на гемостаз;
- з активними або нещодавніми кровотечами;
- із захворюваннями, які асоціюються з підвищеним ризиком кровотеч.

Рекомендації для спеціалістів системи охорони здоров'я

- Перед призначенням Едоксакорду оцініть індивідуальне співвідношення користі та ризику для кожного пацієнта.
- Перед початком лікування визначте функцію нирок та масу тіла пацієнта для вибору відповідної дози.
- Регулярно контролюйте клінічні ознаки кровотечі та анемії під час лікування.
- Пацієнтів необхідно проінструктувати щодо симптомів можливої кровотечі та необхідності негайного звернення за медичною допомогою у разі їх виникнення.
- Перед проведенням інвазивних процедур або хірургічних втручань слід тимчасово припинити застосування едоксакану відповідно до чинної інструкції для медичного застосування.
- При переведенні пацієнтів з інших антикоагулянтів або на інші антикоагулянти необхідно суворо дотримуватися рекомендацій щодо переходу між схемами лікування.

Інформація щодо інформування про побічні реакції

Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340, слід повідомляти про усі підозрювані побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням <https://aisf.dec.gov.ua>

Під час звітування надайте якомога більше інформації, включаючи інформацію про історію хвороби, будь-які супутні ліки, дати початку та завершення лікування.

Контактні дані компанії

Повідомлення про підозрювані побічні реакції також можна надсилати власнику реєстраційного посвідчення, скориставшись номерами телефонів або електронною поштою, зазначеними нижче:

Тел. (24/7): +38 067 262 90 87

Тел. +38 044 461 03 07

E-mail: pv@vitamin.com.ua

Форма для внесення інформації про побічну реакцію розміщена на сайті <https://www.vitamin.com.ua/uk/farmakonaglyad/>