

10.05.16. Американське агентство з безпеки лікарських засобів (FDA) стурбоване ризиками розвитку рідкісних, але дуже серйозних шкірних реакцій при застосуванні оланзапіну

FDA стурбоване тим, що застосування оланзапіну* може бути пов'язано з розвитком рідкісних, але дуже серйозних шкірних реакцій, що впливають і на інші органи і системи.

Дослідження FDA ідентифікувало 23 випадки DRESS-синдрому**, що розвинувся у пацієнтів при лікуванні оланзапіном. У 1 з цих випадків розвиток даного синдрому мал летальний наслідок, однак, звертає на себе увагу той факт, що пацієнт одночасно приймав декілька лікарських засобів (ЛЗ).

Тому було прийнято рішення додати попередження щодо даних ризиків в інструкцію із застосування вказаних вище ЛЗ.

Рекомендації для пацієнтів

1. Негайно зверніться до лікаря, якщо Ви помітили появу таких симптомів:

- шкірної висипки;
- лихоманки;
- набряка обличчя;
- збільшення лімфатичних залоз.

2. Не міняйте дозу і не переставайте приймати оланзапін без відома Вашого лікаря. Раптова відміна ЛЗ може завдати шкоди.

Рекомендації для лікарів

1. Перед призначенням ЛЗ, що містять оланзапін, повідомте пацієнтов про ризик розвитку DRESS-синдрому і поясніть їм, що це за стан і які наслідки може мати.

2. Якщо у пацієнта все-таки виник DRESS-синдром відмініте ЛЗ негайно.

3. В даний час немає конкретних методів лікування DRESS-синдрому. Можливі тільки превентивні заходи, відміна препарату, що викликав його, а також підтримуюча терапія. Лікування за допомогою системних кортикостероїдів слід розглядати лише в тих випадках, коли відбувається множинне ураження органів.

* Препарати, що містять оланзапін, застосовуються для лікування шизофренії та біполярного розладу. У разі останнього, оланзапін може використовуватися окремо або у комбінації з іншими ЛЗ.

** DRESS-синдром - це група рідкісних, але серйозних і потенційно небезпечних для життя побічних реакцій на лікарські засоби, що клінічно проявляються лихоманкою, вираженою висипкою на шкірі або її лущенням, набряком обличчя та ін. Ці реакції зазвичай проявляються в проміжку від 2 х тижнів до 2-х місяців від початку прийому ЛЗ.