

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

07.2026

Картка-пам'ятка пацієнта

Едоксакорд
таблетки, вкриті плівковою оболонкою
(Едоксабан)

Будь ласка, завжди тримайте цю картку при собі.

Покажіть цю картку своєму терапевту, фармацевту, хірургу або стоматологу перед будь-яким лікуванням або медичним втручанням.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАЦІЄНТА

ПІБ: _____

Дата народження: _____

У разі надзвичайної ситуації звертайтеся:

ПІБ: _____

Номер телефону: _____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІКУВАННЯ

(Заповнює лікар)

Едоксакорд призначається 1 раз на добу у дозі: _____

Початок лікування: _____/_____ (місяць/рік)

Група крові: _____

Інші ліки, які застосовуються / хронічні стани:

ОПИС ІНФОРМАЦІЇ

Для більш детальної інформації та у разі надзвичайної ситуації, звертайтеся:

ПІБ лікаря: _____

Номер телефону, лікарська печатка: _____

Підпис лікаря: _____

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

- Едоксакорд – це пероральний антикоагулянт (Інгібітор фактору Ха)
- У разі необхідності проведення інвазивної процедури застосування лікарського засобу Едоксакорд слід припинити щонайменше за 24 години до її проведення та дотримуватися належної обережності.
- Едоксакорд може збільшити ризик кровотечі. У разі клінічно значущої кровотечі припинити лікування негайно.
- Коагуляційні тести, такі як міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), протромбіновий час (ПЧ) або активований частковий тромбопластиновий час (аЧТЧ), не є надійними показниками. Однак калібрований аналіз антифактора Ха може допомогти в прийнятті клінічних рішень. Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

ПРО ВАШЕ ЛІКУВАННЯ

Вам призначили Едоксакорд – антикоагулянтний лікарський засіб, який розріджує кров і допомагає запобігти утворенню тромбів. Важливо приймати ліки точно так, як це призначив лікар.

- Якщо ви пропустили дозу, прийміть її негайно, а потім продовжуйте приймати Едоксакорд, як зазвичай. Не приймайте подвійну дозу за один день.
- Перед початком прийому інших ліків (у тому числі без рецепта) будь-ласка проконсультуйтеся з лікарем.
- Не припиняйте прийом Едоксакорду без консультації з лікарем, оскільки це може збільшити ризик утворення тромбу.

Прийом антикоагулянтних лікарських засобів, таких як Едоксакорд, може збільшити ризик кровотечі. Тому важливо знати про можливі ознаки та симптоми кровотечі.

Негайно зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте будь-що з наведеного нижче:

- поява синців або кровотеч під шкірою;
- кров у сечі;
- відкашлювання крові;
- блювання кров'ю або речовиною, схожою на мелену каву;
- носові кровотечі або порізи, які довго не зупиняються;
- випорожнення чорного, смолоподібного кольору;
- запаморочення або раптовий головний біль;
- сплутаність свідомості або раптове порушення орієнтації;
- аномальні вагінальні кровотечі, включаючи рясні або тривалі менструації.

Будь ласка, зверніться до лікаря, якщо у вас виникли будь-які незвичні симптоми.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

Повідомляючи про побічні реакції, Ви можете допомогти зібрати більше інформації щодо безпеки цього лікарського засобу.

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

Якщо Ви підозрюєте, що у Вас виникла побічна реакція, пов'язана із застосуванням лікарського засобу Едоксакорд, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, повідомте про це свого лікаря, Державний експертний центр МОЗ України, заповнивши карту-повідомлення за посиланням <https://aisf.dec.gov.ua> та АТ «Київський вітамінний завод», заповнивши форму для внесення інформації про побічну реакцію за посиланням <https://www.vitamin.com.ua/uk/farmakonaglyad/>.