
Прізвище та ім'я пацієнта

Прізвище та ім'я лікаря, який призначив Тепкінлі (епкорітамаб)

Номер телефону лікаря, який призначив Тепкінлі (для звернення в робочий час)

Номер телефону лікаря, який призначив Тепкінлі (для звернення в неробочий час)

Контактна особа пацієнта для екстрених ситуацій

Дата першої дози епкорітамабу

Версія 1.0, 2026
UA-ABBV-260003

abbvie

Картка пацієнта

Будь-ласка, завжди носіть цю картку з собою. Показуйте її усім лікарям, які надають Вам медичну допомогу.

Повідомляйте що Ви застосовуєте Тепкінлі (епкорітамаб) усім лікарям, які надають Вам медичну допомогу, а також під час відвідування будь-якої лікарні.

Будь-ласка, повідомте лікаря або медсестру, якщо під час лікування епкорітамабом у Вас виникли будь-які побічні реакції.

Будьте обережні під час керування автомобілем, їзди на велосипеді або роботи з важкою чи потенційно небезпечною технікою. Якщо у вас є будь-які симптоми, описані на цій картці, вам слід уникати цих видів діяльності.

Ви можете повідомити про побічні реакції безпосередньо до Державного експертного центру МОЗ України за цим посиланням <https://aisf.dec.gov.ua/>.

Інформація для пацієнта

Епкорітамаб може спричинити побічні ефекти, які можуть бути серйозними.

Негайно зателефонуйте Вашому лікарю або викличте невідкладну допомогу якщо у Вас з'явилися наступні симптоми:

- Підвищення температури (38°C або вище)
- Запаморочення чи переднепритомний стан
- Озноб
- Прискорене серцебиття
- Утруднене дихання
- Головний біль
- Утруднення мовлення або письма
- Сонливість
- Сплутаність свідомості/ дезорієнтація
- М'язова слабкість
- Судоми
- Втрата пам'яті

Інформація для лікарів

- Цей пацієнт отримує лікування епкорітамабом – біспецифічним антитілом, що залучає Т-клітини.
- Після лікування епкорітамабом можуть виникати синдром вивільнення цитокінів (CRS) та синдром нейротоксичності, асоційований з імунними ефекторними клітинами (ICANS), які в разі несвоєчасного лікування можуть мати серйозні наслідки. CRS може розвинути через кілька годин або днів після введення епкорітамабу, зазвичай після першої повної дози у першому циклі. ICANS може виникнути через кілька днів або тижнів після введення лікарського засобу.
- **Для отримання детальної інформації негайно зверніться до лікаря, який призначив Тепкінлі (контактна інформація на звороті).**