

06.05.16. НС. Інгібітори протонної помпи - оцінка потенційного ризику розвитку тяжкої Clostridium-інфекції

Міністерство охорони здоров'я Канади (НС) провело огляд нової інформації, що з'явилася в науковій літературі з 2012 року, щодо розвитку тяжкої Clostridium-інфекції у пацієнтів, які застосовували інгібітори протонної помпи (ІПП). Тяжкість інфекції варіювала від легкої діареї до поліорганної недостатності з загрозою для життя, особливо у літніх пацієнтів.

У базу даних ВООЗ надійшло 233 повідомлення про наявність Clostridium-інфекції у людей, які приймали ІПП (в Канаді було 10 випадків).

У наукових джерелах був обумовлен зв'язок між застосуванням ІПП та розвитком інфекції. Однак, у пацієнтів, які були втягнуті до дослідження, були й інші фактори ризику, що могли сприяти розвитку клостридиальної інфекції.

НС прийшло до висновку, що доказів причетності ІПП до розвитку важкої Clostridium-інфекції занадто мало. Але, незважаючи на сказане вище, все-таки не можна виключати зв'язок між застосуванням ІПП та розвитком інфекції. І, відповідно до цього, НС встановило, що пацієнти, які проходять терапію ІПП трохи більше схильні до розвитку Clostridium-інфекції. Тому було прийнято рішення оновити інформацію щодо факторів ризиків ІПП в інструкції із їх застосування.