

5.12.2017 р. Данська медична агенція (DMA) на своєму офіційному сайті оприлюднила інформацію щодо дослідження «Застосування гідрохлортіазиду і ризик немеланомних злоякісних новоутворень шкіри: загальнонаціональне дослідження Данії типу випадок-контроль».

Це дослідження було опубліковане в Журналі Американської Академії дерматології (Journal of the American Academy of Dermatology) 30.11.2017 року.

Метою дослідження було вивчити зв'язок між застосуванням гідрохлортіазиду та ризиком розвитку базально-клітинної карциноми (БЦК) та плоскоклітинної карциноми (ПКК).

Висновки дослідження: використання гідрохлортіазиду пов'язане з суттєвим підвищенням ризику немеланомного раку шкіри, особливо ПКК.

DMA ознайомилось та оцінило дані дослідження, відповідно якого гіпотензивні препарати з гідрохлортіазидом можуть збільшити ризик розвитку раку шкіри. Зокрема, в дослідженні було зроблено висновок про те, що тривале застосування гідрохлортіазиду збільшує ризик розвитку раку шкіри до семи раз.

Важливо відзначити, що дослідження не документує причинно-наслідковий зв'язок. Дослідження являє собою, так зване, ретроспективне дослідження, в якому дослідники відзначали, що пацієнти з плоскоклітинним раком шкіри, часто отримували гідрохлортіазид. Ризик розвитку цього типу раку, як правило, низький (1 з 1000 пацієнтів, які досліджувалися) і, в першу чергу, спостерігався у пацієнтів, які приймали препарат протягом багатьох років.

Потенційно підвищений ризик розвитку ПКК має відношення тільки до гідрохлортіазиду, а не до інших тіазидних лікарських засобів, наприклад, бендролфлуметіазид (bendroflumethiazide).

DMA звернулось до Європейської агенції з лікарських засобів (ЕМА) з пропозицією розглянути даний ризик в якості можливого сигналу. DMA також заявляє, що кінцеве рішення буде прийняте ЕМА після оцінки дослідження і сигналу, тому без консультації з лікарем лікування препаратом зупиняти не варто.

Посилання: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29217346> ;

<https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2017/laegemiddelstyrelsen-om-det-nye-studie-om-hydrochlorothiazid>