

Основні показники роботи системи фармаконагляду України за 2018 рік

1. АКТИВНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ У ЗДІЙСНЕННІ ФАРМАКОНАГЛЯДУ

Таблиця 1

КІЛЬКІСТЬ ОТРИМАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПР/НППІ ЛЗ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ

№ з.п.	Регіон	Кількість отриманих повідомлень	В тому числі валідних	В тому числі невалідних
1	Вінницька обл.	1561	1480	81
2	Волинська обл.	174	155	19
3	Дніпропетровська обл.	3561	3420	141
4	Донецька обл.	1103	1065	38
5	Житомирська обл.	228	224	4
6	Закарпатська обл.	252	239	13
7	Запорізька обл.	1851	1810	41
8	Івано-Франківська обл.	441	420	21
9	Київська обл.	385	367	18
10	Кіровоградська обл.	426	417	9
11	Луганська обл.	667	616	51
12	Львівська обл.	904	877	27
13	м. Київ	2341	2052	289
14	Миколаївська обл.	1143	1101	42
15	Одеська обл.	592	555	37
16	Полтавська обл.	1155	1091	64
17	Рівненська обл.	454	380	74
18	Сумська обл.	467	435	32
19	Тернопільська обл.	539	506	33
20	Харківська обл.	2537	2437	100
21	Херсонська обл.	1379	1291	88
22	Хмельницька обл.	1232	1179	53
23	Черкаська обл.	506	477	29
24	Чернівецька обл.	396	383	13
25	Чернігівська обл.	552	533	19
26	Не визначено	77	51	26
Всього		24923	23561	1362

Примітка: * – тимчасово окупована територія України

** – підконтрольні Україні території Луганської і Донецької областей

*** – повідомлення отримані від пацієнтів, власників РП без зазначення регіону

2. РОЗПОДІЛ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ НАЛЕЖНОСТІ ДО ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ГРУП ТА МІЖНАРОДНОЇ НЕПАТЕНТОВАНОЇ НАЗВИ (МНН), ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ

Таблиця 2а

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ ГРУПИ ЛЗ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ ЛЗ (перший рівень АТС)

АТХ	Фармакотерапевтична група ЛЗ	За кількістю ПР/НППІ		За кількістю ПР/НППІ (%)	
		Минулорічний період	Поточний період	Минулорічний період	Поточний період
A	Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм	1451	1292	5,4%	5,3%
B	Засоби, що впливають на систему крові та гемопоез	1048	1029	3,9%	4,2%
C	Засоби, що впливають на серцево-судинну систему	2953	2800	11,1%	11,4%
D	Дерматологічні засоби	142	150	0,5%	0,6%
G	Засоби, що впливають на сечостатеву систему та статеві гормони	205	173	0,8%	0,7%
H	Препарати гормонів для системного застосування за винятком статевих гормонів та інсулінів	78	78	0,3%	0,3%
J	Протимікробні засоби для системного застосування	16143	14511	60,5%	59,2%
L	Антинеопластичні та імуномодулюючі засоби	200	173	0,7%	0,7%
M	Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат	1162	1010	4,4%	4,1%
N	Засоби, що діють на нервову систему	2027	2091	7,6%	8,5%
P	Протипаразитарні засоби, інсектициди та репеленти	45	31	0,2%	0,1%
R	Засоби, що діють на респіраторну систему	901	839	3,4%	3,4%
S	Засоби, що діють на органи чуття	130	132	0,5%	0,5%
V	Різні засоби	81	67	0,3%	0,3%
	Не визначено	130	120	0,5%	0,5%
Всього		26696	24496	100,0%	100,0%

Таблиця 2б

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ ГРУПИ ЛЗ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ ЛЗ (другий рівень АТС)

АТХ	Фармакотерапевтична група ЛЗ	Кількість	%
A01	Засоби для застосування в стоматології	17	0,1%
A02	Засоби для лікування кислотозалежних захворювань	133	0,5%
A03	Засоби, що застосовуються у разі функціональних шлунково-кишкових розладів	248	1,0%
A04	Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту	7	0,0%
A05	Засоби, що застосовуються для лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів	98	0,4%
A06	Проносні засоби	4	0,0%
A07	Антидіарейні препарати, засоби що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника	47	0,2%
A09	Засоби замісної терапії, що застосовуються у разі розладів травлення, включаючи ферменти	27	0,1%
A10	Антидіабетичні препарати	201	0,8%
A11	Вітаміни	320	1,3%
A12	Мінеральні добавки	45	0,2%
A13	Тонізуючі препарати	0	0,0%
A14	Анаболічні засоби для системного застосування	3	0,0%
A15	Засоби, що підвищують апетит	1	0,0%
A16	Інші засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси	141	0,6%
B01	Антитромботичні препарати	213	0,9%
B02	Антигеморагічні засоби	113	0,5%
B03	Антианемічні препарати	108	0,4%
B05	Кровозамінники та перфузійні розчини	585	2,4%
B06	Інші гематологічні засоби	10	0,0%
C01	Кардіологічні препарати	496	2,0%
C02	Гіпотензивні засоби	23	0,1%
C03	Діуретичні препарати	97	0,4%
C04	Периферичні вазодилататори	209	0,9%
C05	Ангіопротектори	188	0,8%
C07	Блокатори бета-адренорецепторів	241	1,0%
C08	Антагоністи кальцію	630	2,6%
C09	Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему	782	3,2%
C10	Гіполіпідемічні засоби	134	0,5%
D01	Протигрибкові препарати для застосування в дерматології	19	0,1%
D02	Препарати з пом'якшувальною та захисною дією	2	0,0%
D03	Засоби для лікування ран та виразкових уражень	21	0,1%
D04	Протисвербіжні препарати (включаючи антигістамінні, місцевоанестезуючі та інші засоби)	3	0,0%
D06	Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для застосування в дерматології	30	0,1%
D07	Кортикостероїди для застосування в дерматології	18	0,1%

Основні показники роботи системи фармаконагляду України за 2018 р.

D08	Антисептичні та дезінфікуючі засоби	55	0,2%
D10	Препарати для лікування акне	2	0,0%
D11	Інші дерматологічні препарати	0	0,0%
G01	Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології	68	0,3%
G02	Інші гінекологічні засоби	18	0,1%
G03	Гормони статевих залоз та препарати, що застосовуються при патології статевої сфери	45	0,2%
G04	Засоби, що застосовуються в урології	42	0,2%
H01	Гіпофізарні, гіпоталамічні гормони та їх аналоги	18	0,1%
H02	Кортикостероїди для системного застосування	45	0,2%
H03	Тиреотропні засоби	14	0,1%
H05	Засоби, що регулюють кальцієвий обмін	1	0,0%
J01	Антибактеріальні засоби для системного застосування	4956	20,2%
J02	Протигрибкові засоби для системного застосування	36	0,1%
J04	Засоби, що діють на мікобактерії	6452	26,3%
J05	Противірусні засоби для системного застосування	1354	5,5%
J06	Імунні сироватки та імуноглобуліни	12	0,0%
J07	Вакцини	1701	6,9%
L01	Іxabepilone	108	0,4%
L02	Засоби, що застосовуються для гормональної терапії	2	0,0%
L03	Імуностимулятори	51	0,2%
L04	Імуносупресанти	12	0,0%
M01	Протизапальні та протиревматичні засоби	835	3,4%
M02	Засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю	65	0,3%
M03	Міорелаксанти	71	0,3%
M04	Засоби, що застосовуються для лікування подагри	11	0,0%
M05	Засоби, що застосовуються для лікування захворювань кісток	6	0,0%
M09	Інші засоби, що застосовуються у разі патології опорно-рухового апарату	22	0,1%
N01	Анестетики	398	1,6%
N02	Анальгетики	359	1,5%
N03	Протиепілептичні засоби	153	0,6%
N04	Протипаркінсонічні засоби	6	0,0%
N05	Психолептичні засоби	623	2,5%
N06	Психоаналептики	355	1,4%
N07	Інші засоби, що діють на нервову систему	197	0,8%
P01	Антипротозойні препарати	11	0,0%
P02	Протигельмінтні засоби	12	0,0%
P03	Засоби, що діють на ектопаразитів, включаючи препарати для лікування корости та репеленти	8	0,0%
R01	Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа	47	0,2%

R02	Препарати, що застосовуються у разі захворювань горла	109	0,4%
R03	Засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів	243	1,0%
R05	Засоби, що застосовуються у разі кашлю та застудних захворювань	363	1,5%
R06	Антигістамінні засоби для системного застосування	71	0,3%
R07	Інші засоби, що діють на респіраторну систему	6	0,0%
S01	Засоби, що застосовуються в офтальмології	96	0,4%
S02	Препарати, що застосовуються в отоларингології	12	0,0%
S03	Препарати, що застосовуються в офтальмології та отоларингології	24	0,1%
V03	Всі інші лікарські засоби	17	0,1%
V04	Діагностичні засоби	1	0,0%
V06	Поживні речовини загального призначення	10	0,0%
V07	Всі інші засоби медичного призначення	3	0,0%
V08	Контрастні засоби	36	0,1%
	Не визначено	120	0,5%
Всього		24496	100,0%

Таблиця 2в
ЛЗ (ЗА МНН), ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ НАДІЙШЛИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ

№ з.п.	МНН	Усього випадків	<>*	вс*	нн*	нп*	сн*	сп*	НППІ*
1	Abacavir	5	0	0	0	5	0	0	0
2	Aceclofenac	10	0	0	0	10	0	0	0
3	Acenocoumarol	2	0	0	0	2	0	0	0
4	Acetazolamide	3	0	0	0	3	0	0	0
5	Acetylcysteine	20	0	0	0	18	0	2	0
6	Acetylsalicylic acid	40	0	0	0	32	0	8	0
7	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	21	0	0	0	20	0	1	0
8	Aciclovir	18	0	0	0	16	0	2	0
9	Adapalene, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
10	Ademetionine	22	0	0	0	19	0	3	0
11	Adenosine	8	0	0	0	8	0	0	0
12	Agni casti fructus	5	0	0	0	5	0	0	0
13	Albendazole	10	0	0	0	7	0	3	0
14	Albumin	2	0	0	0	1	0	1	0
15	Alclometasone	1	0	0	0	1	0	0	0
16	Alendronic acid	2	0	0	0	2	0	0	0
17	Allopurinol	9	0	0	0	9	0	0	0
18	Aloe**	1	0	0	0	0	0	1	0
19	Alprostadil	3	0	0	0	3	0	0	0

20	Altabor*	2	0	0	0	2	0	0	0
21	Alteplase	1	0	0	0	1	0	0	0
22	Althaea officinalis**	3	0	0	0	3	0	0	0
23	Althea root	7	0	0	0	7	0	0	0
24	Aluminium hydroxide, combinations*	3	0	0	0	3	0	0	0
25	Aluminium phosphate	1	0	0	0	1	0	0	0
26	Alverine, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
27	Amantadine	1	0	0	0	1	0	0	0
28	Ambazone	7	0	0	0	7	0	0	0
29	Ambroxol	92	0	0	0	86	0	6	0
30	Amikacin	23	0	0	0	21	0	2	0
31	Amino acids	6	0	0	0	5	0	1	0
32	Aminobutyric acid	2	0	0	0	2	0	0	0
33	Aminocaproic acid	14	0	0	0	14	0	0	0
34	Amiodarone	59	0	0	0	58	0	1	0
35	Amisulpride	10	0	0	0	9	0	1	0
36	Amitriptyline	26	0	0	0	25	0	1	0
37	Amlodipine	561	0	0	0	558	0	3	0
38	Amlodipine and diuretics	5	0	0	0	5	0	0	0
39	Amoxicillin	165	0	0	0	156	0	9	0
40	Amoxicillin and enzyme inhibitor	272	0	0	0	252	0	20	0
41	Amphotericin B	1	0	0	0	1	0	0	0
42	Ampicillin	14	0	0	0	13	0	1	0
43	Ampicillin and enzyme inhibitor	30	0	0	0	27	0	3	0
44	Antiinfectives, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
45	Antral*	5	0	0	0	5	0	0	0
46	Aprotinin	35	0	0	0	26	0	9	0
47	Aqua pro injectioni*	2	0	0	1	0	0	1	0
48	Arginine glutamate	28	0	0	0	25	0	3	0
49	Arginine hydrochloride	119	0	0	0	110	0	9	0
50	Aripiprazole	42	0	0	0	37	0	5	0
51	Articaine, combinations	113	0	0	0	93	0	20	0
52	Ascorbic acid (vit C)	18	0	0	0	18	0	0	0
53	Asparaginase	7	0	0	0	6	0	1	0
54	Atazanavir	16	0	0	0	16	0	0	0
55	Atenolol	11	0	0	0	10	0	1	0
56	Atenolol and other antihypertensives	9	0	0	0	9	0	0	0
57	Atenolol and other diuretics	3	0	0	0	3	0	0	0
58	Atorvastatin	40	0	0	0	40	0	0	0

59	Atorvastatin, acetylsalicylic acid and ramipril	1	0	0	0	1	0	0	0
60	Atracurium	2	0	0	0	1	0	1	0
61	Atropa belladonna**	2	0	0	0	2	0	0	0
62	Atropine	8	0	0	0	7	0	1	0
63	Azilsartan medoxomil	1	0	0	0	1	0	0	0
64	Azithromycin	252	0	0	0	248	0	4	0
65	Baclofen	2	0	0	0	2	0	0	0
66	Barbiturates in combination with other drugs	10	0	0	0	9	0	1	0
67	Beclometasone	5	0	0	0	5	0	0	0
68	Bedaquiline	14	0	0	0	10	0	4	0
69	Bendamustine	2	0	0	0	2	0	0	0
70	Bendazol*	2	0	0	0	2	0	0	0
71	Benzathine benzylpenicillin	2	0	0	0	2	0	0	0
72	Benzocaine	2	0	0	0	2	0	0	0
73	Benzydamine	11	0	0	0	11	0	0	0
74	Benzyl benzoate	7	0	0	0	7	0	0	0
75	Benzylpenicillin	9	0	0	0	8	0	1	0
76	Betahistine	27	0	0	0	27	0	0	0
77	Betamethasone	15	0	0	0	14	0	1	0
78	Betamethasone and antibiotics	1	0	0	0	1	0	0	0
79	Betaxolol	2	0	0	0	2	0	0	0
80	Biclotymol*	2	0	0	0	2	0	0	0
81	Bilastine	3	0	0	0	3	0	0	0
82	Biotin	2	0	0	0	2	0	0	0
83	Bismuth subcitrate	5	0	0	0	5	0	0	0
84	Bisoprolol	120	0	0	0	120	0	0	0
85	Bortezomib	1	0	0	0	1	0	0	0
86	Brimonidine	7	0	0	0	7	0	0	0
87	Brinzolamide, combinations	2	0	0	0	2	0	0	0
88	Bromhexine	6	0	0	0	6	0	0	0
89	Bromocriptine	3	0	0	0	3	0	0	0
90	Budesonide	7	0	0	0	7	0	0	0
91	Bupivacaine	16	0	0	0	13	0	3	0
92	Buprenorphine	1	0	0	0	1	0	0	0
93	Buspirone	2	0	0	0	2	0	0	0
94	Butamirate	2	0	0	0	2	0	0	0
95	Butylscopolamine	1	0	0	0	1	0	0	0
96	Cabergoline	2	0	0	0	2	0	0	0

97	Calcium chloride	1	0	0	0	1	0	0	0
98	Calcium gluconate	12	0	0	0	10	0	2	0
99	Calendula officinalis**	2	0	0	0	2	0	0	0
100	Candesartan	6	0	0	0	6	0	0	0
101	Capreomycin	430	0	0	0	334	0	96	0
102	Captopril	10	0	0	0	10	0	0	0
103	Captopril and diuretics	28	0	0	0	28	0	0	0
104	Carbamazepine	45	0	0	0	41	0	4	0
105	Carbetocin	1	0	0	0	1	0	0	0
106	Carbocisteine	10	0	0	0	10	0	0	0
107	Carboplatin	3	0	0	0	2	0	1	0
108	Carvedilol	51	0	0	0	51	0	0	0
109	Cefalexin	6	0	0	0	5	0	1	0
110	Cefazolin	22	0	0	0	19	0	3	0
111	Cefepime	47	0	0	0	39	0	8	0
112	Cefixime	32	0	0	0	31	0	1	0
113	Cefoperazone	30	0	0	0	26	0	4	0
114	Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor	19	0	0	0	17	0	2	0
115	Cefoperazone, combinations	12	0	0	0	10	0	2	0
116	Cefotaxime	60	0	0	0	52	0	8	0
117	Cefpodoxime	44	0	0	0	42	0	2	0
118	Ceftazidime	37	0	0	0	33	0	4	0
119	Ceftriaxone	961	0	0	0	847	0	114	0
120	Ceftriaxone, combinations	24	0	0	0	22	0	2	0
121	Cefuroxime	63	0	0	0	59	0	4	0
122	Celecoxib	1	0	0	0	1	0	0	0
123	Cetirizine	5	0	0	0	5	0	0	0
124	Chlorambucil	1	0	0	0	0	0	1	0
125	Chloramphenicol	23	0	0	0	20	0	3	0
126	Chlorhexidine	10	0	0	0	10	0	0	0
127	Chlorhexidine, combinations	4	0	0	0	2	0	2	0
128	Chlorophyllipt*	20	0	0	0	19	0	1	0
129	Chloropyramine	8	0	0	0	8	0	0	0
130	Chlorpromazine	49	0	0	0	48	0	1	0
131	Chlorprothixene	13	0	0	0	12	0	1	0
132	Chlorquinaldol	1	0	0	0	1	0	0	0
133	Choline alfoscerate	27	0	0	0	26	0	1	0
134	Chondroitin sulfate	10	0	0	0	9	0	1	0

135	Ciclosporin	4	0	0	0	4	0	0	0
136	Cilostazol	4	0	0	0	4	0	0	0
137	Cimicifugae rhizoma	1	0	0	0	1	0	0	0
138	Cinacalcet	1	0	0	0	1	0	0	0
139	Cineole	1	0	0	0	1	0	0	0
140	Cinnarizine	2	0	0	0	2	0	0	0
141	Cinnarizine, combinations	10	0	0	0	10	0	0	0
142	Ciprofloxacin	114	0	0	0	107	0	7	0
143	Ciprofloxacin and ornidazole	6	0	0	0	6	0	0	0
144	Ciprofloxacin and tinidazole	12	0	0	0	12	0	0	0
145	Cisplatin	8	0	0	0	6	0	2	0
146	Citicoline	61	0	0	0	58	0	3	0
147	Clarithromycin	65	0	0	0	63	0	2	0
148	Clindamycin	6	0	0	0	4	0	2	0
149	Clobetasol	2	0	0	0	2	0	0	0
150	Clofazimine	31	0	0	0	26	0	5	0
151	Clomipramine	6	0	0	0	6	0	0	0
152	Clonidine	5	0	0	0	5	0	0	0
153	Clopidogrel	111	0	0	0	108	0	3	0
154	Clotrimazole	11	0	0	0	11	0	0	0
155	Clozapine	28	0	0	0	26	0	2	0
156	Coccarboxylase*	1	0	0	0	1	0	0	0
157	Colecalciferol	7	0	0	0	7	0	0	0
158	Colistin	1	0	0	0	1	0	0	0
159	Comb drug	772	0	0	1	735	0	36	0
160	Combinations of imidazole derivatives	11	0	0	0	10	0	1	0
161	Combinations of vitamins	1	0	0	0	1	0	0	0
162	Cough suppressants and expectorants	6	0	0	0	6	0	0	0
163	Cough suppressants and mucolytics	8	0	0	0	8	0	0	0
164	Cromoglicic acid	1	0	0	0	1	0	0	0
165	Cyanocobalamin	25	0	0	0	24	0	1	0
166	Cyclobenzaprine	4	0	0	0	4	0	0	0
167	Cycloferon*	4	0	0	0	3	0	1	0
168	Cyclopentolate	2	0	0	0	2	0	0	0
169	Cycloserine	571	0	0	0	426	0	145	0
170	Cynara scolymus**	4	0	0	0	4	0	0	0
171	Cytarabine	1	0	0	0	1	0	0	0
172	Cytochrom C*	3	0	0	0	3	0	0	0

173	Dabigatran etexilate	2	0	0	0	2	0	0	0
174	Dalargin*	3	0	0	0	3	0	0	0
175	Dapagliflozin	2	0	0	0	2	0	0	0
176	Dasabuvir	1	0	0	0	1	0	0	0
177	Decamethoxine	20	0	0	0	20	0	0	0
178	Dequalinium	1	0	0	0	1	0	0	0
179	Desloratadine	10	0	0	0	10	0	0	0
180	Desmopressin	1	0	0	0	1	0	0	0
181	Desogestrel and ethinylestradiol	5	0	0	0	5	0	0	0
182	Dexamethasone	22	0	0	0	20	0	2	0
183	Dexamethasone and antiinfectives	7	0	0	0	7	0	0	0
184	Dexamethasone, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
185	Dexketoprofen	59	0	0	0	55	0	4	0
186	Dexpanthenol	3	0	0	0	3	0	0	0
187	Dextran	14	0	0	0	11	0	3	0
188	Diacerein	4	0	0	0	4	0	0	0
189	Diatrizoic acid	17	0	0	0	15	0	2	0
190	Diazepam	7	0	1	0	6	0	0	0
191	Diclofenac	229	0	0	0	211	0	18	0
192	Diclofenac, combinations	43	0	0	0	39	0	4	0
193	Dienogest	1	0	0	0	1	0	0	0
194	Dienogest and ethinylestradiol	2	0	0	0	2	0	0	0
195	Digoxin	7	0	0	0	6	0	1	0
196	Diltiazem	1	0	0	0	1	0	0	0
197	Dimethyl sulfoxide	19	0	0	0	18	0	1	0
198	Dimetindene	1	0	0	0	1	0	0	0
199	Diosmectite	3	0	0	0	3	0	0	0
200	Diosmin	6	0	0	0	6	0	0	0
201	Diosmin, combinations	26	0	0	0	25	0	1	0
202	Dioxydine*	3	0	0	0	3	0	0	0
203	Diphenhydramine	2	0	0	0	2	0	0	0
204	Diphtheria-Hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus	8	3	0	0	2	0	5	1
205	Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B	27	6	0	0	18	0	6	3
206	Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus	16	4	0	0	10	0	4	2
207	Dipyridamole	9	0	0	0	9	0	0	0
208	Disulfiram	1	0	0	0	1	0	0	0
209	Docetaxel	7	0	0	0	5	0	2	0

210	Dolutegravir	51	0	0	0	49	0	2	0
211	Domperidone	14	0	0	0	13	0	1	0
212	Donepezil	4	0	0	0	4	0	0	0
213	Dopamine	2	0	0	0	2	0	0	0
214	Dorzolamide	3	0	0	0	3	0	0	0
215	Doxazosin	1	0	0	0	1	0	0	0
216	Doxofylline	2	0	0	0	2	0	0	0
217	Doxorubicin	10	0	0	0	5	0	5	0
218	Doxycycline	22	0	0	0	21	0	1	0
219	Doxylamine	1	0	0	0	1	0	0	0
220	Drospirenone and estrogen	1	0	0	0	1	0	0	0
221	Drospirenone and ethinylestradiol	3	0	0	0	2	0	1	0
222	Drotaverine	62	0	0	0	59	0	3	0
223	Duloxetine	5	0	0	0	5	0	0	0
224	Dutasteride	1	0	0	0	1	0	0	0
225	Dydrogesterone	2	0	0	1	1	0	0	0
226	Dydrogesterone and estrogen	1	0	0	0	1	0	0	0
227	Echinacea purpurea**	2	0	0	0	2	0	0	0
228	Econazole	1	0	0	0	1	0	0	0
229	Edaravone*	3	0	0	0	3	0	0	0
230	Efavirenz	143	0	0	0	138	0	5	0
231	Electrolytes	37	0	0	9	25	0	3	0
232	Electrolytes in combination with other drugs	223	0	0	0	206	0	17	0
233	Electrolytes with carbohydrates	17	0	0	0	14	0	3	0
234	Emoxypin*	5	0	0	0	5	0	0	0
235	Emtricitabine, tenofovir disoproxil and efavirenz	326	0	0	0	299	0	27	0
236	Enalapril	341	0	0	0	340	0	1	0
237	Enalapril and diuretics	26	0	0	0	25	0	1	0
238	Enalapril and lercanidipine	2	0	0	0	2	0	0	0
239	Enisamium iodide*	30	0	0	0	29	0	1	0
240	Enoxaparin	7	0	0	0	6	0	1	0
241	Eplerenone	4	0	0	0	4	0	0	0
242	Erdosteine	17	0	0	0	17	0	0	0
243	Erythromycin	4	0	0	0	4	0	0	0
244	Escitalopram	11	0	0	0	11	0	0	0
245	Esomeprazole	4	0	0	0	3	0	1	0
246	Etamsylate	8	0	0	0	7	0	1	0
247	Ethacizin*	5	0	0	0	5	0	0	0

248	Ethambutol	175	0	0	0	155	0	20	0
249	Ethionamide	432	0	0	0	409	0	23	0
250	Etifoxine	1	0	0	0	0	0	1	0
251	Etodolac	3	0	0	0	3	0	0	0
252	Etoposide	6	0	0	0	3	0	3	0
253	Etoricoxib	1	0	0	0	1	0	0	0
254	Etravirine	1	0	0	0	1	0	0	0
255	Famotidine	9	0	0	0	9	0	0	0
256	Febuxostat	2	0	0	0	2	0	0	0
257	Felodipine	4	0	0	0	4	0	0	0
258	Fenoterol	1	0	0	0	1	0	0	0
259	Fenoterol and ipratropium bromide	5	0	0	0	5	0	0	0
260	Fenspiride	121	0	0	0	118	1	2	0
261	Fentanyl	1	0	0	0	1	0	0	0
262	Ferric oxide dextran complex*	8	0	0	0	4	0	4	0
263	Ferric oxide polymaltose complexes	15	0	0	0	15	0	0	0
264	Ferric oxide polymaltose complexes with folic acid*	1	0	0	0	1	0	0	0
265	Ferrous fumarate	1	0	0	0	1	0	0	0
266	Ferrous sulfate	1	0	0	0	1	0	0	0
267	Ferrous sulfate with folic acid	11	0	0	0	11	0	0	0
268	Fexofenadine	2	0	0	0	2	0	0	0
269	Filgrastim	1	0	0	0	1	0	0	0
270	Flecainide	2	0	0	0	2	0	0	0
271	Fluconazole	24	0	0	0	21	0	3	0
272	Fluocinolone acetonide	3	0	0	0	3	0	0	0
273	Fluocinonide and antibiotics	2	0	0	0	2	0	0	0
274	Fluorouracil	7	0	0	0	5	0	2	0
275	Fluoxetine	5	0	0	0	5	0	0	0
276	Flupenthixol	12	0	0	0	11	0	1	0
277	Fluphenazine	11	0	0	0	9	0	2	0
278	Flupirtine	1	0	0	0	1	0	0	0
279	Flurbiprofen	5	0	0	0	5	0	0	0
280	Fluticasone	1	0	0	0	1	0	0	0
281	Folic acid	2	0	0	0	2	0	0	0
282	Formoterol and budesonide	4	0	0	0	4	0	0	0
283	Fosfomycin	4	0	0	0	4	0	0	0
284	Framycetin	1	0	0	0	1	0	0	0
285	Furazidin	18	0	0	0	17	0	1	0

286	Furazolidone	4	0	0	0	4	0	0	0
287	Furosemide	19	0	0	0	18	0	1	0
288	Gabapentin	18	0	0	0	18	0	0	0
289	Gadobutrol	1	0	0	0	1	0	0	0
290	Gadopentetic acid	2	0	0	0	2	0	0	0
291	Ganciclovir	1	0	0	0	0	0	1	0
292	Gatifloxacin	7	0	0	0	6	0	1	0
293	Gelatin agents	7	0	0	0	5	0	2	0
294	Gemcitabine	2	0	0	0	0	0	2	0
295	Gentamicin	13	0	0	0	10	0	3	0
296	Gestodene and ethinylestradiol	2	0	0	0	2	0	0	0
297	Ginkgo folium	2	0	0	0	2	0	0	0
298	Glibenclamide	4	0	0	0	4	0	0	0
299	Gliclazide	20	0	0	0	20	0	0	0
300	Glimepiride	14	0	0	0	14	0	0	0
301	Glucosamine	3	0	0	0	3	0	0	0
302	Glucose	32	0	0	3	25	0	4	0
303	Glyceryl trinitrate	16	0	0	0	13	0	3	0
304	Glycine	11	0	0	0	11	0	0	0
305	Glycyrrhiza**	3	0	0	0	3	0	0	0
306	Griseofulvin	4	0	0	0	4	0	0	0
307	G-strophanthin	1	0	0	0	1	0	0	0
308	Haloperidol	155	0	0	0	149	0	6	0
309	Harpagophytum procumbens*	1	0	0	0	1	0	0	0
310	Hederae heliis folium	24	0	0	0	22	0	2	0
311	Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated	50	2	0	0	37	0	10	3
312	Heparin	3	0	0	0	2	0	1	0
313	Heparin, combinations	4	0	0	0	4	0	0	0
314	Hepatitis B, purified antigen	40	2	0	0	24	0	4	12
315	Hexamethonium bromide*	1	0	0	0	1	0	0	0
316	Hexetidine	2	0	0	0	2	0	0	0
317	Hexoprenaline	4	0	0	0	4	0	0	0
318	Hidrosmin	1	0	0	0	1	0	0	0
319	Hippocastani semen	1	0	0	0	0	0	1	0
320	Hopantenic acid*	5	0	0	0	5	0	0	0
321	Hyaluronidase	10	0	0	0	10	0	0	0
322	Hydazepam*	10	0	0	0	10	0	0	0
323	Hydrochlorothiazide	6	0	0	0	6	0	0	0

324	Hydrocortisone	3	0	0	0	2	0	1	0
325	Hydrogen peroxide	1	0	0	0	1	0	0	0
326	Hydroxychloroquine	1	0	0	0	1	0	0	0
327	Hydroxyethylstarch	6	0	0	0	4	0	2	0
328	Hydroxyzine	2	0	0	0	2	0	0	0
329	Ibuprofen	206	0	0	0	189	0	17	0
330	Ibuprofen, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
331	Iloprost	2	0	0	0	2	0	0	0
332	Imidazolyl ethanamide pentandioic acid*	2	0	0	0	2	0	0	0
333	Imipenem and enzyme inhibitor	1	0	0	0	0	0	1	0
334	Imipramine	5	0	0	0	5	0	0	0
335	Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.	3	0	0	0	3	0	0	0
336	Indapamide	14	0	0	0	14	0	0	0
337	Indometacin	4	0	0	0	4	0	0	0
338	Influenza, inactivated, split virus or surface antigen	4	0	0	0	4	0	0	0
339	Inosine	32	0	0	0	31	0	1	0
340	Inosine pranobex	48	0	0	0	48	0	0	0
341	Insulin (human)	45	0	2	0	42	0	1	0
342	Insulin aspart	2	0	0	0	2	0	0	0
343	Insulin glargine	6	0	0	0	6	0	0	0
344	Insulin glulisine	1	0	0	0	1	0	0	0
345	Interferon alfa-2b	8	0	0	0	8	0	0	0
346	Interferon beta-1a	6	0	0	0	6	0	0	0
347	Interferon beta-1b	1	0	0	0	1	0	0	0
348	Iodine	6	0	0	0	6	0	0	0
349	Iodixanol	2	0	0	0	2	0	0	0
350	Iohexol	8	0	0	0	6	0	2	0
351	Iopromide	6	0	0	0	3	0	3	0
352	Ipidacrine	22	0	0	0	22	0	0	0
353	Irbesartan	1	0	0	0	1	0	0	0
354	Irbesartan and diuretics	1	0	0	0	1	0	0	0
355	Iron, parenteral preparations	4	0	0	0	4	0	0	0
356	Iron, vitamin B12 and folic acid	2	0	0	0	2	0	0	0
357	Isoniazid	468	0	0	0	418	0	50	0
358	Isosorbide dinitrate	38	0	0	0	37	0	1	0
359	Isosorbide mononitrate	17	0	0	0	17	0	0	0
360	Isotretinoin	1	0	0	0	1	0	0	0
361	Isoxsuprine	3	0	0	0	3	0	0	0

362	Itraconazole	11	0	0	0	11	0	0	0
363	Ivabradine	6	0	0	0	6	0	0	0
364	Josamycin	7	0	0	0	5	0	2	0
365	Kanamycin	866	0	0	0	695	0	171	0
366	Kanamycin; Kanamycin	2	0	0	0	2	0	0	0
367	Ketamine	5	0	0	0	5	0	0	0
368	Ketoconazole	3	0	0	0	3	0	0	0
369	Ketoprofen	17	0	0	0	16	0	1	0
370	Ketorolac	54	0	0	0	49	0	5	0
371	Ketotifen	4	0	0	0	4	0	0	0
372	Lactic acid producing organisms, combinations	4	0	0	0	4	0	0	0
373	Lactulose	1	0	0	0	1	0	0	0
374	Lamivudine and abacavir	68	0	0	0	61	0	7	0
375	Lamivudine, tenofovir disoproxil and efavirenz	7	0	0	0	6	0	1	0
376	Lamotrigine	15	0	0	0	13	0	2	0
377	Lansoprazole	1	0	0	0	1	0	0	0
378	Lansoprazole, clarithromycin and tinidazole	2	0	0	0	2	0	0	0
379	Latanoprost	1	0	0	0	1	0	0	0
380	Leflunomide	3	0	0	0	3	0	0	0
381	Lercanidipine	8	0	0	0	8	0	0	0
382	Lespedeza bicolor**	1	0	0	0	1	0	0	0
383	Letrozole	1	0	0	0	1	0	0	0
384	Levamisole	1	0	0	0	1	0	0	0
385	Levetiracetam	5	0	0	0	4	0	1	0
386	Levocarnitine	7	0	0	0	6	0	1	0
387	Levocetirizine	15	0	0	0	15	0	0	0
388	Levodopa and decarboxylase inhibitor	3	0	0	0	3	0	0	0
389	Levodropropizine	21	0	0	0	21	0	0	0
390	Levofloxacin	1029	0	1	0	930	0	98	0
391	Levofloxacin and ornidazole	5	0	0	0	4	0	1	0
392	Levomepromazine	3	0	0	0	3	0	0	0
393	Levonorgestrel	1	0	0	0	1	0	0	0
394	Levothyroxine sodium	8	0	1	0	6	0	1	0
395	Lidocaine	238	0	0	0	194	0	44	0
396	Lincomycin	31	0	0	0	30	0	1	0
397	Linezolid	180	0	0	0	140	0	40	0
398	Lisinopril	73	0	0	0	71	0	2	0
399	Lisinopril and amlodipine	14	0	0	0	13	0	1	0

400	Lisinopril and diuretics	32	0	0	0	32	0	0	0
401	Lomefloxacin	2	0	0	0	2	0	0	0
402	Loperamide	2	0	0	0	2	0	0	0
403	Lopinavir and ritonavir	242	0	0	0	228	0	14	0
404	Loratadine	9	0	0	0	9	0	0	0
405	Lornoxicam	19	0	0	0	17	0	2	0
406	Losartan	55	0	0	0	53	0	2	0
407	Losartan and diuretics	5	0	0	0	5	0	0	0
408	Lysine	79	0	0	0	76	0	3	0
409	Magnesium (different salts in combination)	21	0	0	0	19	0	2	0
410	Magnesium orotate	1	0	0	0	1	0	0	0
411	Magnesium sulfate	48	0	0	0	47	0	1	0
412	Mannitol	4	0	0	0	4	0	0	0
413	Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated	65	9	0	0	40	0	12	13
414	Mebeverine	10	0	0	0	10	0	0	0
415	Mebhydrolin	6	0	0	0	6	0	0	0
416	Mebicar	3	0	0	0	3	0	0	0
417	Mecobalamin	2	0	0	0	2	0	0	0
418	Mefenamic acid	28	0	0	0	27	0	1	0
419	Melatonin	1	0	0	0	1	0	0	0
420	Meldonium	92	0	0	0	85	0	7	0
421	Meloxicam	77	0	0	0	73	0	4	0
422	Memantine	6	0	0	0	6	0	0	0
423	Menadione	1	0	0	0	1	0	0	0
424	Meningococcus A,C,Y,W-135, tetravalent purified polysaccharides antigen conjugated	1	1	0	0	0	0	0	1
425	Mepivacaine	1	0	0	0	0	0	1	0
426	Meropenem	15	0	0	0	13	0	2	0
427	Mesterolone	3	0	3	0	0	0	0	0
428	Metamizole sodium	64	0	0	0	57	0	7	0
429	Metamizole sodium, combinations excl. psycholeptics	8	0	0	0	6	0	2	0
430	Metamizole sodium, combinations with psycholeptics	6	0	0	0	6	0	0	0
431	Metformin	104	0	1	0	100	0	3	0
432	Metformin and sulfonamides	2	0	0	0	2	0	0	0
433	Methadone	3	0	0	0	3	0	0	0
434	Methionine	1	0	0	0	1	0	0	0
435	Methotrexate	15	0	0	0	13	0	2	0

436	Methyldopa	3	0	0	0	3	0	0	0
437	Methylprednisolone	7	0	0	0	7	0	0	0
438	Methyluracil*	3	0	0	0	3	0	0	0
439	Metoclopramide	28	0	0	0	26	0	2	0
440	Metoprolol	23	0	0	0	22	0	1	0
441	Metronidazole	87	0	0	0	84	0	3	0
442	Mexidol*	87	0	0	0	85	0	2	0
443	Mianserin	6	0	0	0	5	0	1	0
444	Miconazole	1	0	0	0	1	0	0	0
445	Midecamycin	2	0	0	0	2	0	0	0
446	Mineral salts in combination	1	0	0	0	1	0	0	0
447	Mirtazapine	2	0	0	0	2	0	0	0
448	Misoprostol	2	0	0	0	2	0	0	0
449	Molsidomine	17	0	0	0	17	0	0	0
450	Mometasone	12	0	0	0	12	0	0	0
451	Mono	126	0	0	1	116	1	8	0
452	Montelukast	9	0	0	0	9	0	0	0
453	Montelukast, combinations	7	0	0	0	7	0	0	0
454	Morphine	10	0	0	0	9	0	1	0
455	Morphine, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
456	Moxifloxacin	101	0	0	0	87	0	14	0
457	Moxonidine	5	0	0	0	5	0	0	0
458	Multienzymes (lipase, protease etc.)	27	0	0	0	27	0	0	0
459	Multivitamins and other minerals, incl. combinations	7	0	0	0	7	0	0	0
460	Multivitamins and trace elements	3	0	0	0	3	0	0	0
461	Mycophenolic acid	3	0	0	0	2	0	1	0
462	Myramistin*	8	0	0	0	8	0	0	0
463	Nabumetone	1	0	0	0	1	0	0	0
464	Nadroparin	1	0	0	0	1	0	0	0
465	Naftifine	1	0	0	0	1	0	0	0
466	Nalbuphine	26	0	0	0	24	0	2	0
467	Naphazoline	3	0	0	0	2	0	1	0
468	Naproxen	5	0	0	0	4	0	1	0
469	Natamycin	3	0	0	0	3	0	0	0
470	Nebivolol	12	0	0	0	12	0	0	0
471	Neostigmine	4	0	0	0	4	0	0	0
472	Nevirapine	16	0	0	0	14	0	2	0
473	Nicergoline	8	0	0	0	8	0	0	0

474	Nicotinic acid	36	0	0	0	36	0	0	0
475	Nifedipine	31	0	0	0	31	0	0	0
476	Nifuratel	1	0	0	0	1	0	0	0
477	Nifuroxazide	23	0	0	0	21	0	2	0
478	Nikethamide	2	0	0	0	1	0	1	0
479	Nimesulide	63	0	0	0	59	0	4	0
480	Nitrendipine	1	0	0	0	1	0	0	0
481	Nitrofurantoin	10	0	0	0	10	0	0	0
482	Nitroxoline	10	0	0	0	10	0	0	0
483	Norethisterone	3	0	0	0	3	0	0	0
484	Norfloxacin	23	0	0	0	22	0	1	0
485	Nystatin	1	0	0	0	1	0	0	0
486	Octreotide	5	0	0	0	5	0	0	0
487	Ofloxacin	19	0	0	0	18	0	1	0
488	Ofloxacin and ornidazole	6	0	0	0	6	0	0	0
489	Olanzapine	4	0	0	0	3	0	1	0
490	Olodaterol and tiotropium bromide	1	0	0	0	1	0	0	0
491	Olopatadine	1	0	0	0	1	0	0	0
492	Ombitasvir, paritaprevir and ritonavir	4	0	0	0	4	0	0	0
493	Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids	2	0	0	0	2	0	0	0
494	Omeprazole	41	0	0	0	41	0	0	0
495	Omeprazole, amoxicillin and clarithromycin	3	0	0	0	3	0	0	0
496	Ondansetron	7	0	0	0	6	0	1	0
497	Opium derivatives and expectorants	1	0	0	0	1	0	0	0
498	Ordinary salt combinations	3	0	0	0	3	0	0	0
499	Ornidazole	27	0	0	0	24	0	3	0
500	Ornithine*	14	0	0	0	11	0	3	0
501	Other bacterial vaccines	3	0	0	0	3	0	0	0
502	Oxaliplatin	7	0	0	0	5	0	2	0
503	Oxybuprocaine	2	0	0	0	2	0	0	0
504	Oxybutynin	1	0	0	0	1	0	0	0
505	Oxymetazoline	11	0	0	0	11	0	0	0
506	Oxytocin	10	0	0	0	9	0	1	0
507	Paclitaxel	17	0	1	0	12	0	4	0
508	Pamidronic acid	1	0	0	0	1	0	0	0
509	Pantoprazole	32	0	0	0	30	0	2	0
510	Papaverine	11	0	0	0	11	0	0	0
511	Paracetamol	106	0	0	0	100	0	6	0

512	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	87	0	0	0	81	0	6	0
513	Paroxetine	11	0	0	0	11	0	0	0
514	Pazopanib	1	0	0	0	1	0	0	0
515	Peginterferon alfa-2a	1	0	0	0	1	0	0	0
516	Peginterferon alfa-2b	2	0	0	0	2	0	0	0
517	Pelargonii radix**	5	0	0	0	5	0	0	0
518	Pentoxifylline	130	0	0	0	120	0	10	0
519	Perindopril	8	0	0	0	8	0	0	0
520	Perindopril and amlodipine	11	0	0	0	11	0	0	0
521	Perindopril and bisoprolol	2	0	0	0	2	0	0	0
522	Perindopril and diuretics	9	0	0	0	9	0	0	0
523	Perindopril, amlodipine and indapamide	25	0	0	0	25	0	0	0
524	Permethrin	1	0	0	0	1	0	0	0
525	Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids	1234	49	0	0	1096	0	80	58
526	Phenibut	28	0	0	0	27	0	1	0
527	Phenol	18	0	0	0	16	0	2	0
528	Phenylephrine	7	0	0	0	7	0	0	0
529	Phenylephrine, combinations	2	0	0	0	1	0	1	0
530	Phenytoin	1	0	0	0	1	0	0	0
531	Phthalylsulfathiazole	3	0	0	0	3	0	0	0
532	Pilocarpine	1	0	0	0	1	0	0	0
533	Pilocarpine, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
534	Pioglitazone	2	0	0	0	2	0	0	0
535	Pipecuronium bromide	1	0	0	0	0	0	1	0
536	Pipemidic acid	2	0	0	0	2	0	0	0
537	Piperacillin and enzyme inhibitor	2	0	0	0	1	0	1	0
538	Piracetam	29	0	0	0	27	0	2	0
539	Piroxicam	2	0	0	0	1	0	1	0
540	Pitofenone and analgesics	68	0	0	0	58	0	10	0
541	Plantago**	1	0	0	0	1	0	0	0
542	Platyphylline*	8	0	0	0	6	0	2	0
543	Poliomyelitis oral, bivalent, live attenuated	12	1	0	0	8	0	1	3
544	Poliomyelitis, trivalent, inactivated, whole virus	82	7	0	0	53	0	19	10
545	Potassium chloride	2	0	0	0	2	0	0	0
546	Potassium iodide	4	0	0	0	4	0	0	0
547	Povidone-iodine	18	0	0	0	18	0	0	0
548	Pramipexole	1	0	0	0	1	0	0	0

549	Prednisolone	4	0	0	0	4	0	0	0
550	Pregabalin	47	0	0	0	47	0	0	0
551	Prenoxdiazine	2	0	0	0	2	0	0	0
552	Prifinium bromide	5	0	0	0	4	0	1	0
553	Procaine	21	0	0	0	16	0	5	0
554	Prochlorperazine	3	0	0	0	3	0	0	0
555	Progesterone	19	0	0	0	19	0	0	0
556	Promestriene	1	0	0	0	1	0	0	0
557	Propafenone	2	0	0	0	2	0	0	0
558	Propofol	10	0	0	0	8	0	2	0
559	Propranolol	10	0	0	0	8	0	2	0
560	Propyphenazone, combinations with psycholeptics	2	0	0	0	2	0	0	0
561	Protargol*	2	0	0	0	1	0	1	0
562	Protionamide	672	0	0	0	603	0	69	0
563	Pyrantel	1	0	0	0	1	0	0	0
564	Pyrazinamide	2417	0	0	1	2029	0	387	0
565	Pyridoxine (vit B6)	31	0	0	0	31	0	0	0
566	Quercetin*	4	0	0	0	4	0	0	0
567	Quetiapine	26	0	0	0	25	0	1	0
568	Quifenadine	1	0	0	0	1	0	0	0
569	Rabeprazole	13	0	0	0	12	0	1	0
570	Rabies immunoglobulin	9	0	0	0	9	0	0	0
571	Rabies, inactivated, whole virus	3	0	0	0	2	0	0	1
572	Racecadotril	1	0	0	0	1	0	0	0
573	Ramipril	29	0	0	0	29	0	0	0
574	Ramipril and amlodipine	9	0	0	0	9	0	0	0
575	Ramipril and diuretics	4	0	0	0	4	0	0	0
576	Ranitidine	6	0	0	0	5	0	1	0
577	Ranolazine	1	0	0	0	1	0	0	0
578	Rebamipide	6	0	0	0	6	0	0	0
579	Reserpine and diuretics, combinations with other drugs	1	0	0	0	1	0	0	0
580	Retinol (vit A)	5	0	0	0	5	0	0	0
581	Ribavirin	3	0	0	0	3	0	0	0
582	Rifabutin	10	0	0	0	9	0	1	0
583	Rifampicin	483	0	0	0	414	0	69	0
584	Rifampicin and isoniazid	64	0	0	0	61	0	3	0
585	Rifampicin, ethambutol, isoniazid*	2	0	0	0	1	0	1	0

586	Rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and isoniazid	180	0	0	0	154	0	26	0
587	Rifamycin	1	0	0	0	1	0	0	0
588	Rifaximin	1	0	0	0	0	0	1	0
589	Rimantadine	9	0	0	0	9	0	0	0
590	Risperidone	90	0	0	0	90	0	0	0
591	Rituximab	6	0	0	0	5	0	1	0
592	Rivaroxaban	5	0	0	0	4	0	1	0
593	Rivastigmine	1	0	0	0	1	0	0	0
594	Rizatriptan	2	0	0	0	2	0	0	0
595	Rosa**	3	0	0	0	3	0	0	0
596	Rosuvastatin	21	0	0	0	21	0	0	0
597	Rosuvastatin and amlodipine	1	0	0	0	1	0	0	0
598	Rutoside, combinations	6	0	0	0	6	0	0	0
599	Sabalís serrulatae fructus	1	0	0	0	1	0	0	0
600	Saccharated iron oxide	13	0	0	0	13	0	0	0
601	Saccharomyces boulardii	1	0	0	0	1	0	0	0
602	Salbutamol	17	0	0	0	17	0	0	0
603	Salicylamide, combinations excl. psycholeptics	1	0	0	0	1	0	0	0
604	Salmeterol and fluticasone	3	0	0	0	3	0	0	0
605	Secnidazole	1	0	0	0	1	0	0	0
606	Serrapeptase*	15	0	0	0	14	0	1	0
607	Sertaconazole	3	0	0	0	2	0	1	0
608	Sertraline	7	0	0	0	7	0	0	0
609	Silicones	9	0	0	0	9	0	0	0
610	Silver sulfadiazine	1	0	0	0	1	0	0	0
611	Silymarin	6	0	0	0	6	0	0	0
612	Simvastatin	68	0	0	0	68	0	0	0
613	Sodium aminosalicilate	415	0	0	0	356	0	59	0
614	Sodium bicarbonate	3	0	0	0	3	0	0	0
615	Sodium chloride	44	0	0	10	12	10	12	0
616	Sodium citrate	1	0	0	0	1	0	0	0
617	Sodium lauryl sulfoacetate, incl. combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
618	Sodium oksodyhydroakrydynilatsetat (Cridanimod*)	2	0	0	0	2	0	0	0
619	Sodium oxybate	1	0	0	0	1	0	0	0
620	Sodium picosulfate	1	0	0	0	1	0	0	0
621	Somatropin	1	0	0	1	0	0	0	0
622	Sotalol	3	0	0	0	2	0	1	0

623	Spiramycin	14	0	0	0	13	0	1	0
624	Spironolactone	42	0	0	0	42	0	0	0
625	Streptokinase	6	0	0	0	2	0	4	0
626	Sulfacetamide	5	0	0	0	5	0	0	0
627	Sulfadimethoxine	2	0	0	0	2	0	0	0
628	Sulfamethoxazole and trimethoprim	63	0	0	0	55	0	8	0
629	Sulfanilamide	3	0	0	0	2	0	1	0
630	Sulfasalazine	2	0	0	0	2	0	0	0
631	Sulfathiazole	1	0	0	0	1	0	0	0
632	Sulfocamphocain*	8	0	0	0	7	0	1	0
633	Sulodexide	2	0	0	0	2	0	0	0
634	Sulpiride	10	0	0	0	10	0	0	0
635	Sumatriptan	8	0	0	0	8	0	0	0
636	Suxamethonium	2	0	0	0	0	0	2	0
637	Tacrolimus	1	0	0	0	0	0	1	0
638	Tamoxifen	1	0	0	0	1	0	0	0
639	Tamsulosin	10	0	0	0	10	0	0	0
640	Tamsulosin and dutasteride	1	0	0	0	1	0	0	0
641	Taurine*	4	0	0	0	4	0	0	0
642	Teicoplanin	3	0	0	0	3	0	0	0
643	Telmisartan	12	0	0	0	12	0	0	0
644	Temozolomide	1	0	0	0	1	0	0	0
645	Tenofovir disoproxil	27	0	0	0	23	0	4	0
646	Tenofovir disoproxil and emtricitabine	84	0	0	0	64	0	20	0
647	Tenonitrozone	1	0	0	0	1	0	0	0
648	Tenoxicam	4	0	0	0	4	0	0	0
649	Terbinafine	3	0	0	0	3	0	0	0
650	Terizidone	66	0	0	0	49	0	17	0
651	Tetanus toxoid	1	0	0	0	1	0	0	0
652	Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid	121	6	0	0	110	0	5	6
653	Tetracycline	2	0	0	0	2	0	0	0
654	Tetryzoline	1	0	0	0	1	0	0	0
655	Thalidomide	1	0	0	0	1	0	0	0
656	Theophylline	43	0	0	0	40	0	3	0
657	Theophylline, combinations excl. psycholeptics	11	0	0	0	11	0	0	0
658	Thiamazole	4	0	0	0	3	0	1	0
659	Thiamine (vit B1)	38	0	0	0	37	0	1	0
660	Thiocolchicoside	2	0	0	0	2	0	0	0

661	Thioctic acid	69	0	0	0	63	0	6	0
662	Thiopental	10	0	0	0	6	0	4	0
663	Thioridazine	5	0	0	0	4	0	1	0
664	Thiosulfate	15	0	0	0	14	0	1	0
665	Thiotriazolin*	15	0	0	0	15	0	0	0
666	Tiazotic acid	40	0	0	0	40	0	0	0
667	Ticagrelor	3	0	0	0	2	0	1	0
668	Tigecycline	1	0	0	0	1	0	0	0
669	Tilorone (Amixin)*	16	0	0	0	15	0	1	0
670	Timolol	2	0	0	0	2	0	0	0
671	Timolol, combinations	7	0	0	0	7	0	0	0
672	Tizanidine	22	0	0	0	21	0	1	0
673	Tobramycin	8	0	0	0	7	0	1	0
674	Tolperisone	9	0	0	0	9	0	0	0
675	Topiramate	6	0	0	0	6	0	0	0
676	Torasemide	11	0	1	0	10	0	0	0
677	Tramadol	6	0	0	0	6	0	0	0
678	Tranexamic acid	27	0	0	0	26	0	1	0
679	Trastuzumab	2	0	0	0	1	0	1	0
680	Travoprost	1	0	0	0	1	0	0	0
681	Trazodone	5	0	0	0	4	0	1	0
682	Triamcinolone	2	0	0	0	2	0	0	0
683	Trifluoperazine	66	0	0	0	65	0	1	0
684	Trihexyphenidyl	1	0	0	0	1	0	0	0
685	Trimebutine	16	0	0	0	16	0	0	0
686	Trimetazidine	43	0	1	0	42	0	0	0
687	Tropicamide	3	0	0	0	3	0	0	0
688	Troxerutin	5	0	0	0	5	0	0	0
689	Troxerutin, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
690	Tuberculin	1	0	0	0	0	0	0	1
691	Tuberculosis, live attenuated	25	3	0	0	2	0	2	21
692	Tyrothricin	1	0	0	0	1	0	0	0
693	Umifenovir	5	0	0	0	5	0	0	0
694	Urapidil	7	0	0	0	7	0	0	0
695	Ursodeoxycholic acid	10	0	0	0	10	0	0	0
696	Valaciclovir	3	0	0	0	3	0	0	0
697	Valerianae radix	3	0	0	0	3	0	0	0
698	Validol*	4	0	0	0	4	0	0	0
699	Valproic acid	17	0	0	0	17	0	0	0

700	Valsartan	19	0	0	0	19	0	0	0
701	Valsartan and amlodipine	25	0	0	0	25	0	0	0
702	Valsartan and diuretics	16	0	0	0	16	0	0	0
703	Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide	14	0	0	0	14	0	0	0
704	Vancomycin	20	0	0	0	19	0	1	0
705	Venlafaxine	2	0	0	0	2	0	0	0
706	Verapamil	19	0	0	0	19	0	0	0
707	Vincamine	2	0	0	0	2	0	0	0
708	Vincristine	2	0	0	0	2	0	0	0
709	Vinorelbine	1	0	0	0	1	0	0	0
710	Vinpocetine	29	0	0	0	26	0	3	0
711	Viride nitens*	5	0	0	0	5	0	0	0
712	Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12	141	0	0	0	135	0	6	0
713	Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination	1	0	0	0	1	0	0	0
714	Vortioxetine	2	0	0	0	2	0	0	0
715	Warfarin	9	0	0	0	7	0	2	0
716	Xantinol nicotinate	28	0	0	0	24	0	4	0
717	Xylometazoline	13	0	0	0	12	0	1	0
718	Xylometazoline, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
719	Zaleplon	4	0	0	0	4	0	0	0
720	Zidovudine	3	0	0	0	3	0	0	0
721	Zidovudine and lamivudine	230	0	0	0	200	0	30	0
722	Zinc oxide*	1	0	0	0	1	0	0	0
723	Zoledronic acid	3	0	0	0	3	0	0	0
724	Zolmitriptan	1	0	0	0	1	0	0	0
725	Zopiclone	1	0	0	0	1	0	0	0
726	Zuclopenthixol	42	0	0	0	38	0	4	0
727	Невідомо	40	0	0	0	31	0	9	0
Всього		24354	93	12	28	21795	12	2372	135
Примітка: *		<> – несприятливі події, що співпали у часі з проведенням щеплення/туберкулінодіагностики (введення імуноглобулінів), на які станом на 31.12.2018 не отримано Протоколів розслідування регіональних груп оперативного реагування на 84 випадки(ів)							
		ве – відсутність ефективності ЛЗ							
		нн – несерйозна непередбачена ПР ЛЗ							
		нп – несерйозна передбачена ПР ЛЗ							
		сн – серйозна непередбачена ПР ЛЗ							
		сп – серйозна передбачена ПР ЛЗ							
		НППІ – несприятлива подія після імунізації							

3. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛАСУ ХВОРОБ ПРИ ЛІКУВАННІ ЯКИХ ВОНИ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ

Таблиця 3

КЛАСИ ХВОРОБ (ВІДПОВІДНО ДО МКХ-10), ПРИ ЛІКУВАННІ АБО ПРОФІЛАКТИЦІ ЯКИХ БУЛИ ВИЯВЛЕНІ ПР/НППІ ЛЗ

№ з.п.	Клас	Код	Назва класу хвороб, відповідно до МКХ-10	Кількість ПР/НППІ	%
1	I	A00-B99	Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	9518	38,86%
2	II	C00-D48	Новоутворення	262	1,07%
3	III	D50-D89	Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму	57	0,23%
4	IV	E00-E90	Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин	356	1,45%
5	IX	I00-I99	Хвороби системи кровообігу	3234	13,20%
6	V	F00-F99	Розлади психіки та поведінки	774	3,16%
7	VI	G00-G99	Хвороби нервової системи	392	1,60%
8	VII	H00-H59	Хвороби ока та придаткового апарату	135	0,55%
9	VIII	H60-H95	Хвороби вуха та соскоподібного відростка	103	0,42%
10	X	J00-J99	Хвороби системи дихання	3160	12,90%
11	XI	K00-K93	Хвороби органів травлення	1021	4,17%
12	XII	L00-L99	Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	229	0,93%
13	XIII	M00-M99	Хвороби кістково-м'язової системи та сполученої тканини	839	3,43%
14	XIV	N00-N99	Хвороби сечостатевої системи	693	2,83%
15	XIX	S00-T98	Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	232	0,95%
16	XV	O00-O99	Вагітність, пологи та післяпологовий період	214	0,87%
17	XVI	P00-P96	Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	5	0,02%
18	XVII	Q00-Q99	Природжені вади розвитку, деформації та хромосомної аномалії	13	0,05%
19	XVIII	R00-R99	Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	72	0,29%
20	XX	V01-Y98	Зовнішні причини захворюваності та смертності	13	0,05%
21	XXI	Z00-Z99	Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та звертання до закладів охорони здоров'я	1847	7,54%
22			Стан, що не підпадає під класифікацію МКХ-10	1327	5,42%
Всього				24496	100,00 %

4. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРАЇНИ-ВИРОБНИКА ЛЗ

Таблиця 4

РОЗПОДІЛ ВИПАДКІВ ПР/НППІ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРАЇНИ-ВИРОБНИКА

№ з.п.	Країна-виробник	Кількість	%
1	Австрія	124	0,51%

2	Бельгія	130	0,53%
3	Білорусь	47	0,19%
4	Болгарія	139	0,57%
5	Боснія і Герцеговина	14	0,06%
6	Велика Британія	237	0,97%
7	Вірменія	2	0,01%
8	Греція	229	0,93%
9	Данія	81	0,33%
10	Естонія	1	0,00%
11	Єгипет	22	0,09%
12	Ізраїль	13	0,05%
13	Індія	9926	40,52%
14	Індонезія	7	0,03%
15	Іран	57	0,23%
16	Ірландія	16	0,07%
17	Ісландія	30	0,12%
18	Іспанія	131	0,53%
19	Італія	191	0,78%
20	Йорданія	51	0,21%
21	Канада	37	0,15%
22	Кіпр	65	0,27%
23	КНР	11	0,04%
24	Латвія	374	1,53%
25	Литва	6	0,02%
26	Македонія	32	0,13%
27	Мальта	42	0,17%
28	Нідерланди	138	0,56%
29	Німеччина	819	3,34%
30	Норвегія	4	0,02%
31	Пакистан	5	0,02%
32	Палестина	1	0,00%
33	Південна Корея	49	0,20%
34	Польща	189	0,77%
35	Португалія	2	0,01%
36	Пуерто-Рико	1	0,00%
37	Росія	109	0,44%
38	Румунія	99	0,40%
39	Сербія	42	0,17%
40	Сингапур	2	0,01%

41	Словаччина	18	0,07%
42	Словенія	363	1,48%
43	США	16	0,07%
44	Таїланд	5	0,02%
45	Туреччина	96	0,39%
46	Угорщина	359	1,47%
47	Україна	9055	36,97%
48	Фінляндія	17	0,07%
49	Франція	367	1,50%
50	Хорватія	40	0,16%
51	Чехія	32	0,13%
52	Швейцарія	81	0,33%
53	Швеція	12	0,05%
54	Японія	226	0,92%
55	Не визначено	334	1,36%
Всього		24496	100,00%

5. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА СИСТЕМНИМИ ПРОЯВАМИ

Таблиця 5

СИСТЕМНІ ПРОЯВИ ПР/НППІ ЛЗ

№ з/п	Системи і органи	Кількість	%
1	Загальні розлади та порушення у місці введення	6474	14,17%
2	Інфекції та інвазії	59	0,13%
3	Конгенітальні спадкові та генетичні розлади	1	0,00%
4	Обстеження	2471	5,41%
5	Психічні розлади	1591	3,48%
6	Респіраторні, торакальні та медіастинальні розлади	1538	3,37%
7	Розлади внаслідок хірургічних та медичних процедур / Інфузійні реакції	5	0,01%
8	Розлади з боку гепатобіліарної системи	377	0,83%
9	Розлади з боку ендокринної системи	19	0,04%
10	Розлади з боку імунної системи	296	0,65%
11	Розлади з боку кровотворної та лімфатичної системи	232	0,51%
12	Розлади з боку нервової системи	5524	12,09%
13	Розлади з боку нирок і сечовидільної системи	333	0,73%
14	Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини	1893	4,14%
15	Розлади з боку органів зору	447	0,98%
16	Розлади з боку органів слуху та рівноваги	1285	2,81%
17	Розлади з боку серцевої системи	980	2,15%
18	Розлади з боку статевих органів/ репродуктивної системи та молочної залози	134	0,29%

19	Розлади з боку судинної системи	458	1,00%
20	Розлади з боку шкіри та підшкірних тканин	10649	23,31%
21	Розлади метаболізму, обміну речовин	678	1,48%
22	Соціальна дезорієнтація	2	0,00%
23	Травми, ушкодження та процедурні ускладнення	61	0,13%
24	Шлунково-кишкові розлади	10021	21,94%
25	Не визначено	156	0,34%
Всього		45684	100,00%

6. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ВСТАНОВЛЕНИМ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ, ПЕРЕДБАЧЕНІСТЮ ТА СТУПЕНЕМ СЕРЙОЗНОСТІ

Таблиця 6а
РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ВСТАНОВЛЕНИМ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ

№ з/п	Встановлено причинно-наслідковий зв'язок	Кількість	%
1	визначений	2817	5,88%
2	імовірний	26193	54,64%
3	можливий	18561	38,72%
4	не підлягає класифікації	0	0,00%
5	сумнівний	26	0,05%
6	умовний	0	0,00%
7	не визначений	344	0,72%
Всього		47941	100,00%

Таблиця 6б
РОЗПОДІЛ ПРОЯВІВ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ПЕРЕДБАЧЕНІСТЮ

№ з/п	Передбаченість проявів ПР	Кількість	%
1	Передбачена	47415	98,90%
2	Непередбачена	104	0,22%
3	Не вказано	422	0,88%
Всього		47941	100,00%

Таблиця 6в
РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ПРИЧИНОЮ СЕРЙОЗНОСТІ

№ з/п	Причина серйозності випадку ПР	Кількість	%
1	загроза життю	414	17,29%
2	смерть пацієнта	25	1,13%
3	госпіталізація амбулаторного пацієнта	550	22,97%
4	продовження термінів госпіталізації	504	21,05%

5	тривала непрацездатність	21	0,88%
6	інвалідність	40	1,67%
7	інший медично важливий стан здоров'я	838	35,00%
8	вроджені вади розвитку	0	0,00%
Всього		2394	100,00 %

Таблиця 6д

РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА СТУПЕНЕМ СЕРЙОЗНОСТІ

№ з/п	Ступінь серйозності	Кількість	%
1	Серйозні	2280	9,68%
2	Несерйозні	21271	90,32%
Всього		23551	100,00%

Таблиця 6е

ДАНІ ПРО ВИПАДКИ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ПР

№ з.п.	ЛЗ	Форма випуску	Виробник	Опис ПР
1	АЛФЛУТОП	розчин для ін'єкцій по 1 мл в ампулах; по 10 ампул у картонній коробці	КО "Біотехнос" А.Т.	Після застосування препарату 14.03.18 р. не відчув терапевтичної дії даного препарату, але відчув погіршення самопочуття, що призвело до тимчасового погіршення зору, головокружіння, нудоти, блювання. Раніше неодноразово цей препарат вже вживався і побічні реакції не виникали.
2	ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ	розчинник для парентерального застосування по 2 мл в ампулі; по 10 або 100 ампул у пачці; по 5 мл в ампулі; по 10 або 100 ампул у пачці; по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у пачці; по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у пачці; по 10 мл в ампулі; по 5 або 10, або 100 ампул у пачці; по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	07.08.2018 відразу після внутрішньовенного введення 500 мг Цераксоне, розчиненого у 10 мл води для ін'єкцій (2 ампули по 5 мл), у пацієнта виникли прояви ПР: відчуття жару в тілі, почервоніння обличчя, запаморочення. До цього Цераксон вже застосовувався, розчинений у воді для ін'єкцій іншого виробника іншої серії, подібних проявів не відмічалось. Прояви даної побічної реакції зникли протягом доби без проведення медикаментозної терапії.

3	ГЛЮКОЗА	розчин для інфузій, 100 мг/мл по 200 мл або 400 мл у контейнерах полімерних; по 200 мл або 400 мл у пляшках скляних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
4	ГЛЮКОЗА	розчин для інфузій, 100 мг/мл по 200 мл або 400 мл у контейнерах полімерних; по 200 мл або 400 мл у пляшках скляних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
5	ГЛЮКОЗА	розчин для інфузій, 50 мг/мл по 100 мл або 200 мл, або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл, або 1000 мл, або 2000 мл, або 3000 мл, або 5000 мл у контейнерах полімерних; по 200 мл або 400 мл у пляшках скляних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
6	ГРОУТРОПІН	розчин для ін'єкцій, 8 МО/мл по 0,5 мл (4 МО/1,34 мг) або по 2 мл (16 МО /5,34 мг) у флаконі; по 1 або по 10 флаконів у картонній коробці	Донг-А СТ Ко., Лтд	папульозні висипання на передпліччі, плечі та стегнах
7	ДУФАСТОН®	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг, по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 14 або 28 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Абботт Біолоджікалз Б.В.	діарея до 5 р/д
8	ЕНТЕРОСГЕЛЬ ЕКСТРАКАПС	капсули по 0,32 г по 7 капсул у блістері; по 1, 2 або 4 блістери у коробці з картону	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ"	Через 2-2,5 години після застосування 1 капсули підозрюваного ЛЗ відчувала дискомфорт, задишку, виник набряк обличчя, особливо губи та щок. Було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Після огляду жінки, лікарем швидкої медичної допомоги, було проведено медикаментозну терапію по усуненню проявів побічної реакції: дексаметазон 1 мл в/м, супрастин 1 мл в/м. Після проведених заходів невідкладної медичної допомоги, стан жінки покращився, дихання стало вільним, набряк зменшився.
9	ЕРЕСПАЛ®	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг № 30 (15x2) у блістерах	Лабораторії Серв'є Індастрі	миготлива аритмія, вперше виявлена
10	НАТРІЮ ХЛОРИД	Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 2 мл або 5 мл у контейнерах № 10; по 10 мл або 20 мл у контейнерах № 5; по 5 мл або 10 мл в	ТОВ "Юрія-Фарм"	Озноб, гіпертермія, судомний синдром

		ампулах № 5 (5x1), № 10 (5x2)		
11	НАТРІЮ ХЛОРИД	Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, по 2 мл або 5 мл у контейнерах одноступових; по 10 контейнерів у пачці; по 10 мл або 20 мл у контейнерах одноступових; по 5 контейнерів у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній упаковці; по 1 або 2 контурні чарункові упаковки в пачці	ТОВ "Юрія-Фарм"	озноб, задишка, слабкість, головний біль, тремтіння усього тіла, підвищення температури тіла до 39°C.
12	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, по 2 мл або 5 мл у контейнерах одноступових; по 10 контейнерів у пачці; по 10 мл або 20 мл у контейнерах одноступових; по 5 контейнерів у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній упаковці; по 1 або 2 контурні чарункові упаковки в пачці	ТОВ "Юрія-Фарм"	озноб, задишка, слабкість, тремтіння усього тіла, підвищення температури тіла до 39,3°C, блідість шкіряних покривів
13	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, по 2 мл або 5 мл у контейнерах одноступових; по 10 контейнерів у пачці; по 10 мл або 20 мл у контейнерах одноступових; по 5 контейнерів у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній упаковці; по 1 або 2 контурні чарункові упаковки в пачці	ТОВ "Юрія-Фарм"	озноб, задишка, слабкість, тремтіння усього тіла, підвищення температури тіла до 39,3°C, блідість шкіряних покривів
14	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 50 мг/мл по 200 мл у пляшках, по 200 мл, 400 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
15	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл або 200 мл або 400 мл у пляшках; по 100 мл або 200 мл або 250 мл або 400 мл або 500 мл або 1000 мл або 2000 мл або 3000 мл або 5000 мл у контейнерах полімерних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Озноб, гіпертермія, судомний синдром
16	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл або 200 мл або 400 мл у пляшках; по 100 мл або 200 мл або 250 мл або 400 мл або 500 мл або 1000 мл або 2000 мл або 3000 мл або 5000 мл у контейнерах полімерних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Озноб, гіпертермія, судомний синдром

17	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл або 200 мл або 400 мл у пляшках; по 100 мл або 200 мл або 250 мл або 400 мл або 500 мл або 1000 мл або 2000 мл або 3000 мл або 5000 мл у контейнерах полімерних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Озноб, гіпертермія, судомний синдром
18	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл або 200 мл або 400 мл у пляшках; по 100 мл або 200 мл або 250 мл або 400 мл або 500 мл або 1000 мл або 2000 мл або 3000 мл або 5000 мл у контейнерах полімерних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Озноб, судомний синдром, гіпертермія
19	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл або 200 мл або 400 мл у пляшках; по 100 мл або 200 мл або 250 мл або 400 мл або 500 мл або 1000 мл або 2000 мл або 3000 мл або 5000 мл у контейнерах полімерних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
20	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл або 200 мл або 400 мл у пляшках; по 100 мл або 200 мл або 250 мл або 400 мл або 500 мл або 1000 мл або 2000 мл або 3000 мл або 5000 мл у контейнерах полімерних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
21	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл або 200 мл або 400 мл у пляшках; по 100 мл або 200 мл або 250 мл або 400 мл або 500 мл або 1000 мл або 2000 мл або 3000 мл або 5000 мл у контейнерах полімерних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
22	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл або 200 мл або 400 мл у пляшках; по 100 мл або 200 мл або 250 мл або 400 мл або 500 мл або 1000 мл або 2000 мл або 3000 мл або 5000 мл у контейнерах полімерних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
23	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл або 200 мл або 400 мл у пляшках; по 100 мл або 200 мл або 250 мл або 400 мл або 500 мл або 1000 мл або 2000 мл або 3000 мл або 5000 мл у контейнерах полімерних	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
24	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл, або 200 мл, або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл у пляшці; по 1 пляшці в	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез"	після в/в введення L-лізину есцинат на натрії хлориді 0.9% у хворого підвищилась температура тіла до 39 °С, озноб

		картонній коробці; по 100 мл, по 200 мл або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл у пляшках		
25	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл, або 200 мл, або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл у пляшці; по 1 пляшці в картонній коробці; по 100 мл, по 200 мл або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл у пляшках	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез"	після в/в введення L-лізину есцинат на натрії хлориді 0.9% у хворого підвищилась температура тіла до 39 °С, озноб, гіперемія обличчя
26	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл, або 200 мл, або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл у пляшці; по 1 пляшці в картонній коробці; по 100 мл, по 200 мл або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл у пляшках	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез"	після в/в введення L-лізину есцинат на натрії хлориді 0.9% у хворого підвищилась температура тіла, озноб
27	НАТРІЮ ХЛОРИД	Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл, по 200 мл, 400 мл у пляшках, по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл, 5000 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	Виражений озноб, задишка, слабкість, утруднене дихання, підвищення температури тіла до 38,5 градусів.
28	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл або 400 мл в пляшках скляних	ПАТ "Галичфарм"	озноб, «мармуровість» шкіряних покривів, підвищення температури тіла до 40,1°С., неспокій
29	НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл або по 400 мл у флаконах	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	судоми
30	РІНГЕРА РОЗЧИН	розчин для інфузій по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл у контейнері з полівінілхлориду; по 1 контейнеру у плівковій упаковці	Дочірнє підприємство "Фарматрейд"	тремор в тілі, підвищення температури та артеріального тиску
31	РОЗЧИН РІНГЕРА	Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках; по 250 мл, або по 500 мл, або по 2500 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	Під час в/в крапельної інфузії розчину Рінгера з'явилася задишка, озноб, синюшність губ, підвищення АТ до 220/110 мм рт.ст.
32	РОЗЧИН РІНГЕРА	Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках; по 250 мл, або по 500 мл, або по 2500 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	Часте дихання до 26 в 1 хв., тахікардія до 120 ударів в 1 хв., озноб, почервоніння обличчя, підвищення тиску до 140/90 мм.рт.ст.

33	ТРИСОЛЬ	Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках, по 200 мл або по 400 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
34	ТРИСОЛЬ	Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках, по 200 мл або по 400 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
35	ТРИСОЛЬ	Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках, по 200 мл або по 400 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
36	ТРИСОЛЬ	Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках, по 200 мл або по 400 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
37	ТРИСОЛЬ	Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках, по 200 мл або по 400 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.
38	ТРИСОЛЬ	Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках, по 200 мл або по 400 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	Після введення ЛЗ у хворого спостерігалось значне підвищення температури тіла та лихоманка.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПАДКИ ПР ЛЗ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНО, ТА НППІ (ЛЕТАЛЬНІ ВИПАДКИ)

Таблиця 7а

ВИПАДКИ ПР ЛЗ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНО

№ з/п	Вік	Стать	Підозрювані ЛЗ	Опис ПР	Діагноз/Покази
1	33 р.	чол	ДИТИЛІН-БІОЛІК	Заключний клінічний діагноз: Закритий застарілий травматологічний розрив трьохголового м'язу лівого плеча. ТЕЛА. Гостра серцево-судинна недостатність. Набряк легень. Набряк мозку. Стан після реанімації. Анафілактичний шок?	S46 Травма м'язи і сухожилля на рівні плечевого пояса і плеча
			ТІОПЕНТАЛ	Заключний клінічний діагноз: Закритий застарілий травматологічний розрив трьохголового м'язу лівого плеча. ТЕЛА. Гостра серцево-судинна недостатність	S46 Травма м'язи і сухожилля на рівні плечевого

				Набряк легень. Набряк мозку. Стан після реанімації. Анафілактичний шок?	пояса и плеча
2	4 р.	жін	НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ	Клінічний діагноз основний: Фолікулярна ангіна. Ускладнення: Анафілактичний шок, як побічна реакція на адекватно призначені та правильно застосовані лікарські засоби.	J03.9 Фолікулярна ангіна (в якості розчинника для цефтриаксону)
			ЦЕФТРИАКСОН	Клінічний діагноз основний: Фолікулярна ангіна. Ускладнення: Анафілактичний шок, як побічна реакція на адекватно призначені та правильно застосовані лікарські засоби.	J03.9 Фолікулярна ангіна
3	66 р.	жін	АРДУАН®	Анафілактичний шок, бронхоспазм, наступила клінічна смерть. Протягом 5 хв пацієнтка була виведена з цього стану за допомогою реанімаційних заходів. В подальшому стан важкий, що пов'язано з постреанімаційною хворобою, гіпоксичною енцефалопатією та супутньою хронічною патологією (ІХС, дифузний к/с, ДЕП змішаного генезу (гіпертонічного, атеросклеротичного)). Смерть наступила внаслідок гіпоксичного ураження мозку та синдрому поліорганної недостатності 04.03.2018 р.	Оперативне втручання (екстерпація матки) - для міорелаксації
4	15 міс.	чол	ТІОПЕНТАЛ	Причиною смерті П.І.І. з'явився шок на введення лікарських засобів, які використовувалися для наркозу при оперативному лікуванні вродженої пахової грижі.	знеболення
5	26 міс.	чол	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Синдром Рея внаслідок випадкового застосування Ацетилсаліцилової кислоти (за віком дитини). G 93.7/X 40. Т 39.0. Поліорганна недостатність: мозкова кома 4 ст., печінкова недостатність, серцево-судинна недостатність, дихальна недостатність, ДВЗ-синдром, ниркова недостатність, вентиляторно-асоційована пневмонія	J06.9 гіпертермія на тлі ГРВІ
6	63 р.	жін	НАТРІЮ ХЛОРИД	Заключний клінічний діагноз: Анафілактичний шок, блискавична форма, важкий перебіг. Новоутворення правої нирки. Ішемічна хвороба серця. Атеросклеротичний кардіосклероз. Атеросклероз аорти та коронарних артерій. Цукровий діабет. Аліментарне ожиріння.	C64.0

			УЛЬТРАВІСТ 370	Заключний клінічний діагноз: Анафілактичний шок, блискавична форма, важкий перебіг. Новоутворення правої нирки. Ішемічна хвороба серця. Атеросклеротичний кардіосклероз. Атеросклероз аорти та коронарних артерій. Цукровий діабет. Аліментарне ожиріння.	C64.0 Новоутворення правої нирки
7	22 р.	чол	ЛОНГОКАїн® ХЕВІ	Основний: Побічна дія спінальної анестезії препаратом Лонгокаїн® Хеві в ранньому післяопераційному періоді. Ускладнення: Гостра серцево-судинна та легенева недостатність. Супутній: Паренхіматозна дистрофія міокарда. Вогнища простого ожиріння серця. Жирова дистрофія печінки. Жирове переродження підшлункової залози. Вогнищевий панкреосклероз. Паренхіматозна дистрофія нирок. Пілонідальна кіста куприка. Післяопераційний стан: операція «Розтин та дренування кісти куприка, що нагноїлась». Видано остаточне свідоцтво про смерть № 1234. а) Гостра серцево-судинна та легенева недостатність. Т 88.5 б) Інші ускладнення анестезії. У 48.3 г) Побічна дія анестезуючих засобів місцевої дії.	L05 Пілонідальна кіста куприка
8	48 р.	жін	АРТИФРИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Анафілактична реакція з тоніко-клонічними судомами. Смерть в присутності бригади.	Знеболення в стоматології

Таблиця 76

ВИПАДКИ НППІ (ЛЕТАЛЬНІ ВИПАДКИ), ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ВАКЦИН ТА МАЮТЬ ЧАСОВИЙ ЗВ'ЯЗОК З ПРОВЕДЕНИМ ЩЕПЛЕННЯМ

№ з/п	Вік	Стать	Підозрювані ЛЗ	Опис НППІ	Діагноз/Покази
1	1 р.	чол	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Менінгококова інфекція. Менінгококцемія, блискавична форма. Синдром Уотерхауса-Фрідерікса. Інфекційно-токсичний шок. Поліорганна недостатність.	Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту В
2	3 д.	чол	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	Геморагічна хвороба новонародженого.	Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу

3	15 д.	жін	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	Вроджена вада серця. Надкляпаний стеноз аорти. Гіпоплазія висхідної аорти та дуги аорти. Надкляпаний стеноз гілок легеневої артерії. Відкрите овальне вікно. Легенева гіпертензія новонароджених. Гостра серцева недостатність. Q25.	Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу
4	6 міс.	чол	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, 3 Ц	Гостра менінгококцемія, синдром Уотерхауса-Фрідеріксена (крововилив в обидва наднирники)	Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії, правця та кашлюку
			ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Гостра менінгококцемія, синдром Уотерхауса- Фрідеріксена (крововилив в обидва наднирники)	Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту В
			ІМОВАКС ПОЛІО ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА РІДКА	Гостра менінгококцемія, синдром Уотерхауса- Фрідеріксена (крововилив в обидва наднирники)	Z24.0 Необхідність імунізації проти поліомієліту
5	6 міс.	жін	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, 3 Ц	Респіраторний стан спричинений невідомим зовнішнім агентом, що призвело до гіпоксемії та дихальної недостатності.	Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії, правця та кашлюку
			ІМОВАКС ПОЛІО ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА РІДКА	Респіраторний стан спричинений невідомим зовнішнім агентом, що призвело до гіпоксемії та дихальної недостатності.	Z24.0 Необхідність імунізації проти поліомієліту
6	23 д.	жін	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Синдром раптової смерті немовля.	Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту В
7	1 міс.	чол	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Серцево-легенева недостатність. Пневмонія	Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту В

8	7 міс.	чол	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, 3 Ц	Легенево-серцева недостатність. Пневмонія.	Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії, правця та кашлюку
			ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Легенево-серцева недостатність. Пневмонія.	Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту В
9	3 міс.	чол	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, 3 Ц	Гостра кишкова інфекція (Клебсієла Оскітока 10*6 та Сальмонела Бледам 10*6), інфекційно-токсичний шок, синдром поліорганної недостатності: дихальної, серцево-судинної, гострої ниркової, інтестинальної, церебральної; набряку та набухання головного мозку.	Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії, правця та кашлюку
			ІМОВАКС ПОЛІО ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА РІДКА	Гостра кишкова інфекція (Клебсієла Оскітока 10*6 та Сальмонела Бледам 10*6), інфекційно-токсичний шок, синдром поліорганної недостатності: дихальної, серцево-судинної, гострої ниркової, інтестинальної, церебральної; набряку та набухання головного мозку.	Z24.0 Необхідність імунізації проти поліомієліту
10	2 р.	чол	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Смерть дитини настала від набряку головного мозку.	Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту В
11	3 міс.	чол	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, 3 Ц	Легенева недостатність, пневмонія.	Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії, правця та кашлюку
12	1 міс.	чол	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	Відкрита артеріальна протока, ускладнена гострою серцево-легеневою недостатністю.	Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу
			ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА	Відкрита артеріальна протока, ускладнена гострою серцево-легеневою недостатністю.	Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту В

			РІДКА		
13	2 р.	жін	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, 3 Ц	Вроджена гідроцефалія. Мікрополігірія. Церебральна недостатність. Імунодефіцит.	Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії, правця та кашлюку
			ІМОВАКС ПОЛІО ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА РІДКА	Вроджена гідроцефалія. Мікрополігірія. Церебральна недостатність. Імунодефіцит.	Z24.0 Необхідність імунізації проти поліомієліту
14	7 міс.	жін	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, 3 Ц	Гостра респіраторна вірусна інфекція.	Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії, правця та кашлюку
			ПОЛІО САБІН™ ДВОВАЛЕНТНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ТИПІВ 1	Гостра респіраторна вірусна інфекція.	Z24.0 Необхідність імунізації проти поліомієліту
15	1 міс.	жін	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛЮФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	Механічна асфіксія внаслідок закриття отворів носа та рота.	Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу
16	1 міс.	чол	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Двобічна вірусна пневмонія, ускладнена гострою серцево-легеневою недостатністю	Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту В
17	6 міс.	жін	ВАКЦИНА КОН'ЮГОВАНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗБУДНИКОМ ЯКИХ Є НАЕ	Механічна асфіксія. Аспірація шлункового вмісту.	Z25.8 Необхідність імунізації проти НІВ інфекції
			ПОЛІО САБІН™ ДВОВАЛЕНТНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ТИПІВ 1	Механічна асфіксія. Аспірація шлункового вмісту.	Z24.0 Необхідність імунізації проти поліомієліту

8. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ВІД ПОЧАТКУ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ




Рисунок 1. РОЗВИТОК ПР/НППІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ЛІКУВАННЯ ЛЗ

9. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ З ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ




Рисунок 2. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ ЛЗ

10. РОЗПОДІЛ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНДЕРНИХ ТА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Таблиця 8


ГЕНДЕРНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПР/НППІ ЛЗ

Діти						
Вік	дівчата		хлопчики		невідомо	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
0-27 днів	7	0,03 %	18	0,08 %	1	0,00 %
28 днів-23 місяці	640	2,72 %	681	2,89 %	39	0,17 %
2-11 років	752	3,19 %	778	3,30 %	44	0,19 %
12-17 років	255	1,08 %	201	0,85 %	8	0,03 %
Усього	1654	7,02 %	1678	7,12 %	92	0,39 %

Дорослі						
Вік, роки	жінки		чоловіки		невідомо	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
18-30	1457	6,19 %	1053	4,47 %	44	0,19 %
31-45	2818	11,97 %	3609	15,32 %	130	0,55 %
46-60	2551	10,83 %	2945	12,50 %	92	0,39 %
61-72	2074	8,81 %	1333	5,66 %	75	0,32 %
73-80	861	3,66 %	403	1,71 %	42	0,18 %
більше 80	422	1,79 %	143	0,61 %	10	0,04 %
Усього	10183	43,24 %	9486	40,28 %	393	1,67 %

Вік невідомий						
Вік, роки	жінки		чоловіки		невідомо	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
-	20	0,08 %	40	0,17 %	5	0,02 %
Усього	20	0,08 %	40	0,17 %	5	0,02 %

11. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗАСТОСОВАНИХ ЛЗ (СЛЗ – супутні ЛЗ)



**Рисунок 3. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗАСТОСОВАНИХ
ЛЗ**