Перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, які відпускаються без рецептів та мають зберігатись при температурі від не вище 25 °С.									
№	**Торгова назва**	**МНН**	**Форма випуску**	**Заявник**	**Країна заявника**	**Виробник**	**Країна виробника**	**№ реєстраційного посвідчення**	**Умови зберігання**
1	L-МАЙ	Levocetirizine	краплі оральні, 5 мг/мл, по 20 мл в контейнері з пробкою-крапельницею, закритому кришкою із захистом від дітей; по 1 контейнеру у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії / контроль якості)	Україна	UA/17438/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. Після відкриття контейнера використати протягом 3 місяців.
2	L-МАЙ	Levocetirizine	краплі оральні, 5 мг/мл, по 20 мл в контейнері з пробкою-крапельницею, закритому кришкою із захистом від дітей; по 1 контейнеру у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії / контроль якості)	Україна	UA/17438/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. Після відкриття контейнера використати протягом 3 місяців.
3	L-ЦЕТ®	Levocetirizine	сироп, 2,5 мг/5 мл по 60 мл або по 100 мл у флаконах із поліетилену або скла, по 1 флакону з мірною ложкою у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/8612/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона препарат зберігати не більше 4 тижнів.
4	L-ЦЕТ®	Levocetirizine	таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 3, або по 10 блістерів у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/8612/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

5	А-ДІСТОН	Comb drug	краплі для перорального застосування по 30 мл або по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/5666/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.
6	АБ'ЮФЕН	Mono	таблетки по 400 мг; по 15 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в картонній коробці	Лабораторії Бушара Рекордаті	Франція	Лабораторії Бушара Рекордаті	Франція	UA/5702/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
7	АБРОЛ®	Ambroxol	розчин для інгаляцій та перорального застосування, 15 мг/2 мл по 100 мл у скляному флаконі з кришкою з контролем першого відкриття; кожен флакон у картонній упаковці разом зі шприцом-дозатором об’ємом 5 мл та адаптером для шприца; по 100 мл у скляному флаконі з кришкою, недоступною для відкриття дітьми; кожен флакон у картонній упаковці разом зі шприцом-дозатором об’ємом 5 мл та адаптером для шприца	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/9928/04/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

8	АБРОЛ®	Ambroxol	розчин для інгаляцій та перорального застосування, 15 мг/2 мл по 100 мл у скляному флаконі з кришкою з контролем першого відкриття; кожен флакон у картонній упаковці разом зі шприцом-дозатором об’ємом 5 мл та адаптером для шприца; по 100 мл у скляному флаконі з кришкою, недоступною для відкриття дітьми; кожен флакон у картонній упаковці разом зі шприцом-дозатором об’ємом 5 мл та адаптером для шприца	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/9928/04/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
9	АБРОЛ®	Ambroxol	сироп, 15 мг/5 мл; по 100 мл у флаконі з поліетилену або скла; по 1 флакону з мірною скляночкою в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/9928/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона препарат зберігати не більше 6 місяців.
10	АБРОЛ®	Ambroxol	сироп, 30 мг/5 мл; по 100 мл у флаконі з поліетилену або скла; по 1 флакону з мірною скляночкою в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/9928/02/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона препарат зберігати не більше 6 місяців.

11	АБРОЛ®	Ambroxol	таблетки по 30 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"(виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або вторинне пакування, контроль якості, випуск серії продукції із in bulk)/КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД(виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД» (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або вторинне пакування, контроль якості,	Україна/ Індія/ Україна	UA/9928/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
12	АБРОЛ® SR	Ambroxol	капсули з пролонгованою дією, по 75 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/9928/05/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

13	АБРОЛ® SR	Ambroxol	капсули з пролонгованою дією, по 75 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "КУСУМ"	Україна/ Україна	UA/9928/05/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
14	АВЕНЮ®	Diosmin, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг; по 10 таблеток у блістері, по 3 або 5 блістерів у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/14394/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
15	АГВАНТАР	Levocarnitine	розчин для орального застосування 20 %, по 30 мл або по 100 мл у контейнері; по 1 контейнеру разом з дозуючим шприцем та/або мірним стаканчиком в картонній пачці	ТОВ "Ерсель Фарма Україна"	Україна	Шанель Медікал (повний цикл виробництва)/ПрАТ "Технолог" (повний цикл виробництва)	Ірландія/ Україна	UA/11554/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
16	АГЕРП	Aciclovir	крем 5 % по 2 г в тубі, по 1 тубі в пеналі, по 1 пеналу в пачці з картону або по 10 г в тубі, по 1 тубі в пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/12909/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

17	АГЕРП	Aciclovir	крем 5 %, по 2 г в тубі; по 1 тубі в пеналі; по 1 пеналу в пачці з картону, по 2,5 г або 10 г в тубі; по 1 тубі в пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/12909/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
18	АГРОПІРОН ГЛОБУЛІ ВЕЛАТІ	Comb drug	гранули гомеопатичні по 20 г у флаконі; по 1 флакону в коробці з картону	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/15543/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
19	АДВАНТАН®	Methylprednisolone	крем 0,1 % по 5 г або 15 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ЛЕО Фарма А/С	Данія	ЛЕО Фарма Мануфактурінг Італі СРЛ	Італія	UA/0784/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
20	АДВАНТАН®	Methylprednisolone	крем 0,1 % по 5 г або 15 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ЛЕО Фарма А/С	Данія	ЛЕО Фарма Мануфактурінг Італі СРЛ	Італія	UA/0784/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
21	АДЕНОМА-ГРАН	Comb drug	гранули по 10 г гранул у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону або по 10 г гранул у флаконі з кришкою; по 1 флакону в пачці з картону, або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/8296/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25оС.

22	АЕВІТ®	Combinations of vitamins	капсули м'які, по 10 капсул у блістерах; по 10 капсул у блістері, по 1, або 3, або по 5 блістерів у пачці; по 20 капсул у блістері, по 1, або 2, або по 3 блістери у пачці; по 50 капсул у блістері, по 1 блістеру у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/7362/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
23	АЕВІТ® ЛАЙТ	Comb drug	капсули м'які, по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/17758/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
24	АЕКОЛ	Comb drug	розчин олійний по 50 мл або 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/1603/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
25	АЕРТАЛ®	Aceclofenac	крем, 15 мг/1 г по 60 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці	ВАТ "Гедеон Ріхтер"	Угорщина	ВАТ "Гедеон Ріхтер"	Угорщина	UA/13910/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці!
26	АЗВЕСТІВ	Calcium, combinations with vitamin D and/or other drugs	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18149/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
27	АЙДРІНК®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину зі смаком лимону; по 4,8 г в саше; по 10 саше в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/14813/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

28	АЙДРІНК®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину зі смаком чорної смородини по 5,2 г в саше; по 10 саше в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/14814/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
29	АКАРД	Acetylsalicylic acid	таблетки кишковорозчинні, по 150 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або по 5 блістерів в картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	UA/5687/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
30	АКАРД	Acetylsalicylic acid	таблетки кишковорозчинні, по 75 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 або по 5 блістерів в картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	UA/5687/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
31	АКВА СПРЕЙ ОКСІ	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,05 %, по 10 мл у флаконі полімерному з розпилювачем назальним; по 1 флакону в пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17924/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого розкриття — 6 місяців.

32	АКВА СПРЕЙ ОКСІ	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,05 %, по 10 мл у флаконі полімерному з розпилювачем назальним; по 1 флакону в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕДСТАВНИЦТВО БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17924/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого розкриття — 6 місяців.
33	АКВАМАКС	Sodium chloride	краплі назальні 0,65 %, по 20 мл у флаконі з кришкою крапельницею зі скляною піпеткою; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна	UA/12832/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

34	АКВАМАКС	Sodium chloride	спрей назальний 0,65 %, по 20 мл у флаконах з клапаном-насосом, назальною насадкою-розпилювачем; по 1 флакону в коробці з картону; по 50 мл або по 100 мл у флаконах з клапаном-насосом, назальною насадкою-розпилювачем; по 1 флакону в коробці з картону; по 50 мл, по 100 мл або по 150 мл у балоні з клапан-пакетом, назальною насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 балону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна	UA/12832/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
35	АКК®	Aminocaproic acid	розчин, 50 мг/мл; по 2 мл у контейнерах однодозових полімерних; по 10 контейнерів у коробці з картону	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	UA/11103/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
36	АКНЕСТОП®	Azelaic acid	крем, 0,2 г/г по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/7011/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

37	АЛЕРГЕНЕЛ	Levocetirizine	оральний розчин, 2,5 мг/5 мл; по 75 мл або 150 мл у флаконі, по 1 флакону з мірним ковпачком у картонній коробці	ВІВ ЛАЙФ ЛЛП	Індія	Вівімед Лабс Лтд	Індія	UA/20365/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона зберігати не більше 3 місяців.
38	АЛЕРГОДИЛ®	Azelastine	спрей назальний дозований, 1 мг/мл; по 10 мл у флаконі з нагвинченим розпилювачем; по 1 флакону в картонній упаковці	МЕДА Фарма ГмбХ енд Ко. КГ	Німеччина	МАДАУС ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)	Німеччина	UA/4072/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не охолоджувати. Препарат зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат використати протягом 6 місяців.
39	АЛЕРГОДИЛ®	Azelastine	спрей назальний дозований, 1 мг/мл; по 10 мл у флаконі з нагвинченим розпилювачем; по 1 флакону в картонній упаковці	Віатріс Хелскеа ГмбХ	Німеччина	МАДАУС ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)	Німеччина	UA/4072/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не охолоджувати. Препарат зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат використати протягом 6 місяців.
40	АЛЕРГОЗАН®	Desloratadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма"	Болгарія	UA/17179/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С.

41	АЛЕРГОЛІК	Levocetirizine	таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 2, або по 3 блістери у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/14441/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
42	АЛЕРГОМАКС	Comb drug	краплі назальні, розчин по 15 мл у флаконі з кришкою-крапельницею зі скляною піпеткою; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/11696/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
43	АЛЕРГОМАКС	Comb drug	спрей назальний, розчин, по 15 мл у флаконі з насадкою-розпилювачем і захисним ковпачком у коробці; по 15 мл у балоні з насадкою-розпилювачем і захисним ковпачком у коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/11696/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
44	АЛЕРГОСТОП®	Desloratadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)	Україна	UA/10337/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

45	АЛЕРДЕЗ	Desloratadine	сироп, 0,5 мг/мл; по 50 мл та по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з дозувальним пристроєм в пачці; по 100 мл у банці; по 1 банці разом з дозувальним пристроєм в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/14492/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Після розкриття флакону термін придатності препарату 30 діб при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
46	АЛЕРДЕЗ	Desloratadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/14492/02/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
47	АЛЕРЗИН	Levocetirizine	краплі оральні, розчин 5 мг/мл по 20 мл у флаконі з крапельницею, по 1 флакону з крапельницею в картонній коробці	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	UA/9862/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати! Після відкриття флакона зберігати не більше 6 тижнів.
48	АЛЕРІК	Loratadine	таблетки по 10 мг, по 7 або по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Юнілаб, ЛП	США	ТОВ ЮС Фармація	Польща	UA/7560/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 С.
49	АЛЕРОН	Levocetirizine	таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери в картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Емкур Фармасьютікалс Лтд	Індія	UA/5615/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

50	АЛКОДЕЗ® ІС	Metadoxine*	таблетки по 0,5 г, по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/12717/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
51	АЛЛЕГРА® 120 МГ	Fexofenadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 120 мг; № 10, № 20 (10х2): по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Санофі Вінтроп Індастріа	Франція	UA/8500/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
52	АЛЛЕГРА® 180 МГ	Fexofenadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 180 мг; № 10, № 20 (10х2): по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Санофі Вінтроп Індастріа	Франція	UA/8500/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
53	АЛЛЕРГОФРІ	Levocetirizine	таблетки по 5 мг; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці	Сімпекс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Сімпекс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	UA/16628/01/01	Зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
54	АЛЛЕРГОФРІ	Levocetirizine	таблетки по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 10 блістерів у картонній упаковці	Сімпекс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Сімпекс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	UA/16628/01/01	Зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

55	АЛЛЕРТЕК®	Cetirizine	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг; по 7 або по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А.	Польща	UA/6422/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від вологи, світла та недоступному для дітей місці.
56	АЛЛЕРТЕК® ДЕРМА	Dimetindene	гель, 1 мг/г, по 5 г, 20 г, 30 г або 50 г в алюмінієвій тубі з мембраною, з кришкою з ПЕВП, оснащеною пробійником, по 1 тубі в картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (випуск серії; виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості)	Польща	UA/20722/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
57	АЛМАГЕЛЬ®	Ordinary salt combinations	суспензія оральна по 170 мл у флаконі скляному або з поліетилентерефталату; по 1 флакону з мірною ложкою в картонній коробці; по 10 мл у пакетику; по 10 або 20 пакетиків у картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Троян АТ	Болгарія	UA/3264/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Не заморожувати! Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Термін придатності лікарського засобу після першого відкриття флакона – 3 місяці.
58	АЛМАГЕЛЬ® А	Aluminium hydroxide, combinations*	суспензія оральна по 170 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці разом з дозувальною ложкою; по 10 мл у пакетику, по 10 або 20 пакетиків у картонній пачці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Троян АТ	Болгарія	UA/0879/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С.Не допускати замерзання! Зберігати у місцях, недоступних для дітей! Після першого розкриття флакона суспензію можна зберігати протягом 3 місяців у зазначених умовах.

59	АЛМАГЕЛЬ® А	Aluminium hydroxide, combinations*	суспензія оральна по 170 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці разом з дозувальною ложкою; по 10 мл у пакетику, по 10 або 20 пакетиків у картонній пачці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Троян АТ	Болгарія	UA/0879/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С.Не допускати замерзання! Зберігати у місцях, недоступних для дітей! Після першого розкриття флакона суспензію можна зберігати протягом 3 місяців у зазначених умовах.
60	АЛМАГЕЛЬ® М	Ordinary salt combinations	таблетки для смоктання зі смаком вишні; по 6 таблеток у блістері; по 4 або по 8 блістерів у коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	ПЛІВА Хрватска д.о.о.	Хорватія	UA/3993/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
61	АЛМАГЕЛЬ® М	Ordinary salt combinations	таблетки для смоктання зі смаком м'яти, по 6 таблеток у блістері; по 4 або по 8 блістерів у коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	ПЛІВА Хрватска д.о.о.	Хорватія	UA/3991/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
62	АЛМАГЕЛЬ® НЕО	Ordinary salt combinations and antiflatulents	суспензія для перорального застосування по 170 мл або по 200 мл у скляному або поліетиленфталатному флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложкою в картонній пачці; по 10 мл у пакетику, по 10 або 20 пакетиків у картонній пачці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Троян АТ	Болгарія	UA/7938/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Після першого відкриття флакона лікарський засіб можна зберігати протягом 30 днів у зазначених умовах.
63	АЛМІБА	Levocarnitine	розчин оральний, 100 мг/мл по 10 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній пачці	Гранд Медикал Груп АГ	Швейцарія	Анфарм Еллас С.А.	Греція	UA/12947/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

64	АЛОРА®	Pasiflora incarnata**	сироп по 100 мл у флаконі, по 1 флакону разом з мірною ложкою в картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/5140/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після першого відкриття сироп зберігати протягом 6 місяців.
65	АЛОРА®	Pasiflora incarnata**	таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 2 або 5 блістерів у картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/5140/02/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
66	АЛОХОЛ	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 або 50 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону; по 180 таблеток у контейнері пластиковому; по 1 контейнеру в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/ТОВ "Агрофарм" (фасування та пакування)	Україна/ Україна	UA/2355/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
67	АЛТЕЇ КОРЕНЯ СИРОП	Althea root	сироп, по 100 мл або по 200 мл у флаконах скляних або полімерних; по 1 флакону разом з мірною ложкою або мірним стаканчиком у пачці; по 100 мл або по 200 мл у флаконах скляних або полімерних	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/11860/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після розкриття зберігати не більше 14 діб при температурі 4-8 °С.

68	АЛТЕЙКА	Althea root	таблетки для жування по 0,12 г; по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 5 блістерів у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/5454/02/01	Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
69	АЛТЕЙКА-ТЕРНОФАРМ	Althea root	сироп по 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з ложкою мірною або стаканом мірним у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/14469/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після розкриття зберігати не більше 14 діб при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
70	АЛТЕЙКА ГАЛИЧФАРМ	Althea root	сироп по 100 мл у банці скляній або у флаконі скляному; по 1 банці або флакону з ложкою мірною в пачці ; по 100 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону з ложкою мірною в пачці; по 200 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону з ложкою мірною в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/12480/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після розкриття зберігати не більше 14 діб при температурі 4–8 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
71	АЛТЕЙКА ГАЛИЧФАРМ	Althaea officinalis**	таблетки жувальні по 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 2 або по 10 блістерів у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/12480/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

72	АЛТЕМІКС	Althea root	сироп, 25 мг/5 мл, по 100 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з мірною ложкою у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/7157/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Після розкриття флакона зберігати у прохолодному місці не більше 10 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці.
73	АЛТЕМІКС БРОНХО	Comb drug	сироп по 50 мл або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з ложкою мірною у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/13552/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Термін придатності препарату після розкриття флакона у прохолодному місці не більше 10 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці.
74	АЛТІВА	Fexofenadine	таблетки, вкриті оболонкою, по 180 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	UA/4100/01/02	Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.
75	АЛЬГІМАКС	Comb drug	суспензія оральна по 180 г у флаконі полімерному; по 1 флакону з ложкою мірною у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/17295/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не зберігати в холодильнику та не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

76	АЛЬГОЗАН®	Comb drug	гель по 35 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/14102/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
77	АЛЬПЕКІД ДЕНТО	Comb drug	таблетки по 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці; по 30 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/5193/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
78	АЛЬПЕКІД ДОРМІ	Comb drug	таблетки, по 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці або по 30 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/4951/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
79	АЛЬПЕКІД ІМУНО	Comb drug	таблетки, по 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці; по 30 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/5397/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

80	АЛЬТАБОР	Altabor**	таблетки по 20 мг, по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці; по 20 або 60 таблеток у контейнерах пластикових з кришкою з контролем першого розкриття	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/10229/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.
81	АЛЬТАН	Altan**	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/2636/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
82	АЛЬТАНОВА МАЗЬ	Comb drug	мазь, по 25 г у тубі, по 1 тубі у пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/2636/02/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.
83	АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛУ АЦЕТАТ (ВІТАМІН Е)	Tocopherol (vit E)	розчин олійний оральний, 100 мг/мл, по 20 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/6656/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

84	АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛУ АЦЕТАТ (ВІТАМІН Е)	Tocopherol (vit E)	розчин олійний оральний, 300 мг/мл, по 20 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/6656/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
85	АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛУ АЦЕТАТ (ВІТАМІН Е)	Tocopherol (vit E)	розчин олійний оральний, 50 мг/мл, по 20 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/6656/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
86	АМБРОКСОЛ	Ambroxol	сироп, 15 мг/5 мл по 100 мл у банці або у флаконі; по 1 банці або по 1 флакону разом з дозуючою скляночкою в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8134/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття упаковки препарат придатний протягом 6 місяців.
87	АМБРОКСОЛ	Ambroxol	сироп, 15 мг/5 мл по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці у пачці разом зі стаканом мірним або ложкою мірною; по 100 мл у банці скляній; по 1 банці у пачці разом зі стаканом дозуючим або ложкою мірною	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17014/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Термін придатності після першого розкриття — 6 місяців. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
88	АМБРОКСОЛ	Ambroxol	сироп, 15 мг/5 мл по 100 мл у флаконі або банці; по 1 флакону або 1 банці з ложкою мірною в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/1587/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

89	АМБРОКСОЛ	Ambroxol	таблетки по 0,03 г, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 50 або 100 блістерів у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"	Україна	UA/6958/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
90	АМБРОКСОЛ	Ambroxol	таблетки по 30 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/7939/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
91	АМБРОКСОЛ	Ambroxol	таблетки по 30 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/7939/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
92	АМБРОКСОЛ	Ambroxol	таблетки по 30 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/1587/02/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
93	АМБРОКСОЛ	Ambroxol	таблетки по 30 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат" /ТОВ "Маріфарм"	Україна/ Словенія	UA/2084/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

94	АМБРОКСОЛ	Ambroxol	таблетки по 30 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна/ Україна	UA/0438/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
95	АМБРОКСОЛ-ДАРНИЦЯ	Ambroxol	таблетки по 30 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/5703/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

96	АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ'Я	Ambroxol	сироп, 15 мг/5 мл; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложкою в картонній коробці; по 2,5 мл або 5 мл, або 10 мл у саше; по 20 саше в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/5897/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С . Зберігати у недоступному для дітей місці.

97	АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Ambroxol	сироп, 30 мг/5 мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложкою в картонній коробці; по 5 мл у саше; по 20 саше у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"(всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/5897/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
98	АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ`Я	Ambroxol	розчин для інгаляцій та перорального застосування, 15 мг/2 мл; по 50 мл або по 100 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону зі стаканом мірним у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/16542/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
99	АМБРОКСОЛ-КВ	Ambroxol	таблетки по 30 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/7012/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

100	АМБРОКСОЛ-ТЕВА	Ambroxol	капсули пролонгованої дії тверді по 75 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру у коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (первинна та вторинна упаковка, контроль серії; дозвіл на випуск серії)/Ацино Фарма АГ (виробництво нерозфасованої продукції та контроль серії (фізико-хімічні випробування))/Унтерзухунгсінститут Хеппелер (контроль серії)/Ацино Естонія ОУ (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)	Німеччина/ Швейцарія/ Німеччина /Естонія	UA/1853/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

101	АМБРОКСОЛ 15	Ambroxol	сироп, 15 мг/5 мл по 50 мл у флаконі полімерному, по 1 флакону разом з ложкою дозувальною в пачці; по 100 мл у флаконі полімерному або банці полімерній; по 1 флакону або по 1 банці разом з ложкою дозувальною в пачці; по 100 мл у флаконі скляному; по 1 флакону разом з ложкою дозувальною в пачці; по 120 мл у флаконі полімерному або банці полімерній; по 1 флакону або по 1 банці разом з ложкою дозувальною в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/0595/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після розкриття флакону термін придатності препарату 30 діб при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

102	АМБРОКСОЛ 30	Ambroxol	сироп, 30 мг/5 мл по 50 мл у флаконі полімерному, по 1 флакону разом з ложкою дозувальною в пачці; по 100 мл у флаконі полімерному або банці полімерній; по 1 флакону або по 1 банці разом з ложкою дозувальною в пачці; по 100 мл у флаконі скляному; по 1 флакону разом з ложкою дозувальною в пачці; по 120 мл у флаконі полімерному або банці полімерній; по 1 флакону або по 1 банці разом з ложкою дозувальною в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/0596/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після розкриття флакону термін придатності препарату 30 діб при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
103	АМБРОКСОЛ ЕКСТРА	Ambroxol	таблетки по 30 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2, 3 або по 4 блістери в коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/8801/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

104	АМБРОКСОЛУ ГІДРОХЛОРИД	Ambroxol	таблетки по 30 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (виробництво за повним циклом)/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ" (виробництво, пакування, випуск серій)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Натур+" (контроль серій)	Україна/ Україна/ Україна	UA/1437/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
105	АМБРОКСОЛУ ГІДРОХЛОРИД	Ambroxol	таблетки по 30 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/5667/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
106	АМБРОЛІТИН®	Ambroxol	сироп, 15 мг/5 мл; по 100 мл у скляному або поліетилентерефталатному флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком в картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка; дозвіл на випуск серії)	Болгарія	UA/12426/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці (в сухому, захищеному від світла місці) при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати! Термін придатності після відкриття упаковки – 1 місяць.

107	АМЕРТИЛ®	Cetirizine	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг, по 7 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2, або 3 блістери у картонній коробці	Біофарм Лтд	Польща	Біофарм Лтд	Польща	UA/2728/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
108	АМІАК	Ammonia*	розчин для зовнішнього застосування 10 %, по 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних; по 200 мл у флаконах полімерних	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3179/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
109	АМІАКУ РОЗЧИН	Ammonia*	розчин для зовнішнього застосування 10 %; по 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних; по 200 мл у флаконах скляних з контролем першого відкриття; по 40 мл, або по 100 мл, або по 200 мл у флаконах полімерних з контролем першого відкриття	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/0407/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

110	АМІАКУ РОЗЧИН 10 %	Ammonia*	розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками; по 200 мл у флаконах скляних або полімерних, укупорених кришкою; по 100 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками та кришками або кришками; по 40 мл у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0138/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
111	АМІЗОНЧИК®	Enisamium iodide	сироп, 10 мг/мл; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону та 1 дозувальній ложці в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/11862/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін зберігання препарату після відкриття флакона – 90 діб. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
112	АМІЗОН®	Enisamium iodide	таблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці з картону, по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/6493/01/02	Зберігати у захищенному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

113	АМІЗОН®	Enisamium iodide	таблетки, вкриті оболонкою, по 0,25 г по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону, по 20 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/6493/01/01	Зберігати у захищенному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
114	АМІЗОН® МАКС	Enisamium iodide	капсули по 0,5 г, по 10 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/12415/01/01	Зберігати в сухому, захищенному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
115	АМІКСИН® ІС	Tilorone	таблетки, вкриті оболонкою, по 0,06 г, по 3 таблетки у блістері; по 1, 2 або 3 блістери в пачці; по 5 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/2559/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
116	АМІКСИН® ІС	Tilorone	таблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г, по 3 таблетки у блістері; по 1, 2 або 3 блістери в пачці; по 5 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/2559/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
117	АМІЛАР® ІС	Comb drug	таблетки для розсмоктування зі смаком апельсину по 8 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/14892/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

118	АМІЛАР® ІС	Comb drug	таблетки для розсмоктування зі смаком вишні по 8 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/14893/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
119	АМІЛАР® ІС	Comb drug	таблетки для розсмоктування по 8 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/14891/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
120	АМІНАЛОН	Aminobutyric acid	таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 5, або 10 блістерів у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/4393/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
121	АМІНАЛОН®-КВ	Aminobutyric acid	капсули тверді по 250 мг; по 10 капсул у блістерах; по 10 капсул у блістері; по 5 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/1210/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
122	АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА	Aminocaproic acid	порошок для орального застосування по 1 г у саше; по 1 г у саше, по 10 саше у коробці з картону	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	UA/16974/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Готовий розчин зберігати у холодильнику при температурі 2-8 °С не більше 36 годин.

123	АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА	Aminocaproic acid	порошок для орального застосування по 1 г; № 10: по 1 г у пакеті з комбінованого матеріалу (алюмокомплексу); по 10 пакетів у коробці з картону; № 10 (2х5): по 1 г у спареному пакеті з комбінованого матеріалу (алюмокомплексу); по 5 спарених пакетів у коробці з картону; № 10 (2х5): по 1 г у спареному пакеті з поліетиленовим покриттям; по 5 спарених пакетів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/6566/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
124	АМІФЕНА® ІС	Mefenamic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 250 мг по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/16620/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
125	АМІФЕНА® ІС	Mefenamic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/16620/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
126	АМІЦИТРОН®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 23 г у саше; по 23 г у саше; по 10 саше в пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/13911/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

127	АМІЦИТРОН® БЕЗ ЦУКРУ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 13 г у саше; по 13 г у саше, по 10 саше у пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/14116/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
128	АМІЦИТРОН® ЕКСТРАТАБ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/15430/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
129	АМІЦИТРОН® ПЛЮС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 5 г у саше, по 10 саше у пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/16181/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
130	АМІЦИТРОН® ПЛЮС БЕЗ ЦУКРУ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 5 г у саше; по 10 саше у пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/16182/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
131	АМІЦИТРОН® ФОРТЕ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 23 г у саше; по 23 г у саше; по 10 саше в пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/13912/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
132	АМІЦИТРОН® ФОРТЕ БЕЗ ЦУКРУ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 13 г у саше; по 13 г у саше, по 10 саше у пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/14117/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
133	АМКЕСОЛ® УНО	Carbocisteine	сироп 2 %; по 100 мл у банці скляній; по 1 банці разом з ложкою мірною у пачці; по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці разом з ложкою мірною у пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17239/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

134	АМКЕСОЛ® УНО	Carbocisteine	сироп 5 %, по 100 мл в банці скляній; по 1 банці разом зі стаканом дозуючим у пачці з картону; по 100 мл в банці полімерній; по 1 банці разом зі стаканом мірним у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17239/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
135	АНАЛЬГІН	Metamizole sodium	таблетки по 0,5 г по 10 таблеток у блістерах	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/1410/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
136	АНАЛЬГІН	Metamizole sodium	таблетки по 0,5 г по 6 або по 10 таблеток у блістерах	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8299/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
137	АНАЛЬГІН	Metamizole sodium	таблетки по 0,5 г по 6 або по 10 таблеток у блістерах	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8299/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
138	АНАЛЬГІН	Metamizole sodium	таблетки по 0,5 г, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 2, або 3, або 10 блістерів у пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/7331/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
139	АНАЛЬГІН	Metamizole sodium	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 5, або по 10 блістерів у пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8374/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

140	АНАЛЬГІН	Metamizole sodium	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці; по 10 таблеток у блістерах	ТОВ "Агрофарм"	Україна	ТОВ "Агрофарм"	Україна	UA/7018/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
141	АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ	Metamizole sodium	таблетки по 500 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/3222/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
142	АНАЛЬГІН-ДИБАЗОЛ-ПАПАВЕРИН	Metamizole sodium, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці; по 10 таблеток у блістері	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/15689/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
143	АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ'Я	Metamizole sodium	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістерах	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/5706/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
144	АНАФЕРОН	Comb drug	таблетки, по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/2614/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
145	АНАФЕРОН ДИТЯЧИЙ	Comb drug	таблетки, по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/7756/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

146	АНГЕЛОН®	Adenosine	таблетки зі смаком ментолу по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 4 блістери в коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/19051/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
147	АНГЕЛОН®	Adenosine	таблетки зі смаком ментолу по 20 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 4 блістери в коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/19051/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
148	АНГЕЛОН®	Adenosine	таблетки по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 4 блістери в коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/18594/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
149	АНГЕЛОН®	Adenosine	таблетки по 20 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 4 блістери в коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/18594/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
150	АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС	Comb drug	льодяники зі смаком вишні; по 12 льодяників у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (дозвіл на випуск серії готового лікарського засобу)/Др. мед. Ауфдермаур АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Швейцарія	UA/8531/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

151	АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС	Comb drug	льодяники зі смаком лимону; по 12 льодяників у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (дозвіл на випуск серії готового лікарського засобу)/Др. мед. Ауфдермаур АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Швейцарія	UA/5899/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
152	АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС	Comb drug	льодяники зі смаком меду; по 12 льодяників у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (дозвіл на випуск серії готового лікарського засобу)/Др. мед. Ауфдермаур АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Швейцарія	UA/8534/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
153	АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС	Comb drug	льодяники зі смаком обліпихи; по 12 льодяників у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (дозвіл на випуск серії готового лікарського засобу)/Др. мед. Ауфдермаур АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Швейцарія	UA/8532/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

154	АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС	Comb drug	льодяники зі смаком шавлії; по 12 льодяників у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (дозвіл на випуск серії готового лікарського засобу)/Др. мед. Ауфдермаур АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)	Німеччина/ Швейцарія	UA/8533/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
155	АНГІ.НЕТ® СПРЕЙ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл; по 30 мл у флаконі з дозуючою помпою та ковпачком, по 1 флакону з насадкою-розпилювачем у картонній пачці	ТОВ "ІНФАРМА Трейдінг"	Латвійська Республіка	ЛАБОРАТОРІУМ САНІТАТІС С.Л. (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Лабораторіос Ентема С.Л. (вторинне пакування)	Іспанія/ Іспанія	UA/19962/01/01	Зберігати при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

156	АНГІЛЕКС-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	розчин для ротової порожнини; по 120 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/10126/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.
157	АНГІЛЕКС-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	спрей для ротової порожнини, по 30 мл у балоні з клапаном-насосом, насадкою-розпилювачем і захисним ковпачком; по 1 балону в картонній коробці; по 50 мл у флаконі з оральним розпилювальним пристроєм і захисним ковпачком; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/10126/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

158	АНГІН-ГРАН	Comb drug	гранули, по 10 г у пеналі полімерному або флаконі з кришкою; по 1 пеналу або флакону в пачці з картону або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/8450/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25оС.
159	АНГІН-ХЕЕЛЬ С	Comb drug	таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому; по 1 контейнеру в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/5900/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
160	АНДИПАЛ-В	Metamizole sodium, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у стрипі; по 1 стрипу у паперовому конверті; по 10 таблеток у стрипі; по 2 або по 10 стрипів у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 10 блістерів у пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/6175/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
161	АНДИПАЛ-ФОРТЕ	Metamizole sodium, combinations excl. psycholeptics	таблетки; по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у стрипі; по 2 або по 10 стрипів у пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/10129/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

162	АНДИФЕН ІС	Metamizole sodium, combinations with psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці; по 10 таблеток у блістері	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/15886/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
163	АНДИФЕН ІС	Metamizole sodium, combinations with psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці; по 10 таблеток у блістері	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/15886/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
164	АНЕСТЕЗОЛ®	Comb drug	супозиторії по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/7065/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
165	АНЗИБЕЛ®	Comb drug	пастилки зі смаком меду та лимона, по 10 пастилок у блістері; по 10 пастилок у блістері; по 1, по 2 або по 3 блістери в картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/10265/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
166	АНЗИБЕЛ®	Comb drug	пастилки зі смаком ментолу, по 10 пастилок у блістері; по 10 пастилок у блістері; по 1, по 2 або по 3 блістери в картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/10264/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
167	АНЗИБЕЛ®	Comb drug	пастилки по 10 пастилок у блістері; по 10 пастилок у блістері; по 1, по 2 або по 3 блістери в картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/10263/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

168	АНТИКАТАРАЛ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 10 пакетиків з порошком у пачці з картону	СПЕРКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД	Кіпр	ЛАБОРАТОРІОС АЛКАЛА ФАРМА, С.Л.	Іспанія	UA/7810/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
169	АНТИТРОМБ	Emoxypin*	мазь 1 % по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/7941/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
170	АНТИТУСИН	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток по 2 блістери у пачці	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8984/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
171	АНТИФЛУ®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 17 г у пакеті; по 5 пакетів у картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Контракт Фармакал Корпорейшн (первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії; виробництво in bulk)	США	UA/4910/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
172	АНТИФЛУ®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Контракт Фармакал Корпорейшен (первинна та вторинна упаковка; контроль якості, дозвіл на випуск серії; виробництво in bulk)	США	UA/4910/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

173	АНТИФЛУ® КІДС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 12 г порошку у пакеті з паперу, ламінованого алюмінієвою фольгою та поліетиленом; по 5 пакетів в картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Контракт Фармакал Корпорейшн (первинна та вторинна упаковка, контроль якості, дозвіл на випуск серії; виробництво in bulk)	США	UA/8974/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
174	АНТИФРОНТ	Comb drug	краплі оральні, розчин; по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	Біофарма Перша Венгерська Біотехнологічна Компанія (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)/ЗАТ "Береш Фарма" (контроль якості та дозвіл на випуск серії)	Угорщина / Угорщина	UA/9949/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
175	АНТРАЛЬ®	Antral*	таблетки, вкриті оболонкою, по 0,1 г; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/6893/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
176	АНТРАЛЬ®	Antral*	таблетки, вкриті оболонкою, по 0,2 г, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/6893/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

177	АНУЗОЛ	Comb drug	супозиторії ректальні по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону; по 3 супозиторії у стрипі; по 2 або 3 стрипи в пачці	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/7303/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
178	АПЕТИСТИМ	Comb drug	сироп по 125 г у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком в коробці з картону	Вроцлавське підприємство лікарських трав "ГЕРБАПОЛЬ" АТ	Польща	Вроцлавське підприємство лікарських трав "ГЕРБАПОЛЬ" АТ (виробництво за повним циклом без випуска серії; випуск серії)	Польща	UA/16160/01/01	Зберігати при температурі не вище 25° С, у недоступному для дітей місці.
179	АПІЗАРТРОН®	Comb drug	мазь по 20 г або по 30 г, або по 50 г, або по 100 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Пассауер Фарма ГмбХ	Німеччина	Ліхтенхельдт ГмбХ Фармацевтична фабрика (виробництво in bulk, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості)/Пассауер Фарма ГмбХ (випуск серії)	Німеччина / Німеччина	UA/8595/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
180	АПІЛАК ГРІНДЕКС	Mono	таблетки сублінгвальні по 10 мг, по 25 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці з картону	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ "Гріндекс"	Латвія	UA/4346/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи та світла. Зберігати в недоступному для дітей місці.

181	АПІПРОСТ	Comb drug	капсули, по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/8194/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
182	АПІС/ БЕЛАДОНА КУМ МЕРКУРІ	Comb drug	гранули гомеопатичні по 20 г у флаконі; по 1 флакону в коробці з картону	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/15630/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
183	АПОЛІЦЕТ	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Лабораторіос Нормон С.А.	Іспанія	UA/21256/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

184	АРАЛІЇ НАСТОЙКА	Aralia**	настойка по 50 мл у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах скляних; по 25 мл або 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками-крапельницями; по 25 мл або 50 мл у флаконі скляному, укупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці; по 25 мл або 50 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями і кришками; по 25 мл або 50 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою крапельницею і кришкою; по 1 флакону в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7333/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. У процесі зберігання можливе випадання осаду.

185	АРБІВІР-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Umifenovir	капсули по 200 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/10506/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
186	АРБІВІР-ЗДОРОВ`Я	Umifenovir	капсули по 100 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/10506/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

187	АРГЕТТ СПРЕЙ	Diclofenac	спрей нашкірний, розчин 4 %; по 12,5 г або 25 г у флаконі з дозуючим пристроєм та захисним ковпачком; по 1 флакону у картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Фарбіл Валтроп ГмбХ (виробництво за повним циклом)/аллфамед ФАРБІЛ Арцнаймиттель ГмбХ (випробування контролю якості (мікробіологічна чистота))/Фарбіл Фарма ГмбХ (випробування контролю якості)	Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/12446/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після розкриття упаковки – 6 місяців.
188	АРГІЛАЙФ	Arginine aspartate*	розчин оральний, 200 мг/мл по 200 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/19016/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Термін придатності після розкриття флакона – 14 діб.
189	АРГОЛ	Protargol*	краплі назальні/вушні, розчин 2 %, по 10 мл у флаконі; по 1 флакону з кришкою-крапельницею в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/19041/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
190	АРГОСУЛЬФАН ®	Sulfathiazole	крем, 20 мг/г; по 15 г або 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВ "БАУШ ХЕЛС"	Україна	Фармзавод Єльфа А.Т.	Польща	UA/1031/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Термін придатності після першого відкриття – 6 місяців.
191	АРІДА® СУХА МІКСТУРА ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ	Comb drug	порошок, по 19,55 г у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8738/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

192	АРСТИФЕН®	Comb drug	таблетки шипучі, по 20 таблеток шипучих у тубі, по 4 туби у картонній упаковці з індикаторним папером і контрольним календарем	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/18754/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
193	АРСТИФЕН®	Comb drug	таблетки шипучі, по 20 таблеток шипучих у тубі, по 4 туби у картонній упаковці з індикаторним папером і контрольним календарем	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/18754/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
194	АРТЕДЖА®-Д ГЕЛЬ	Diclofenac	гель 5 %; по 50 г або 100 г в тубі; по 1 тубі в пачці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості /відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)	Україна	UA/19470/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.

195	АРТЕДЖА®-Д ГЕЛЬ	Diclofenac	гель 5 %; по 50 г або 100 г в тубі; по 1 тубі в пачці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості /відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)	Україна	UA/19470/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.
196	АРТЕДЖА® ЕМУЛЬГЕЛЬ	Chondroitin sulfate	емульгель для зовнішнього застосування 5 % по 25 г або 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	ПРАТ «ФІТОФАРМ» (виробник, відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)/ПРАТ "ФІТОФАРМ" Україна (виробник, відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)	Україна/ Україна	UA/4699/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

197	АРТЕДЖА® ЕМУЛЬГЕЛЬ	Chondroitin sulfate	емульгель для зовнішнього застосування 5 %; 25 г або 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)	Україна	UA/4699/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

198	АРТЕДЖА® КОМПЛЕКС	Comb drug	капсули, по 30 або 60 капсул у контейнері; по 1 контейнеру в пачці; по 6 капсул у блістері; по 5 або 10 блістерів у пачці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (виробник, відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості; виробник, відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ТОВ "Астрафарм" (виробник, відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)/АТ "Лубнифарм" (виробник, відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)	Україна/ Україна/ Україна	UA/4461/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

199	АРТЕДЖА® КОМПЛЕКС	Comb drug	капсули; по 30 або 60 капсул у контейнері; по 1 контейнеру в пачці; по 6 капсул у блістері; по 5 або 10 блістерів у пачці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (виробник, відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості; Виробник відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ТОВ "Астрафарм" (виробник, відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)/АТ "Лубнифарм" (виробник, відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)	Україна/ Україна/ Україна	UA/4461/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
200	АРТЕЛАК®	Hypromellose	краплі очні, розчин 3,2 мг/мл; по 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону з крапельницею в картонній коробці	ТОВ "БАУШ ХЕЛС"	Україна	Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ	Німеччина	UA/6038/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Після першого відкриття флакона застосовувати не більше 6 тижнів. Препарат не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

201	АРТИФЛЕКС	Comb drug	крем, по 20 г, по 40 г або по 100 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/13306/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
202	АРТИФЛЕКС ПЛЮС	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/12160/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
203	АРТИФЛЕКС УЛЬТРА	Comb drug	капсули по 10 капсул у блістері; по 6 або 12 блістерів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/12774/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
204	АРТИШОК	Cynara scolymus**	розчин оральний 100 мг/мл по 100 мл у флаконах № 1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (виробництво з продукції "in bulk" фірми ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я")	Україна	UA/17926/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після розкриття флакону – 28 діб при зберіганні при температурі не вище 25 °С.
205	АРТИШОК-АСТРАФАРМ	Cynara scolymus**	капсули по 100 мг по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/6960/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

206	АРТИШОКА ЕКСТРАКТ-ЗДОРОВ'Я	Cynara scolymus**	капсули по 100 мг; по 10 капсул у блістері; по 2 або по 6 блістерів у картонній коробці (для виробника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ"ЗДОРОВ'Я"); по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у картонній коробці (для виробника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП")	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/0140/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
207	АРТИШОКА ЕКСТРАКТ-ЗДОРОВ'Я	Cynara scolymus**	капсули по 300 мг; по 10 капсул у блістері; по 3 або по 6 блістерів у картонній коробці (для виробника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я»); по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці (для виробника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП")	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/0140/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

208	АРТИШОКА ЕКСТРАКТ-ЗДОРОВ'Я	Cynara scolymus**	розчин оральний 100 мг/мл по 100 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону з дозуючим пристроєм у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/0140/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
209	АРТІХОЛ	Cynara scolymus**	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/5383/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
210	АРТІХОЛ	Cynara scolymus**	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг, по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/5383/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
211	АРТРО-ГРАН	Comb drug	гранули, по 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 10 г гранул у флаконі з кришкою, по 1 флакону в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/8451/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25оС.
212	АРФАЗЕТИН	Comb drug	збір, по 50 г або 75 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 10 або 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/11610/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

213	АСАФЕН	Acetylsalicylic acid	таблетки жувальні по 80 мг по 30 або по 90 таблеток у флаконах	Фармасайнс Інк.	Канада	Фармасайнс Інк.	Канада	UA/7973/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
214	АСИБРОКС	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 200 мг, по 24 таблетки у пеналі; по 1 пеналу в картонній коробці; по 2 таблетки у стрипі; по 5 або 10 стрипів у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	ФармаЕстіка Мануфактурінг (ФармаЕстіка Мануфактурінг ТОВ)/К.О. УОРЛД МЕДИЦИН ЄВРОПА С.Р.Л.	Естонія/ Румунія	UA/14270/01/01	Для таблеток у стрипі: Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Для таблеток у пеналі: Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Зберігати у щільно закритому пеналі.
215	АСИБРОКС	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 600 мг, по 12 таблеток у пеналі; по 1 пеналу в картонній коробці; по 2 таблетки у стрипі; по 5 або 10 стрипів у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	ФармаЕстіка Мануфактурінг (ФармаЕстіка Мануфактурінг ТОВ)/К.О. УОРЛД МЕДИЦИН ЄВРОПА С.Р.Л.	Естонія/ Румунія	UA/14270/01/02	Для таблеток у стрипі: Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Для таблеток у пеналі: Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Зберігати у щільно закритому пеналі.
216	АСК-ТЕВА	Acetylsalicylic acid	таблетки кишковорозчинні по 100 мг по 10 таблеток в блістері; по 3 блістери в картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Дупниця АТ	Болгарія	UA/14167/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
217	АСК-ТЕВА	Acetylsalicylic acid	таблетки кишковорозчинні по 75 мг по 10 таблеток в блістері; по 3 блістери в картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Дупниця АТ	Болгарія	UA/14167/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
218	АСКОПАР	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 10 таблеток у блістерах	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/8239/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

219	АСКОРБІНКА®-КВ	Ascorbic acid (vit C)	таблетки зі смаком апельсина по 25 мг; по 10 таблеток у етикетці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/4571/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
220	АСКОРБІНКА®-КВ	Ascorbic acid (vit C)	таблетки зі смаком банана по 25 мг; по 10 таблеток у етикетці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/17795/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
221	АСКОРБІНКА®-КВ	Ascorbic acid (vit C)	таблетки зі смаком дині по 25 мг; по 10 таблеток у етикетці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/17792/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
222	АСКОРБІНКА®-КВ	Ascorbic acid (vit C)	таблетки зі смаком лимона по 25 мг; по 10 таблеток у етикетці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/1529/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
223	АСКОРБІНКА®-КВ	Ascorbic acid (vit C)	таблетки зі смаком м'яти по 25 мг; по 10 таблеток у етикетці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/1527/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
224	АСКОРБІНКА®-КВ	Ascorbic acid (vit C)	таблетки зі смаком манго по 25 мг; по 10 таблеток у етикетці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/17793/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
225	АСКОРБІНКА®-КВ	Ascorbic acid (vit C)	таблетки зі смаком полуниці по 25 мг; по 10 таблеток у етикетці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/1528/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
226	АСКОРБІНКА®-КВ	Ascorbic acid (vit C)	таблетки зі смаком тутті-фрутті по 25 мг; по 10 таблеток у етикетці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/17794/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
227	АСКОРБІНКА®-КВ	Ascorbic acid (vit C)	таблетки по 25 мг, по 10 таблеток в етикетці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/4570/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

228	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	Ascorbic acid (vit C)	драже по 50 мг по 50 драже у блістерах; по 160 драже у контейнерах (баночках); по 160 драже у контейнері (баночці), по 1 контейнеру (баночці) у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/1527/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
229	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	Ascorbic acid (vit C)	драже по 50 мг по 50 драже у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/2983/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
230	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	Ascorbic acid (vit C)	таблетки жувальні по 50 мг по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/0003/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
231	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	Ascorbic acid (vit C)	таблетки по 25 мг по 50 або по 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/2983/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
232	АСКОРУТИН	Rutoside, combinations	таблетки, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 2, 5 або 10 блістерів у пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/7706/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

233	АСКОРУТИН	Rutoside, combinations	таблетки, по 10 таблеток у блістері, по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці, по 10 таблеток у блістері, по 80 блістерів у коробці з картону, по 50 таблеток у контейнерах, по 1 контейнеру у пачці	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/4397/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
234	АСКОРУТИН	Rutoside, combinations	таблетки, по 10 таблеток у блістері, по 3 або 5 блістерів у пачці	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/18608/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
235	АСКОРУТИН	Rutoside, combinations	таблетки; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/4875/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
236	АСКОФЕН-ДАРНИЦЯ	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 6 або по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці; по 6 або по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/7528/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
237	АСКОФЕН-ЕКСТРА	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/7541/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

238	АСКОФЕН Л	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки; по 6 таблеток у блістерах; по 6 таблеток у блістері по 10 блістерів у пачці; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері по 1 або 5 або 10 блістерів у пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8791/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
239	АСКОЦИН®	Comb drug	таблетки жувальні по 10 таблеток у стрипі; по 3 або 10 стрипів у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/10673/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
240	АСКОЦИН®	Comb drug	таблетки жувальні по 10 таблеток у стрипі; по 3 або 10 стрипів у картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/10673/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
241	АСКОЦИН® МАКС	Comb drug	таблетки шипучі, по 10 або по 20 шипучих таблеток у поліпропіленовій тубі, по 1 тубі у картонній коробці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/18993/01/01	Зберігати в щільно закритій тубі. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
242	АСКОЦИН® МАКС	Comb drug	таблетки шипучі, по 10 або по 20 шипучих таблеток у поліпропіленовій тубі, по 1 тубі у картонній коробці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/18993/01/01	Зберігати в щільно закритій тубі. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

243	АСПАРКАМ	Magnesium (different salts in combination)	таблетки, по 10 або по 50 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 1 або 10 блістерів в пачці з картону; по 50 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/5459/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
244	АСПАРКАМ-ЗДОРОВ'Я	Magnesium (different salts in combination)	таблетки по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці; по 50 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 50 таблеток у блістерах	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/4633/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
245	АСПАРКАМ Артеріум	Magnesium (different salts in combination)	таблетки по 50 таблеток у блістерах; по 50 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці; по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/4509/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
246	АСПЕКАРД	Acetylsalicylic acid	таблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у пачці; по 10 таблеток у блістері, по 12 блістерів у пачці	ТОВ "СТИРОЛБІОФАРМ БАЛТИКУМ"	Латвія	ТОВ "МАРІФАРМ"	Словенія	UA/5090/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

247	АСПЕНОРМ	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 10 блістерів в картонній пачці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/12353/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
248	АСПЕНОРМ	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 300 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній пачці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/12353/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
249	АСПІКАРД КАРДІО	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 100 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 3 блістери у пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk виробника ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна)	Україна	UA/15865/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
250	АСПІКАРД КАРДІО	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 300 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk виробника ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна)	Україна	UA/15865/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

251	АСПІРИН КАРДІО®	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою, по 100 мг; по 14 таблеток у блістері; по 2, по 4 або по 7 блістерів в картонній пачці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Байєр АГ (виробництво "in bulk", контроль якості)/Байєр Біттерфельд ГмбХ (виробництво "in bulk", контроль якості, первинне, вторинне пакування та випуск серії)/Байєр Хелскер Мануфактурінг С.Р.Л. (виробництво "in-bulk", контроль якості)/Куррента ГмбХ і Ко. ВТК (контроль якості)	Німеччина / Німеччина /Італія/ Німеччина	UA/7802/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
252	АСПІРИН® С	Comb drug	таблетки шипучі; по 2 таблетки у стрипі; по 5 стрипів у картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Байєр Біттерфельд ГмбХ	Німеччина	UA/4398/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
253	АСТРАЦЕ	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 200 мг; по 3 г у саше; по 10 саше у картонній коробці	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/17866/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
254	АСТРАЦЕ®	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 600 мг, саше по 3 г, по 10 саше в картонній коробці	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/17866/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

255	АСТРАЦИТРОН	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 20 г у саше; по 10 саше у коробці з картону	ТОВ "Астрафарм"	Україна	ТОВ "Астрафарм"	Україна	UA/10402/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
256	АСТРАЦИТРОН ЕКСТРА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 5 г у саше, по 10 або по 30 саше у коробці з картону	ТОВ "Астрафарм"	Україна	ТОВ "Астрафарм"	Україна	UA/20477/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
257	АСТРАЦИТРОН ФОРТЕ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 20 г в саше, по 10 саше у коробці	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/19226/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
258	АСТРІЯ®	Desloratadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг; по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 3 блістери в коробці; по 30 таблеток у блістері, по 1 або по 3 блістери в коробці	ТОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/15979/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
259	АТОКСІЛ	Silicium dioxide*	порошок по 10,0 г у флаконі; по 1 флакону в пачці, по 2 г у пакеті-саше; по 20 пакетів-саше в пачці	ТОВ "Орісіл - Фарм"	Україна	ТОВ "Орісіл - Фарм"	Україна	UA/2616/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С. Готову суспензію зберігати у щільно закритому флаконі, при температурі від 2 оС до 8 оС, не більше 32 годин.
260	АТФ-ЛОНГ®	Adenosine	таблетки зі смаком ментолу по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 або 4 блістери в коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/19052/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

261	АТФ-ЛОНГ®	Adenosine	таблетки зі смаком ментолу по 20 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 або 4 блістери в коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/19052/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
262	АТФ-ЛОНГ®	Adenosine	таблетки по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 4 блістери в коробці; по 1 блістеру без вкладання у вторинну упаковку	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/3121/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
263	АТФ-ЛОНГ®	Adenosine	таблетки по 20 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 4 блістери в коробці; по 1 блістеру без вкладання у вторинну упаковку	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/3121/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
264	АФАЛА	Comb drug	таблетки, по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/6887/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
265	АФЕТТО	Bilastine	таблетки по 20 мг; по 10 таблеток у блістері, по 1, по 2, або по 3 блістери в пачці	ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/21064/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
266	АФИЦИКЛ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки по 6 таблеток у перфорованому стрипі; по 1 або 2 стрипи в картонній коробці; по 10 таблеток у перфорованому стрипі; по 1 стрипу в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	АЛКАЛОЇД АД Скоп’є	Республіка Північна Македонія	UA/4125/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці.

267	АФЛАЗИН®	Hibiscus sabdariffa**	капсули по 200 мг по 10 капсул у блістері, 3 блістери в картонній упаковці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	UA/11171/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
268	АФЛЕТИН	Silicones	капсули м'які по 125 мг; по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 20 капсул у блістері, по 1 блістері у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/17176/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
269	АФЛУ ТАЙСС	Comb drug	розчин для орального застосування; по 30 мл або по 50 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	UA/6805/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття флакона – 6 місяців. Забороняється застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності.
270	АФЛУБІН® ПЕНЦИКЛОВІР ТОНУВАЛЬНИЙ	Penciclovir	крем 1 %, по 2 г в тубі, по 1 тубі у картонній коробці	ТОВ "ПЕРРІГО УКРАЇНА"	Україна	Медженікс Бенелюкс НВ (виробництво за повним циклом)	Бельгія	UA/13113/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.
271	АФЛУГРИП	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 10 саше в картонній коробці	ТОВ "ПЕРРІГО УКРАЇНА"	Україна	Рафтон Лабораторіз Лімітед	Велика Британія	UA/19738/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін зберігання після розчинення становить 1,5 години.
272	АФФИДА ПЛЮС	Ibuprofen, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг/500 мг; по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	АЛКАЛОЇД АД Скоп’є	Північна Македонія	UA/19663/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

273	АЦ-ФС	Acetylcysteine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці	ТОВ "АСІНО УКРАЇНА"	Україна	ТОВ "Фарма Старт"	Україна	UA/2071/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
274	АЦ-ХЕЛП	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 600 мг, по 10 таблеток у тубі; 1 туба в картонній пачці	ТОВ "ІНФАРМА Трейдінг"	Латвійська Республіка	Е-ФАРМА ТРЕНТО С.П.А.	Італія	UA/19079/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
275	АЦЕТАЛ	Acetylcysteine	таблетки по 200 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/12310/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
276	АЦЕТАЛ	Acetylcysteine	таблетки по 600 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/12310/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

277	АЦЕТАЛ С	Acetylcysteine	порошок для орального розчину, 100 мг/3 г, по 3 г порошку в пакеті; по 10 пакетів або 5 спарених пакетів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/4634/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
278	АЦЕТАЛ С	Acetylcysteine	порошок для орального розчину, 200 мг/3 г; по 3 г порошку в пакеті; по 10 пакетів або 5 спарених пакетів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/4634/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
279	АЦЕТАЛ С	Acetylcysteine	порошок для орального розчину, 600 мг/3 г, по 3 г порошку в пакеті; по 10 пакетів або 5 спарених пакетів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/4634/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
280	АЦЕТАЛ СОЛЮБЛ	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 200 мг; по 2 таблетки у стрипі; по 5 або по 10 стрипів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/17357/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
281	АЦЕТАЛ СОЛЮБЛ	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 600 мг; по 2 таблетки у стрипі; по 5 або по 10 стрипів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/17357/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

282	АЦЕТИЛКА	Acetylsalicylic acid	таблетки шипучі по 500 мг; по 2 таблетки у стрипі; по 8 стрипів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/17131/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
283	АЦЕТИЛКА З ВІТАМІНОМ С	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки шипучі по 2 таблетки у стрипі; по 5 стрипів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/17358/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
284	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Acetylsalicylic acid	таблетки по 0,5 г по 10 таблеток у стрипі; по 1 стрипу в паперовому конверті; по 10 таблеток у стрипі; по 2 або по 10 стрипів у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2, 5 або 10 блістерів у пачці з картону; по 10 таблеток у блістерах або у стрипах	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/6272/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
285	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Acetylsalicylic acid	таблетки по 500 мг по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна/ Україна	UA/7529/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

286	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Acetylsalicylic acid	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 5, або 10 блістерів у пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5708/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
287	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Acetylsalicylic acid	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці	ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД"	Україна	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна/ Україна	UA/18859/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
288	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ	Acetylsalicylic acid	таблетки по 500 мг по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках; по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1, по 2 або по 5 контурних чарункових упаковок у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/2992/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
289	АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Acetylcysteine	порошок для орального розчину, 600 мг, по 3 г порошку у саше, по 20 саше в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/19018/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
290	АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Acetylcysteine	порошок для орального розчину, 600 мг, по 3 г порошку у саше, по 20 саше в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/19018/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

291	АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Acetylcysteine	порошок для орального розчину, по 200 мг, по 3 г порошку у саше, по 20 саше в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/18897/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
292	АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Acetylcysteine	порошок для орального розчину, по 200 мг, по 3 г порошку у саше, по 20 саше в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/18897/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
293	АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Acetylcysteine	таблетки по 200 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у коробку з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk виробника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/16936/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

294	АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Acetylcysteine	таблетки по 200 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у коробку з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk виробника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна)	Україна	UA/16936/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
295	АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Acetylcysteine	таблетки по 600 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у коробку з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk виробника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/16936/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

296	АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Acetylcysteine	таблетки по 600 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у коробку з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk виробника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я», Україна)	Україна	UA/16936/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
297	АЦЕТИЛЦИСТЕЇН-АСТРАФАРМ	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 200 мг; по 3 г; по 10 саше у картонній коробці	ТОВ "Астрафарм"	Україна	ТОВ "Астрафарм"	Україна	UA/9069/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
298	АЦЕТИЛЦИСТЕЇН-ТЕВА	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 600 мг; по 10 таблеток у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування; контроль серії, дозвіл на випуск серії)	Німеччина	UA/18609/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у щільно закритій тубі для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття туби – 12 місяців.
299	АЦИКВІК	Aciclovir	мазь 2,5%, по 5 г у тубі, по 1 тубі в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕДСТАВНИЦТВО БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/21258/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

300	АЦИКЛОВІР	Aciclovir	мазь 2,5 %, по 5 г у тубі; по 1 тубі в пачці; по 10 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/11566/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
301	АЦИКЛОВІР БЕЛУПО	Aciclovir	крем для зовнішнього застосування 5 %, по 2 г або по 5 г, або по 10 г у тубі; по 1 тубі в картонній пачці	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	UA/14085/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
302	АЦИК®	Aciclovir	крем 5 % по 2 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ	Німеччина	UA/9433/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
303	АЦЦ® 100	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 100 мг, по 3 г порошку у пакетику; по 20 пакетиків у картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ (тестування, пакування, випуск серії)/Ліндофарм ГмбХ (виробництво in bulk, тестування, пакування)/Замбон Світцерланд Лтд (виробництво in bulk, тестування, пакування)	Німеччина / Німеччина / Швейцарія	UA/2030/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
304	АЦЦ® 100	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 100 мг, по 20 таблеток у тубі, по 1 тубі в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії)/Хермес Фарма Гес.м.б.Х. (виробник in bulk, пакування)/Хермес Арцнаймміттель ГмбХ (альтернативний виробник in bulk, пакування)	Німеччина /Австрія/ Німеччина	UA/8272/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С . Тримати тубу щільно закритою.

305	АЦЦ® 200	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 200 мг, по 3 г порошку у пакетику; по 20 пакетиків у картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ (тестування, пакування, випуск серії)/Ліндофарм ГмбХ (виробництво in bulk, тестування, пакування)/Замбон Світцерланд Лтд (виробництво in bulk, тестування, пакування)	Німеччина / Німеччина / Швейцарія	UA/2031/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
306	АЦЦ® 200	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 200 мг, по 20 таблеток у тубі; по 1 тубі у картонній коробці; по 1 таблетці у саше; по 20 саше у картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії)/Хермес Фарма Гес.м.б.Х. (виробник in bulk, пакування)/Хермес Фарма ГмбХ (альтернативний виробник in bulk, пакування)	Німеччина /Австрія/ Німеччина	UA/8272/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С (для туби). Тримати тубу щільно закритою. Зберігати при температурі не вище 30 °С (для саше). Зберігати у недоступному для дітей місці.
307	АЦЦ® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ МЕД ЛИМОН	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 200 мг; по 3 г порошку в пакетику; по 20 пакетиків у картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії)/Ліндофарм ГмбХ (виробник in bulk, тестування, пакування)/Замбон Світзеланд Лтд (виробник in bulk, тестування, пакування)	Німеччина / Німеччина / Швейцарія	UA/6568/02/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

308	АЦЦ® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ МЕД ЛИМОН	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 600 мг; по 3 г порошку в пакетику; по 6 пакетиків у картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії)/Ліндофарм ГмбХ (виробник in bulk, тестування, пакування)/Замбон Світзеланд Лтд (виробник in bulk, тестування, пакування)	Німеччина / Німеччина / Швейцарія	UA/6568/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
309	БАГНА ЗВИЧАЙНОГО ПАГОНИ	Ledi palustris**	пагони по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2118/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.
310	БАІНВЕЛЬ МАЗЬ ІНТЕНСИВ	Comb drug	мазь по 50 г або 100 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (контроль якості та випуск серії; виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)	Німеччина	UA/9105/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
311	БАЛЬЗАМ "ВІГОР"	Comb drug	розчин оральний, по 200 мл, або 250 мл, або 500 мл у пляшках	ТОВ "Аветра"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/4074/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

312	БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ)	Comb drug	лінімент по 25 г та 50 г у контейнерах; по 20 г або по 25 г, або по 40 г у тубах алюмінієвих; по 20 г або по 25 г, або по 40 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у пачці; по 20 г або по 25 г, або по 40 г у тубах ламінатних; по 20 г або по 25 г, або по 40 г у тубі ламінатній; по 1 тубі у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6660/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
313	БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ)	Comb drug	лінімент по 40 г у банках, по 40 г у тубах, по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/6659/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С . Зберігати в недоступному для дітей місці.
314	БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ)	Comb drug	лінімент по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/6273/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
315	БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ)	Comb drug	лінімент; по 25 г у тубах; по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/7709/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

316	БАНЕОЦИН	Comb drug	мазь; по 5 г або по 20 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Сандоз ГмбХ - Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль (відповідальний за випуск серії)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (контроль серії)/Лек фармацевтична компанія д.д. (відповідальний за випуск серії)/Салютас Фарма ГмбХ (виробництвоза повним циклом, Контроль серії)	Австрія/ Німеччина / Словенія/ Німеччина	UA/3951/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
317	БАНЕОЦИН	Comb drug	порошок нашкірний по 10 г порошку в контейнері; по 1 контейнеру в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Фармацойтіше Фабрік Монтавіт ГмбХ (виробник продукції in bulk, пакування, контроль серії)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (Контроль серії)/Лек Фармацевтична компанія д.д. (Відповідальний за випуск серії)	Австрія/ Німеччина /Словенія	UA/3951/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

318	БАРБОВАЛ®	Barbiturates in combination with other drugs	капсули тверді, по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/1196/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
319	БАРБОВАЛ®	Barbiturates in combination with other drugs	краплі оральні по 25 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/1196/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
320	БАФАЗОЛ ІС®	Fabomotizole	таблетки по 10 мг; по 20 таблеток у блістері, по 2 або 3 блістери у пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/18761/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
321	БЕКАРБОН	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/ТОВ "Агрофарм"	Україна/ Україна	UA/7454/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

322	БЕКЛОМЕТАЗОН-ЗДОРОВ'Я	Beclometasone	спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/дозу, по 180 доз у флаконі зі спрей-насосом та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я»	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я» (контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості)	Україна/ Україна	UA/18842/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не зберігати в холодильнику. Зберігати у недоступному для дітей місці.
323	БЕКЛОМЕТАЗОН-ЗДОРОВ'Я	Beclometasone	спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/дозу; по 180 доз у флаконі зі спрей-насосом та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, випуск серії; контроль якості)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості)	Україна/ Україна	UA/18842/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не зберігати в холодильнику. Зберігати у недоступному для дітей місці.

324	БЕКОНАЗЕ	Beclometasone	спрей назальний, суспензія, 50 мкг/дозу; по 100 доз або 180 доз у флаконі поліетиленовому, з'єднаному з дозуючим пристроєм, носовим адаптером та кришечкою; по 1 флакону в коробці	ТОВ "ПЕРРІГО УКРАЇНА"	Україна	Ріхард Біттнер АГ (виробництво за повним циклом)	Австрія	UA/3140/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не зберігати в холодильнику.
325	БЕЛАДОНИ ЕКСТРАКТ	Atropa belladonna**	супозиторії ректальні по 0,015 г по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/7069/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
326	БЕЛАЛГІН	Comb drug	таблетки по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ"	Україна/ Україна	UA/6226/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

327	БЕЛАСТЕЗИН	Comb drug	таблетки по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ"	Україна/ Україна	UA/6219/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
328	БЕЛІСА	Comb drug	капсули по 10 капсул у блістері; по 3 або 9 блістерів у пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕДСТАВНИЦТВО БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18710/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
329	БЕЛІСА	Comb drug	краплі оральні по 25 мл або 40 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону у пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/9714/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття упаковки препарат придатний протягом 3 місяців.
330	БЕЛІСА	Comb drug	краплі оральні по 25 мл або 40 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону у пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/9714/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття упаковки препарат придатний протягом 3 місяців.
331	БЕНГЕЙ®	Comb drug	крем по 50 г у тубі, по 1 тубі у картонній коробці	МакНіл Продактс Лімітед	Сполучене Королівство	Янссен-Сілаг	Франція	UA/7834/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

332	БЕНЗИВЕРДЕ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у флаконі зі спрей-насосом та насадкою поворотною; по 1 флакону у пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/20815/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
333	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ	Benzyl benzoate	емульсія нашкірна, 200 мг/г по 50 г у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці; по 50 г або 100 г у флаконах	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/3272/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
334	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ	Benzyl benzoate	крем, 250 мг/г, по 40 г або по 80 г у тубі; по 1 тубі у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/7134/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
335	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ-ДАРНИЦЯ	Benzyl benzoate	мазь, 250 мг/г по 30 г у тубі, по 1 тубі в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/4488/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
336	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ ГРІНДЕКС	Benzyl benzoate	мазь, 200 мг/г; по 30 г в тубі; по 1 тубі в пачці картонній	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ Таллінський фармацевтичний завод	Естонія	UA/7710/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не зберігати у холодильнику та морозильній камері. Зберігати в недоступному для дітей місці.
337	БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ	Benzyl benzoate	емульсія нашкірна 20 % по 50 г у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8378/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття флакона препарат придатний протягом 7 діб
338	БЕПАНТЕН®	Dexpanthenol	крем 5 %; по 30 г або 100 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	ГП Грензах Продуктіонс ГмбХ	Німеччина	UA/4157/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
339	БЕПАНТЕН® ПЛЮС	Chlorhexidine, combinations	крем; по 100 г, 30 г або 3,5 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	ГП Грензах Продуктіонс ГмбХ	Німеччина	UA/7805/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

340	БЕПАНТЕН® ПЛЮС	Chlorhexidine, combinations	спрей нашкірний, розчин; по 30 мл у флаконі з розприскувачем та пластиковою кришечкою; по 1 флакону в картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Ліхтенхельдт ГмбХ Фармацойтіше Фабрік	Німеччина	UA/7805/02/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
341	БЕРБЕРІС-ГОМАКОРД	Comb drug	краплі оральні, по 30 мл у флаконі-крапельниці скляному; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/9733/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці! Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.
342	БЕРЕЗИ БРУНЬКИ	Betula**	бруньки по 10 г або по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8861/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій зберігати при температурі не вище 15 °С не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці!
343	БЕРЕЗИ БРУНЬКИ	Betula**	бруньки по 10 г у пакетах полімерних; по 10 г, або 20 г, або 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2154/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.
344	БЕРЕЗИ БРУНЬКИ	Betula**	бруньки по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8273/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці.
345	БЕРЕЗОВІ БРУНЬКИ	Betula**	бруньки по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом або по 10 г у пакетах	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/3468/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 оС.

346	БЕРЕШ® КАЛЬЦІЙ ПЛЮС D3	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	UA/1363/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці та в недоступному для дітей місці.
347	БЕРЕШ® МАГНІЙ ПЛЮС B6	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	UA/4516/01/01	Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
348	БЕРОЗ	Comb drug	настойка для перорального застосування по 100 мл у банках, по 500 мл у пляшках	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/1632/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

349	БЕТАВІД	Povidone-iodine	розчин нашкірний 100 мг/мл по 30 мл у флаконі; по 1 флакону, укупореному кришкою–піпеткою або насадкою та кришкою, або крапельницею та кришкою, у пачці; по 30 мл у флаконі; по 1 флакону, укупореному кришкою, у пачці з кришкою-піпеткою; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону, укупореному насадкою та кришкою або крапельницею та кришкою, у пачці; по 1000 мл у флаконі , укупореному кришкою; по 1000 мл у флаконі, укупореному крапельницею та кришкою	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/20249/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

350	БЕТАВІД	Povidone-iodine	розчин нашкірний 100 мг/мл, по 30 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному кришкою-піпеткою, у пачці; по 100 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному насадкою та кришкою, у пачці; по 1000 мл у флаконі, укупореному кришкою; по 1000 мл у флаконі, укупореному крапельницею та кришкою	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/20249/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
351	БЕТАДИН®	Povidone-iodine	мазь 10 % по 20 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	UA/6807/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
352	БЕТАДИН®	Povidone-iodine	мазь 10 % по 20 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	UA/6807/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
353	БЕТАДИН®	Povidone-iodine	розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 %; по 1000 мл у флаконах з крапельницею; по 30 мл або 120 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону у картонній пачці	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	UA/6807/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

354	БЕТАЙОД-ЗДОРОВ'Я	Povidone-iodine	розчин нашкірний, 100 мг/мл; по 50 мл або 100 мл у флаконі; по 1 флакону укупореному насадкою та кришкою у коробці з картону; по 100 мл у контейнері; по 1 контейнеру укупореному насадкою та кришкою у коробці з картону; по 1000 мл у флаконі укупореному пробкою-крапельницею та кришкою	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"(всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"(всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна/ Україна	UA/15025/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
355	БЕТАЙОД-ЗДОРОВ`Я	Povidone-iodine	мазь, 100 мг/г; по 20 г або по 40 г в тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/17494/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
356	БЕТАЙОД ПЛЮС	Comb drug	обполіскувач для горла, концентрат по 50 мл у флаконі зі скла, закритому кришкою; по 1 флакону зі стаканом мірним у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/16473/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

357	БЕТАЙОД ПЛЮС	Comb drug	спрей для ротової порожнини; по 30 мл у флаконі зі скла з оральним розпилювальним пристроєм та запобіжним ковпачком в комплекті; по 1 флакону з оральним розпилювальним пристроєм і запобіжним ковпачком у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/16473/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
358	БЕТИОЛ®	Comb drug	супозиторії ректальні, по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери в пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/7070/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
359	БІЛЕ ВУГІЛЛЯ®	Silicium dioxide*	таблетки, 210 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній пачці; по 12 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній пачці; по 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в картонній пачці	ТОВ "АКТІФАРМ"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (повний цикл виробництва, контроль якості, випуск серії)/ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (повний цикл виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "АКТІФАРМ" (випуск серії)	Україна/ Україна/ Україна	UA/16126/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

360	БІЛОБІЛ®	Ginkgo folium	капсули по 40 мг; по 10 капсул у блістері, по 2 або 6 блістерів у картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії) / КРКА, д.д., Ново место (контроль серії)	Словенія	UA/1234/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
361	БІЛОБІЛ® ІНТЕНС 120 мг	Ginkgo folium	капсули по 120 мг, по 10 капсул у блістері, по 2 або 6 блістерів у картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/ХЕМОФАРМ А.Д. (первинне та вторинне пакування)	Словенія/ Сербія	UA/1234/01/03	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
362	БІЛОБІЛ® ФОРТЕ	Ginkgo folium	капсули по 80 мг, по 10 капсул у блістері; по 2 або 6 блістерів у картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії) / КРКА, д.д., Ново место (контроль серії)	Словенія	UA/1234/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
363	БІЛОДДІ	Hymecromone	таблетки по 200 мг; по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці	КУПФЕР БІОТЕХ, УАБ	Литовська Республіка	Адамед Фарма С.А.	Польща	UA/19715/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

364	БІОАРОН СИСТЕМ	Comb drug	сироп по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірною склянкою в картонній коробці	Фітофарм Кленка С.А.	Польща	Фітофарм Кленка С.А.	Польща	UA/0687/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
365	БІОНОРМ® ДЕТОКС	Diosmectite	таблетки, що диспергуються, по 1,5 г; по 6 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18883/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
366	БІОНОРМ® ДЕТОКС	Diosmectite	таблетки, що диспергуються, по 1,5 г; по 6 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18883/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
367	БІОСОН	Doxylamine, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2, 3 або 10 блістерів у картонній пачці	ТОВ "АСІНО УКРАЇНА"	Україна	ТОВ "Фарма Старт"	Україна	UA/15137/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
368	БІОТЕБАЛ	Biotin	таблетки по 10 мг, по 15 таблеток у блістері; по 2, 4 або 6 блістерів у картонній коробці; по 20 таблеток у блістері, по 6 блістерів у картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	UA/18951/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
369	БІОТИН-КВ	Biotin	таблетки по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18737/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
370	БІОТИН-КВ	Biotin	таблетки по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18737/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

371	БІОФЛОРАКС	Lactulose	сироп 670 мг/мл; по 100 мл або 200 мл у флаконі; по 1 флакону разом із піпеткою дозуючою у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (фасування із "in bulk" фірми "Fresenius Kabi Austria GmbH", Австрія)	Україна	UA/12878/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Біофлоракс можна використовувати протягом всього терміну придатності препарату після розкриття флакона за умови зберігання в оригінальній упаковці.
372	БІОЦИКЛІН	Agni casti fructus	таблетки по 45 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці	Вроцлавське підприємство лікарських трав "ГЕРБАПОЛЬ" АТ	Польща	Вроцлавське підприємство лікарських трав "ГЕРБАПОЛЬ" АТ	Польща	UA/13590/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
373	БІСАКОДИЛ	Bisacodyl	супозиторії ректальні по 0,01 г по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/3236/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
374	БІСАКОДИЛ	Bisacodyl	супозиторії ректальні по 0,01 г, по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/1380/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
375	БІСАКОДИЛ-ДАРНИЦЯ	Bisacodyl	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, по 5 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/2575/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

376	БІСАКОДИЛ-ФАРМЕКС	Bisacodyl	супозиторії ректальні по 10 мг; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/11607/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
377	БІСАКОДИЛ ГРІНДЕКС	Bisacodyl	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній пачці	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ "Гріндекс"	Латвія	UA/3726/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
378	БІФОНАЛ-ЗДОРОВ'Я	Bifonazole	гель, 10 мг/г по 15 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/2391/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
379	БІФОН® СКІН	Bifonazole	розчин нашкірний 1 % по 15 або 35 мл розчину у флаконі-крапельниці, по 25 мл – у флаконі-спреї з дозатором, по 1 флакону у картонній пачці	ТОВ "МІБЕ УКРАЇНА"	Україна	мібе ГмбХ Арцнаймітель	Німеччина	UA/13616/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Після першого відкриття флакона-крапельниці, флакона-спрея з дозатором – 8 тижнів.

380	БЛОГІР-3	Desloratadine	розчин оральний, 0,5 мг/мл по 60 мл або 120 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложечкою (на 2,5 мл або 5 мл) в картонній пачці	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	ФАМАР А.В.Е. (виробник готового лікарського засобу, первинне, вторинне пакування)/Белупо, ліки та косметика, д.д. (відповідальний за вторинне пакування, випуск серії)	Греція/ Хорватія	UA/15359/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
381	БЛОГІР-3	Desloratadine	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери у картонній пачці	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	Белупо, ліки та косметика, д.д. (вторинне пакування, відповідальний за випуск серії)/Дженефарм СА (виробник готового лікарського засобу, первинне пакування)/Фармапас С.А. (виробник готового лікарського засобу, первинне пакування)	Хорватія/ Греція/ Греція	UA/15359/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

382	БОБОТИК	Silicones	краплі оральні, емульсія, 66,66 мг/мл; по 30 мл у флаконі з пробкою-крапельницею і кришкою; по 1 флакону в картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (Виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; Випуск серії)	Польща	UA/11716/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття флакона – 2 місяці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
383	БОМ-БЕНГЕ	Comb drug	мазь по 30 г у тубах; по 25 г у банках; по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8240/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

384	БОМ-БЕНГЕ	Comb drug	мазь; по 30 г у тубах; по 25 г у банках; по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8240/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
385	БОМ-БЕНГЕ МАЗЬ	Comb drug	мазь по 25 г у контейнерах пластмасових; по 20 г у тубах алюмінієвих; по 20 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у пачці з картону; по 20 г або по 25 г, або по 30 г у тубах ламінатних; по 20 г або по 25 г, або по 30 г у тубі ламінатній; по 1 тубі у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7622/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
386	БОМ-БЕНГЕ МАЗЬ	Comb drug	мазь по 25 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону; по 25 г у тубах алюмінієвих	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8618/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

387	БОНДЖИГАР	Comb drug	капсули, по 20 або по 60 капсул у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/1061/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
388	БОНДЖИГАР	Comb drug	сироп; по 90 мл, або по 120 мл, або по 150 мл у скляному флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/9929/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
389	БОРНА КИСЛОТА	Boric acid	порошок кристалічний по 10 г у саше; по 10 саше у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17710/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
390	БОРНА КИСЛОТА	Boric acid	порошок кристалічний; по 10 г у контейнерах або у банках; по 10 г або по 30 г у пакетах; по 10 г у пакеті; по 10, 20 або 50 пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/8303/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
391	БОРНА КИСЛОТА	Boric acid	порошок, по 30 г у контейнері	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/19352/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
392	БОРНА КИСЛОТА	Boric acid	порошок, по 30 г у контейнері	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/19352/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
393	БОРНА КИСЛОТА	Boric acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 3 % по 20 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3504/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

394	БОРНА КИСЛОТА	Boric acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 3 %, по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/6275/01/01	Зберігати при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
395	БОРНА МАЗЬ 5 %	Boric acid	мазь 5 %, по 25 г у тубах; по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8718/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
396	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ	Boric acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 2 %, по 10 мл, по 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8197/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
397	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ	Boric acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 2 %; по 10 мл, по 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8197/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

398	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 2 %	Boric acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 2 % по 10 мл у флаконах; по 20 мл у флаконах-крапельницях; по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 20 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8460/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

399	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 3 %	Boric acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 3 % по 20 мл або по 25 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці; по 20 мл або по 25 мл у флаконах; по 20 мл або по 25 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону у пачці; по 20 мл або по 25 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 20 мл або по 25 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону у пачці; по 20 мл або по 25 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6661/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
400	БОРОМЕНТОЛ	Comb drug	мазь по 25 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону; по 25 г у тубах алюмінієвих	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8619/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

401	БОФЕН	Ibuprofen	суспензія оральна, 100 мг/5 мл по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці разом з ложкою дозувальною; по 100 мл у банці полімерній разом з ложкою дозувальною в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/10184/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після розкриття флакону термін придатності препарату 30 діб при температурі не вище 25 °С. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
402	БРАУНОДИН	Povidone-iodine	розчин нашкірний, 7,5 %, по 100 мл у поліетиленових флаконах, по 250 мл у поліетиленових флаконах зі спрей-насосом; по 100 мл у поліетиленових флаконах, по 250 мл у поліетиленових флаконах зі спрей-насосом по 20 флаконів у картонній коробці	Б. Браун Мельзунген АГ	Німеччина	Б. Браун Мельзунген АГ (випуск серії)/Б. Браун Медікал АГ (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)	Німеччина / Швейцарія	UA/18496/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

403	БРАУНОДИН	Povidone-iodine	розчин нашкірний, 7,5 %, по 100 мл у поліетиленових флаконах, по 250 мл у поліетиленових флаконах зі спрей-насосом; по 100 мл у поліетиленових флаконах, по 250 мл у поліетиленових флаконах зі спрей-насосом по 20 флаконів у картонній коробці	Б. Браун Мельзунген АГ	Німеччина	Б. Браун Мельзунген АГ (випуск серії)/Б. Браун Медікал АГ (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)	Німеччина / Швейцарія	UA/18496/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
404	БРИЗОКС	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,5 мг/мл, по 10 мл розчину в полімерному флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній пачці	ТОВ "БЕРКАНА+"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мультіспрей"	Україна	UA/21183/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
405	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	Viride nitens*	розчин для зовнішнього застосування спиртовий 1 %; по 15 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 15 мл у флаконах; по 20 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 20 мл у флаконах	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7458/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

406	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	Viride nitens*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 10 мл у флаконах; по 20 мл у флаконах-крапельницях; по 1 флакону в пачці з картону; по 20 мл у флаконах-крапельницях	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8461/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.
407	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	Viride nitens*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 15 мл у флаконах скляних; по 20 мл у флаконах скляних; по 20 мл у флаконі скляному , по 1 флакону в пачку з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/6963/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
408	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	Viride nitens*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 20 мл у флаконах-крапельницях	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/3274/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

409	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	Viride nitens*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/8011/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
410	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	Viride nitens*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % у флаконах по 10 мл, 20 мл або по 25 мл	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України"	Україна	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України"	Україна	UA/18711/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
411	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	Viride nitens*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, по 20 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3180/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

412	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	Viride nitens*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, у флаконах скляних укупорених пробками та кришками полімерними по 10 мл або 20 мл; у полімерних флаконах укупорених пробками-крапельницями та кришками полімерними по 10 мл або 20 мл	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	UA/19400/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
413	БРОМГЕКСИН	Bromhexine	таблетки по 8 мг по 20 таблеток у блістерах; по 20 таблеток у блістері; по 1, 2 або 3 блістери у пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/1688/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
414	БРОМГЕКСИН-ДАРНИЦЯ	Bromhexine	таблетки по 8 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 5 контурних чарункових упаковок у пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках; по 20 таблеток у контурних чарункових упаковках	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/5902/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

415	БРОМГЕКСИН-ЗДОРОВ'Я	Bromhexine	таблетки по 8 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 5 блістерів у картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; по 20 таблеток у блістерах	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/7336/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
416	БРОМГЕКСИН 8 БЕРЛІН-ХЕМІ	Bromhexine	таблетки, вкриті оболонкою, по 8 мг по 25 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ	Німеччина	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво нерозфасованого продукту, контроль серії; пакування, контроль та випуск серії)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (пакування)/Драгенофарм Апотекер Пюшл ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, контроль серії)/СВІСС КАПС ГмбХ (пакування)	Німеччина / Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/9663/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
417	БРОНХАЛІС-ХЕЕЛЬ	Comb drug	таблетки, по 50 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в коробці	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/1932/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Закривати контейнер із таблетками негайно після застосування, захищати від вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці! Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

418	БРОНХИПРЕТ®	Comb drug	розчин, по 50 мл або по 100 мл у флаконі з мірним ковпачком, вміщеним у картонну коробку	Біонорика СЕ	Німеччина	Біонорика СЕ	Німеччина	UA/8673/01/01	Для захисту від впливу світла зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця. Після першого відкриття флакона лікарський засіб придатний для застосування протягом 6 місяців.
419	БРОНХИПРЕТ®	Comb drug	сироп, по 50 мл або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Біонорика СЕ	Німеччина	Біонорика СЕ	Німеччина	UA/8673/02/01	Для захисту від впливу світла зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Після відкриття флакона препарат можна застосовувати протягом 6 місяців. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

420	БРОНХИПРЕТ® Н	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; по 25 таблеток у блістері; по 2 або 4 блістери у картонній коробці	Біонорика СЕ	Німеччина	Біонорика СЕ (первинне та вторинне пакування, контроль (фізико-хімічний, мікробіологічний) та випуск серії)/Роттендорф Фарма ГмбХ (виробничі операції: рослинний продукт (таблетки))/Роттендорф Фарма ГмбХ (первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/21132/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
421	БРОНХИПРЕТ® ТП	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 20 таблеток в блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; по 25 таблеток в блістері; по 2 або 4 блістери у картонній коробці	Біонорика СЕ	Німеччина	Біонорика СЕ (первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Роттендорф Фарма ГмбХ (Виробництво in-bulk; первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Німеччина	UA/8674/01/01	Для захисту від впливу світла зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С у недоступному для дітей місці.
422	БРОНХІАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ БЕЛЛ'С	Comb drug	розчин для перорального застосування по 100 мл або по 200 мл в пляшці; по 1 пляшці в картонній коробці	Євро Лайфкер Лтд	Велика Британія	Белл Санз & Компані (Драггістс) Лімітед	Велика Британія	UA/6177/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

423	БРОНХО-ГРАН	Comb drug	гранули, по 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 10 г гранул у флаконі з кришкою, по 1 флакону в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/8452/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25оС.
424	БРОНХО-МУНАЛ®	Comb drug	капсули тверді по 7 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Лек фармацевтична компанія д.д. (контроль серії (лише мікробіологічний), випуск серії)/ОМ Фарма СА (виробництво in bulk, контроль серії)/Новартіс Фармасьютікал Мануфактуринг ЛЛС (первинне та вторинне пакування, контроль серії (окрім мікробіологічного), випуск серії)	Словенія/ Швейцарія/Словенія	UA/14314/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.

425	БРОНХО-МУНАЛ® П	Comb drug	капсули тверді по 3,5 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери у картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Лек фармацевтична компанія д.д. (контроль серії (лише мікробіологічний), випуск серії)/ОМ Фарма СА (виробництво in bulk, контроль серії)/Новартіс Фармасьютікал Мануфактуринг ЛЛС (первинне та вторинне пакування, контроль серії (окрім мікробіологічного), випуск серії)	Словенія/ Швейцарія/Словенія	UA/14268/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
426	БРОНХО ВЕДА ПЛЮС	Comb drug	сироп по 100 мл у флаконах; по 1 флакону з мірним ковпачком у картонній коробці	Євро Лайфкер Лтд	Велика Британія	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	UA/5141/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
427	БРОНХО ПЛАНТАГО ГЛОБУЛІ ВЕЛАТІ	Comb drug	гранули гомеопатичні по 20 г у флаконі; по 1 флакону в коробці з картону	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/15544/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
428	БРОНХО ТАЙСС КРАПЛІ	Comb drug	краплі для перорального застосування, по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	UA/9794/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

429	БРОНХОЛІТИН	Cough suppressants and mucolytics	сироп; по 125 г у флаконі скляному або з поліетилентерефталату; по 1 флакону з мірним стаканчиком у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка; дозвіл на випуск серії)	Болгарія	UA/10064/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати! Термін придатності після розкриття флакона – 1 місяць.
430	БРОНХОЛІТИН ТАБ	Glaucine*	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг, по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма" (Виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/АТ "ВІТАМІНИ" (Вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)	Болгарія/ Україна	UA/3119/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
431	БРОНХОЛІТИН ТАБ	Glaucine*	таблетки, вкриті оболонкою, по 40 мг, по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма" (Виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/АТ "ВІТАМІНИ" (Вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)	Болгарія/ Україна	UA/3119/01/02	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

432	БРОНХОМЕД БАЛЬЗАМ	Comb drug	розчин для перорального застосування; по 100 мл або по 200 мл в пляшці; по 1 пляшці в картонній коробці	Євро Лайфкер Лтд	Велика Британія	Белл Санз & Компані (Драггістс) Лімітед	Велика Британія	UA/12716/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
433	БРОНХОМУЦИН	Carbocisteine	сироп 2 % по 120 мл сиропу в скляному флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	ПП "ГЛЕДЕКС"	Україна	ТОВ "Арпімед"	Республіка Вірменія	UA/14603/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
434	БРОНХОМУЦИН	Carbocisteine	сироп 5 % по 120 мл сиропу в скляному флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	ПП "ГЛЕДЕКС"	Україна	ТОВ "Арпімед"	Республіка Вірменія	UA/14603/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
435	БРОНХОСИРОП	Comb drug	сироп по 100 мл або 200 мл у флаконі; по 1 флакону разом з дозуючим пристроєм у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"	Україна	UA/17359/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати! Термін придатності після розкриття флакона 1 місяць.
436	БРОНХОСОЛ	Comb drug	сироп по 100 мл або 200 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком в картонній коробці	Фітофарм Кленка С.А.	Польща	Фітофарм Кленка С.А.	Польща	UA/16418/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
437	БРОНХОСТОП® ПАСТИЛКИ	Thymus serpyllum**	пастилки по 59,5 мг по 10 пастилок у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Квізда Фарма ГмбХ	Австрія	Квізда Фарма ГмбХ (випуск серій)/Болдер Арзнеіміттел ГмбХ & Ко.КГ (виробництво, контроль якості, первинне та вторинне пакування)	Австрія/ Німеччина	UA/9915/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

438	БРОНХОСТОП® СИРОП	Comb drug	сироп по 120 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з мірним стаканчиком в коробці з картону	Квізда Фарма ГмбХ	Австрія	Квізда Фарма ГмбХ	Австрія	UA/9915/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту вмісту від світла. Після використання щільно закрити флакон. Після першого відкриття зберігати 4 тижні.
439	БРОНХОТОН АМБРО	Ambroxol	сироп, 15 мг/5 мл, по 120 мл у флаконі, по 1 флакону разом з мірним стаканчиком в картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Республіка Болгарія	ВЕТПРОМ АД, виробнича дільниця Віфарма	Республіка Болгарія	UA/20085/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття флакона – 28 днів.
440	БРОНХОТОН АМБРО	Ambroxol	сироп, 30 мг/5 мл, по 120 мл у флаконі, по 1 флакону разом з мірним стаканчиком в картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Республіка Болгарія	ВЕТПРОМ АД, виробнича дільниця Віфарма	Республіка Болгарія	UA/20085/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття флакона – 28 днів.
441	БРОНХОФІТ	Comb drug	збір по 50 г або 100 г у пакеті, вкладеному в пачку; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	UA/3546/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.
442	БРОНХОФІТ	Comb drug	настойка складна, по 100 мл у банці скляній; по 1 банці в пачці; по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці в пачці; по 100 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону в пачці	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	UA/3546/02/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.
443	БРУСТАН	Ibuprofen, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	UA/4617/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в сухому та недоступному для дітей місці.

444	ВАГІКАЛЬ	Calendula officinalis**	супозиторії вагінальні по 150 мг; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у картонній упаковці	Фарміна Лтд	Польща	Фарміна Лтд	Польща	UA/10899/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
445	ВАЗАВІТАЛ®	Comb drug	капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону; по 90 капсул у банці полімерній, по 1 банці в коробці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"/ПрАТ "Біолік"	Україна/ Україна	UA/6628/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
446	ВАЗЕЛІН	Vaseline*	мазь по 25 г або по 50 г у контейнерах; по 20 г у тубах алюмінієвих; по 20 г у тубі алюмінієвій, по 1 тубі в пачці; по 25 г у тубах алюмінієвих; по 25 г у тубі алюмінієвій, по 1 тубі в пачці; по 20 г, по 25 г, по 30 г або по 40 г у тубах ламінатних; по 20 г, по 25 г, по 30 г або по 40 г у тубі ламінатній; по 1 тубі у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6520/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

447	ВАЗЕЛІН	Vaseline*	мазь, по 30 г у тубах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/0845/01/01	В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
448	ВАЗЕЛІН	Vaseline*	мазь, по 30 г у тубах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/0845/01/01	В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

449	ВАЗЕЛІН	Vaseline*	мазь; по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8304/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
450	ВАЗЕЛІН МЕДИЧНИЙ	Vaseline*	мазь для зовнішнього застосування; по 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/5363/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
451	ВАЗЕЛІНОВЕ МАСЛО	Vaseline*	масло, по 25 мл або по 50 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/0408/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
452	ВАЗЕЛІНОВЕ МАСЛО	Vaseline*	масло; по 25 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками або кришками; по 30 мл або по 40 мл, або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками або пробками-крапельницями та кришками, в пачці або без пачки; по 30 мл або по 40 мл, або по 50 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками, в пачці або без пачки; по 40 мл або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах полімерних, укупорених кришками, в пачці або без пачки	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6520/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступно-му для дітей місці.

453	ВАЗОКЕТ®	Diosmin	таблетки по 600 мг; по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	Страген Фарма СА	Швейцарія	Фітео Лабораторуар	Франція	UA/4403/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
454	ВАЛДИКАРДИН	Barbiturates in combination with other drugs	краплі оральні, по 20 мл або 50 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/19122/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
455	ВАЛЕКАРД-ЗДОРОВ'Я	Barbiturates in combination with other drugs	краплі оральні, розчин по 20 мл або 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею і кришкою, у коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (фасування із "in bulk" фірми-виробника Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна)	Україна	UA/11114/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
456	ВАЛЕКАРД-ЗДОРОВ'Я	Barbiturates in combination with other drugs	таблетки по 10 таблеток у блістері; по 1 або 5 блістерів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"	Україна	UA/14815/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

457	ВАЛЕРИКА	Valerianae radix	капсули по 350 мг по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/4404/02/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
458	ВАЛЕРІАНА	Valerianae radix	настойка для перорального застосування по 25 мл у флаконах-крапельницях скляних,по 100 мл у флаконах скляних, по 100 мл у флаконі скляному, по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5387/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
459	ВАЛЕРІАНА	Valerianae radix	таблетки, вкриті оболонкою, по 30 мг; по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці; по 20 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма"	Болгарія	UA/8806/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
460	ВАЛЕРІАНА ЕКСТРАКТ	Valerianae radix	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 або по 10 блістерів у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/17560/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

461	ВАЛЕРІАНА ФОРТЕ	Valerianae radix	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/0265/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
462	ВАЛЕРІАНА ФОРТЕ	Valerianae radix	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг, по 10 таблеток у блістері; по 5 або по 10 блістерів у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/17505/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
463	ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ	Valerianae radix	таблетки, вкриті оболонкою, по 20 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 50 таблеток у блістерах; по 50 таблеток у контейнерах; по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів в пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8994/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
464	ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ	Valerianae radix	таблетки, вкриті оболонкою, по 20 мг; по 50 таблеток у флаконах; по 50 таблеток у блістерах; по 10 таблеток в блістері, по 5 блістерів в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8139/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
465	ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ АРТЕРІУМ	Valerianae radix	таблетки, вкриті оболонкою, по 20 мг, по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці; по 50 таблеток у блістерах	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/0265/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

466	ВАЛЕРІАНИ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ	Valerianae radix	кореневища з коренями по 50 г або 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/5668/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
467	ВАЛЕРІАНИ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ	Valerianae radix	кореневища з коренями по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2119/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
468	ВАЛЕРІАНИ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ	Valerianae radix	кореневища з коренями; по 40 г та 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5387/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.
469	ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА	Valerianae radix	настойка для перорального застосування по 25 мл у полімерних флаконах, укупорених пробками-крапельницями та кришками полімерними, по 50 мл у скляних флаконах	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/8098/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

470	ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА	Valerianae radix	настойка для перорального застосування; по 25 мл або по 50 мл у флаконах, закупорених пробками та кришками; по 25 мл у флаконі, закупореному пробкою та кришкою; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та кришкою, що нагвинчуються; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3505/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
471	ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА	Valerianae radix	настойка по 25 мл у скляних флаконах-крапельниця або полімерних флаконах; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 мл у скляних флаконах-крапельниця або у полімерних флаконах	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8419/01/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
472	ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА	Valerianae radix	настойка по 25 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8139/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
473	ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА	Valerianae radix	настойка по 25 мл у флаконах	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8139/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

474	ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА	Valerianae radix	настойка по 25 мл у флаконах-крапельницях; по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у пачці з картону; по 30 мл у флаконах або у флаконах з пробками-крапельницями, або у флаконах з контролем першого розкриття; по 30 мл у флаконі або у флаконах з пробками-крапельницями, або у флаконах з контролем першого розкриття; по 1 флакону у пачці з картону	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	UA/6718/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

475	ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА	Valerianae radix	настойка, по 25 мл у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці; по 25 мл або по 50 мл у флаконах скляних; по 25 мл або по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками-крапельницями; по 25 мл або по 50 мл у флаконі скляному, укупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці; по 25 мл або по 50 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями і кришками; по 25 мл або по 50 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею і кришкою; по 1 флакону в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2119/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
476	ВАЛЕРІАНКА-ВІШФА	Valerianae radix	настойка для перорального застосування, по 25 мл у флаконах скляних або полімерних	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16776/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

477	ВАЛІДОЛ-ЛУБНИФАРМ	Validol*	таблетки по 60 мг по 6 або 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 5, або 10 блістерів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/4697/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
478	ВАЛОКОРДИН®	Barbiturates in combination with other drugs	краплі оральні, розчин; по 20 мл або 50 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці	Кревель Мойзельбах ГмбХ	Німеччина	Кревель Мойзельбах ГмбХ	Німеччина	UA/8462/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
479	ВАЛОКОРМІД	Comb drug	краплі оральні по 30 мл у флаконах скляних; по 30 мл у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 мл у флаконах-крапельницях скляних або у флаконах полімерних з пробкою-крапельницею; по 25 мл у флаконі-крапельниці скляному або у флаконі полімерному з пробкою-крапельницею; по 1 флакону-крапельниці скляному або флакону полімерному з пробкою-крапельницею в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8622/01/01	Зберігати у недоступному для дітей та захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС.

480	ВАЛОКОРМІД	Comb drug	краплі оральні, по 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8535/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
481	ВАМЕЛАН	Comb drug	капсули м'які по 15 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	П.П.Ф. ХАСКО-ЛЕК С.А./УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Польща/ Туреччина	UA/17495/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
482	ВЕНОГЕПАНОЛ	Heparin, combinations	гель по 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/7100/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
483	ВЕНОГЕПАНОЛ 1000	Heparin, combinations	гель по 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/16813/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

484	ВЕНОПЛАНТ	Hippocastani semen	таблетки з відстроченим вивільненням, по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; по 25 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/8371/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
485	ВЕНОРМ	Diosmin, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг, по 10 таблеток в блістері, по 3 або по 6 блістерів у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/18081/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
486	ВЕНОРУТИНОЛ	Rutoside	гель 2 % по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/2354/02/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.
487	ВЕНОРУТИНОЛ	Rutoside	капсули по 300 мг; по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/2354/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

488	ВЕНОСМІН®	Diosmin, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)	Україна	UA/9747/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
489	ВЕНОСМІН®	Diosmin, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)	Україна	UA/9747/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
490	ВЕНОТОН®	Comb drug	настойка по 100 мл у банці скляній; по 1 банці в пачці з картону; по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці з картону	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	UA/11668/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
491	ВЕРОНА	Comb drug	капсули; по 20 або 60 капсул у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/9023/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

492	ВЕРТІГОХЕЕЛЬ	Comb drug	краплі оральні; по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/5303/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці!
493	ВЕС-НОРМА	Comb drug	гранули по 10 г гранул у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/3812/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
494	ВИПРОСАЛ В®	Comb drug	мазь по 30 г, 50 г або 75 г у тубі; по 1 тубі в картонній пачці	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ Таллінський фармацевтичний завод	Естонія	UA/3885/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не зберігати у холодильнику та морозильній камері. Зберігати в недоступному для дітей місці.
495	ВІАЛЬ®	Tetryzoline	краплі очні, 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/4228/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
496	ВІАЛЬ® ЛАЙТ	Tetryzoline	краплі очні, 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/10447/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності препарату після розкриття флакона – 28 діб.
497	ВІБРОЦИЛ	Comb drug	краплі назальні; по 15 мл у скляному флаконі з поліпропіленовою кришкою-крапельницею; по 1 флакону в картонній коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Халеон КХ С.а.р.л.	Швейцарія	UA/4564/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, захищаючи від світла та нагрівання, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

498	ВІБРОЦИЛ	Comb drug	спрей назальний, дозований; по 15 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону у картонній коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Халеон КХ С.а.р.л.	Швейцарія	UA/4564/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
499	ВІБУРКОЛ	Comb drug	супозиторії, по 6 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/6662/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.
500	ВІВАБОН	Comb drug	сироп; по 120 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/10786/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
501	ВІГОР	Comb drug	бальзам для перорального застосування, по 200 мл у флаконах; по 200 мл, 250 мл або 500 мл у пляшках; по 100 мл у банках	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/8099/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
502	ВІГОР-САНТО	Comb drug	розчин оральний по 100 мл або 200 мл у флаконах, по 500 мл у пляшках	ТОВ "ГемоПлазма"	Україна	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України"	Україна	UA/15304/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °. Зберігати у недоступному для дітей місці. Під час зберігання допускається випадання осаду.
503	ВІДЕЇН	Colecalciferol	капсули м'які по 100 мкг (4000 МО), по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18050/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

504	ВІДЕЇН	Colecalciferol	капсули м'які по 12,5 мкг (500 МО), по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18050/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
505	ВІДЕЇН	Colecalciferol	капсули м'які по 25 мкг (1000 МО), по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18050/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
506	ВІДІСІК	Carbomer*	гель очний 0,2 %; по 10 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВ "БАУШ ХЕЛС"	Україна	Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ	Німеччина	UA/8536/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття туби її вміст придатний до застосування 6 тижнів.
507	ВІЗОПТІК	Tetryzoline	краплі очні, розчин, 0,5 мг/мл; по 5 мл у флаконі з крапельницею і кришкою з гарантійним кільцем; по 2 флакони в картонній коробці	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А.	Польща	ДЖАДРАН ГАЛЕНСЬКІ ЛАБОРАТОРІЙ д.д.	Хорватія	UA/14935/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Відкритий флакон зберігати при температурі не вище 25 °С. Термін придатності препарату після першого відкриття – 28 днів. Флакон по 0,5 мл слід використати одразу після відкриття.
508	ВІКАЇР®	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у стрипах або блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна/ Україна	UA/4946/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
509	ВІКАЛІН	Comb drug	таблетки по 10 таблеток у блістерах або стрипах; по 10 таблеток у блістері; по 2 або 10 блістерів у пачці з картону; по 10 таблеток у стрипі; по 2 або 10 стрипів у пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/7212/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

510	ВІКАЛІН®	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у стрипах або у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна/ Україна	UA/4775/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
511	ВІКС АКТИВ БАЛЬЗАМ З МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛІПТОМ	Comb drug	мазь по 25 г або 50 г, або 100 г у банці; по 1 банці у коробці	Проктер енд Гембл Інтернешнл Оперейшнз СА	Швейцарія	Проктер енд Гембл Мануфекчурінг ГмбХ	Німеччина	UA/11440/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
512	ВІКС АКТИВ МЕДЕКСПЕКТО	Guaifenesin	сироп, 200 мг/15 мл; по 120 мл або 180 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним ковпачком у коробці	Проктер енд Гембл Інтернешнл Оперейшенз СА	Швейцарія	Проктер енд Гембл Мануфекчурінг ГмбХ	Німеччина	UA/13741/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона – 3 місяці.
513	ВІКС АКТИВ МЕДІНАЙТ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	сироп; по 30 мл або по 90 мл, або по 100 мл, або по 120 мл, або по 180 мл, або по 240 мл у пляшці; по 1 пляшці разом з мірним стаканчиком у коробці	Проктер енд Гембл Інтернешнл Оперейшенз С.А.	Швейцарія	Проктер енд Гембл Мануфекчурінг ГмбХ	Німеччина	UA/13502/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
514	ВІКС АКТИВ СИНЕКС	Oxymetazoline	спрей назальний, 0,5 мг/мл; по 15 мл у флаконі з розпилюючим пристроєм; по 1 флакону у коробці	Проктер енд Гембл Інтернешнл Оперейшенз СА	Швейцарія	Проктер енд Гембл Мануфекчурінг ГмбХ	Німеччина	UA/10927/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
515	ВІКС АНТИГРИП КОМПЛЕКС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 5 або 10 саше у коробці	Проктер енд Гембл Інтернешнл Оперейшнз СА	Швейцарія	Рафтон Лабораторіз Лімітед	Велика Британія	UA/11414/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

516	ВІКС АНТИГРИП МАКС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину зі смаком лимона по 5 або 10 саше у коробці	Проктер енд Гембл Інтернешнл Оперейшенз СА	Швейцарія	Рафтон Лабораторіз Лімітед	Велика Британія	UA/10925/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
517	ВІНІЛІН® (БАЛЬЗАМ ШОСТАКОВСЬКОГО)	Vinilin*	рідина нашкірна по 100 г у флаконах полімерних; по 50 г або по 100 г у банках полімерних; по 100 г у флаконі полімерному, по 1 флакону в пачці; по 100 г у банці полімерній, по 1 банці у пачці; по 50 г у банці полімерній; по 1 банці у пачці	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/0964/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
518	ВІОДІН	Povidone-iodine	розчин нашкірний 100 мг/мл; по 30 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному кришкою-піпеткою, у пачці; по 100 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному насадкою та кришкою, у пачці; по 1000 мл у флаконі, укупореному кришкою або крапельницею та кришкою	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/19094/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
519	ВІПРАТОКС	Comb drug	лінімент по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/5669/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

520	ВІРОТЕК ІНТИМ	Benzalkonium	розчин для зовнішнього застосування 0,02 %, по 50 г у флаконі; по 1 флакону у пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мультіспрей"	Україна	UA/9773/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
521	ВІРОТЕК КЛІНІК	Benzalkonium	розчин для зовнішнього застосування 0,05 %, по 250 г у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мультіспрей"	Україна	UA/9773/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
522	ВІС-НОЛ®	Bismuth subcitrate	капсули по 120 мг, по 10 капсул у блістері; по 3 або по 10 блістерів в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/5192/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
523	ВІТАДИН	Povidone-iodine	розчин нашкірний 100 мг/мл, по 30 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному кришкою-піпеткою, у пачці; по 100 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному насадкою та кришкою, у пачці; по 1000 мл у флаконі, укупореному кришкою, по 1000 мл у флаконі, укупореному крапельницею та кришкою	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/20252/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

524	ВІТАДИН	Povidone-iodine	розчин нашкірний 100 мг/мл; по 30 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному кришкою-піпеткою або насадкою та кришкою, або пробкою-крапельницею та кришкою, у пачці; по 30 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному кришкою, у пачці з кришкою-піпеткою; по 100 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному насадкою та кришкою, у пачці; по 1000 мл у флаконі, укупореному кришкою або крапельницею та кришкою	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/20252/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
525	ВІТАКСОН®	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток в блістері, по 3 або 6 блістерів в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/10507/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 о С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
526	ВІТАМІН D3 КРКА	Colecalciferol	таблетки по 1000 МО (25 мкг), по 10 таблеток у блістері, по 3 або по 6, або по 9, або по 18 блістерів у коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	UA/19044/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії світла. Зберігати в недоступному для дітей місці.

527	ВІТАМІН D3 КРКА	Colecalciferol	таблетки по 500 МО (12,5 мкг), по 10 таблеток у блістері, по 3 або по 6, або по 9, або по 18 блістерів у коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	UA/19044/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії світла. Зберігати в недоступному для дітей місці.
528	ВІТАМІН А	Retinol (vit A)	капсули м'які по 100 000 МО; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці; по 10 капсул у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 20 капсул у блістері; по 1 блістеру у пачці; по 20 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/0716/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
529	ВІТАМІН А	Retinol (vit A)	капсули м'які по 33 000 МО; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці; по 10 капсул у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 20 капсул у блістері; по 1 блістеру у пачці; по 20 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/0716/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
530	ВІТАМІН А-ЗДОРОВ`Я	Retinol (vit A)	капсули м`які по 100000 МО; по 10 капсул у блістері; по 5 блістерів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/16142/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

531	ВІТАМІН А-ЗДОРОВ`Я	Retinol (vit A)	капсули м`які по 33000 МО; по 10 капсул у блістері; по 5 блістерів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/16142/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
532	ВІТАМІН А+Е-ЗДОРОВ'Я	Combinations of vitamins	капсули м`які, по 10 капсул у блістері; по 3 блістери або по 5 блістерів у коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/16043/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
533	ВІТАМІН Е	Tocopherol (vit E)	капсули м'які по 100 мг по 10 капсул у блістерах; по 10 капсул у блістері; по 1, або по 3, або по 5 блістерів у пачці; по 20 капсул у блістері; по 1, або по 2, або по 3 блістери у пачці; по 50 капсул у блістері; по 1 блістеру у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/0717/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
534	ВІТАМІН Е	Tocopherol (vit E)	капсули м'які по 200 мг по 10 капсул у блістерах; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/0717/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
535	ВІТАМІН Е	Tocopherol (vit E)	капсули м'які по 400 мг по 10 капсул у блістері, по 1 або по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/0717/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

536	ВІТАМІН Е-ЗДОРОВ’Я	Tocopherol (vit E)	капсули м`які по 100 мг; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери або по 5 блістерів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/16044/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
537	ВІТАМІН Е-ЗДОРОВ’Я	Tocopherol (vit E)	капсули м`які по 200 мг; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/16044/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
538	ВІТАМІН Е-ЗДОРОВ’Я	Tocopherol (vit E)	капсули м`які по 400 мг; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/16044/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
539	ВІТАМІН С	Ascorbic acid (vit C)	таблетки жувальні зі смаком апельсину по 500 мг по 8 таблеток у блістері; по 3 або 7 блістерів у пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/16002/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
540	ВІТАМІН С	Ascorbic acid (vit C)	таблетки жувальні по 500 мг по 8 таблеток у блістері; по 3 або 7 блістерів у пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/16001/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

541	ВІТАМІН С 500	Ascorbic acid (vit C)	таблетки жувальні з апельсиновим смаком по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів в пачці; по 30 таблеток у контейнері (баночці); по 1 контейнеру (баночці) у пачці; по 10 таблеток у блістерах; по 30 таблеток у контейнерах (баночках)	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/5623/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
542	ВІТАМІН С 500	Ascorbic acid (vit C)	таблетки жувальні з лимонним смаком по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів в пачці; по 30 таблеток у контейнері (баночці); по 1 контейнеру (баночці) у пачці; по 10 таблеток у блістерах; по 30 таблеток у контейнерах (баночках)	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/5624/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

543	ВІТАМІН С 500	Ascorbic acid (vit C)	таблетки жувальні з персиковим смаком по 500 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів в пачці; по 30 таблеток у контейнері (баночці); по 1 контейнеру (баночці) у пачці; по 10 таблеток у блістерах; по 30 таблеток у контейнерах (баночках)	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/1861/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

544	ВІТАМІН С 500	Ascorbic acid (vit C)	таблетки жувальні, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2, або по 10 блістерів у картонній коробці; по 10 таблеток у блістерах; по 30 або по 50 таблеток у контейнерах (для виробника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я»); по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; по 30 таблеток у контейнерах (для виробника Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП»)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/5358/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
545	ВІТАМІН С 500 АПЕЛЬСИНОВИЙ	Ascorbic acid (vit C)	таблетки жувальні по 500 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 10 блістерів у пачці з картону; по 12 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	UA/16251/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

546	ВІТАПРОСТ	Mono	супозиторії ректальні; по 5 супозиторіїв у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки у пачці	ТОВ "ФЗ "СТАДА"	Україна	ТОВ "ФЗ "СТАДА"	Україна	UA/14209/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
547	ВОБЕНЗИМ	Comb drug	таблетки кишковорозчинні, по 20 таблеток у блістері; по 2 або 10 блістерів у картонній коробці; по 800 таблеток у банках	МУКОС Фарма ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	МУКОС Емульсіонсгезелльшафт мбХ	Німеччина	UA/2842/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.
548	ВОБІЛОН	Ginkgo folium	капсули тверді, 80 мг; по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/21006/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
549	ВОВЧУГ	Ononis arvensis**	настойка для перорального застосування, по 100 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5465/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається випадання осаду.

550	ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ	Aqua pro injectioni*	розчинник для парентерального застосування по 100 мл, або по 200 мл, або по 400 мл у пляшках скляних, по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл, або по 1000 мл, або по 2000 мл, або по 3000 мл, або по 5000 мл у контейнерах полімерних; по 2 мл або по 5 мл у контейнері однодозовому; по 10 контейнерів у пачці з картону; по 10 мл або по 20 мл у контейнері однодозовому; по 5 контейнерів у пачці з картону	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	UA/5625/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
551	ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ	Aqua pro injectioni*	розчинник для парентерального застосування по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці; по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/10078/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

552	ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ	Aqua pro injectioni*	розчинник для парентерального застосування, по 2 мл або 5 мл в ампулах полімерних, по 10 ампул в пачці	Приватне акціонерне товариство "Інфузія"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Інфузія"	Україна	UA/18610/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
553	ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ	Aqua pro injectioni*	розчинник для парентерального застосування; по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці з картону або по 5 мл в ампулі по 10 або 50 ампул у пачці з картону	ТОВ "ФАРМАСЕЛ"	Україна	ТОВ "ФАРМАСЕЛ"	Україна	UA/20206/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
554	ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ	Aqua pro injectioni*	розчинник для парентерального застосування; по 400 мл у пляшках	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	UA/5625/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
555	ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ-ЗДОРОВ'Я	Aqua pro injectioni*	розчинник для парентерального застосування по 2 мл або 5 мл в ампулі, по 10 ампул у картонній коробці; по 2 мл або 5 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у картонній коробці; по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/9630/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

556	ВОДНЮ ПЕРОКСИД	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування 3 % по 100 мл у банках або флаконах полімерних; по 200 мл у флаконах полімерних	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/19054/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
557	ВОДНЮ ПЕРОКСИД	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування 3 % по 100 мл у банках або флаконах полімерних; по 200 мл у флаконах полімерних	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/19054/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
558	ВОДНЮ ПЕРОКСИД	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування 3 %; по 100 мл, 200 мл у флаконах	ТОВ "Фарма Черкас"	Україна	ТОВ "Фарма Черкас"	Україна	UA/15006/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
559	ВОДЯНОГО ПЕРЦЮ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ	Polygonum hydropiper**	екстракт рідкий; по 25 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/1093/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
560	ВОДЯНОГО ПЕРЦЮ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ	Polygonum hydropiper**	екстракт рідкий; по 25 мл у флаконах	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/1093/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

561	ВОКАСЕПТ ЛЬОДЯНИКИ	Comb drug	льодяники (Апельсин) № 1: по 1 льодянику в конверті; № 100, № 200, № 300: по 1 льодянику в конверті, по 100, 200 або 300 конвертів у банці; № 6: по 6 льодяників у блістері; по 1 блістеру в коробці; № 12, № 24: по 12 льодяників у блістері, по 1 або 2 блістери в коробці	Мапекс Консьюмер Хелскер Прайвіт Лімітед	Індія	Максон Хелткер ПВТ. ЛТД.	Індія	UA/3109/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
562	ВОКАСЕПТ ЛЬОДЯНИКИ	Comb drug	льодяники (М'ятно-Евкаліптові); № 1: по 1 льодянику в конверті; № 100, № 200, № 300: по 1 льодянику в конверті; по 100, 200 або 300 конвертів з льодяником в банці; № 6: по 6 льодяників у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; № 12, № 24: по 12 льодяників у блістері, по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Мапекс Консьюмер Хелскер Прайвіт Лімітед	Індія	Максон Хелткер ПВТ. ЛТД.	Індія	UA/3108/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

563	ВОКАСЕПТ ЛЬОДЯНИКИ	Comb drug	льодяники (Медово-Лимонні) № 1: по 1 льодянику в конверті; № 100, № 200, № 300: по 1 льодянику в конверті, по 100, 200 або 300 конвертів у банці; № 6: по 6 льодяників у блістері; по 1 блістеру в коробці; № 12, № 24: по 12 льодяників у блістері, по 1 або 2 блістери в коробці	Мапекс Консьюмер Хелскер Прайвіт Лімітед	Індія	Максон Хелткер ПВТ. ЛТД.	Індія	UA/3107/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
564	ВОКАСЕПТ ЛЬОДЯНИКИ	Comb drug	льодяники (Регуляр), № 1: по 1 льодянику в конверті; № 100, № 200, № 300: по 1 льодянику в конверті, по 100, 200 або 300 конвертів у банці; № 6: по 6 льодяників у блістері; по 1 блістеру в коробці; № 12, № 24: по 12 льодяників у блістері, по 1 або 2 блістери в коробці	Мапекс Консьюмер Хелскер Прайвіт Лімітед	Індія	Максон Хелткер ПВТ. ЛТД.	Індія	UA/12173/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
565	ВОЛВІТ®	Biotin	таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/9290/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

566	ВОЛЬТАРЕН® ПЛАСТИР 24 ГОДИНИ	Diclofenac	пластир трансдермальний 15 мг; по 2 або 5 пластирів у пакеті; по 1 або 2 пакети у картонній коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Доджин Іяку-Како Ко., Лтд. (виробник ГЛЗ, первинне пакування, контроль якості, вторинне пакування, випуск серії)/ФАМАР А.В.Е. - ЗАВОД АВЛОН 48-й КМ ДЕРЖАВНОЇ ДОРОГИ АФІНИ - ЛАМІЯ (вторинне пакування, випуск серії)	Японія/ Греція	UA/9383/03/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці для захисту від світла та вологи. Після відкриття пакета невикористані пластирі продовжувати зберігати в пакеті. Після закінчення курсу лікування пластирі, що залишились у відкритому пакеті, слід утилізувати.
567	ВОЛЬТАРЕН® ПЛАСТИР 24 ГОДИНИ	Diclofenac	пластир трансдермальний 30 мг; по 2 або 5 пластирів у пакеті; по 1 або 2 пакети у картонній коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Доджин Іяку-Како Ко., Лтд. (виробник ГЛЗ, первинне пакування, контроль якості, вторинне пакування, випуск серії)/ФАМАР А.В.Е. - ЗАВОД АВЛОН 48-й КМ ДЕРЖАВНОЇ ДОРОГИ АФІНИ - ЛАМІЯ (вторинне пакування, випуск серії)	Японія/ Греція	UA/9383/03/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці для захисту від світла та вологи. Після відкриття пакета невикористані пластирі продовжувати зберігати в пакеті. Після закінчення курсу лікування пластирі, що залишились у відкритому пакеті, слід утилізувати.
568	ВРАТИЗОЛІН	Denotivir*	крем, 30 мг/г; по 3 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВ "БАУШ ХЕЛС УКРАЇНА"	Україна	Фармзавод Єльфа А.Т.	Польща	UA/11478/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

569	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ	Medicinal charcoal	таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 10 блістерів у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/9148/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, окремо від речовин, що виділяють гази та пари, при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
570	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ	Medicinal charcoal	таблетки по 250 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у контурних безчарункових упаковках	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/3954/01/01	В оригінальній упаковці, окремо від речовин і матеріалів, які виділяють пари і гази, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
571	ГАВІСКОН® ПОЛУНИЧНІ ТАБЛЕТКИ	Comb drug	таблетки жувальні; по 8 таблеток у блістері; по 2 або по 3 блістери у картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед (виробництво in bulk, пакування, контроль при випуску, випуск серії)/ФармаПас (Юкей) Лімітед (вторинне пакування)	Велика Британія/ Велика Британія	UA/9210/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
572	ГАЗОСПАЗАМ®	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 7 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній упаковці; по 15 таблеток у блістері; по 1, або 2, або 4 блістери у картонній коробці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/10661/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

573	ГАЙМОРИН	Comb drug	гранули, по 10 г у пеналі полімерному або флаконі з кришкою; по 1 пеналу або флакону в пачці з картону або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/4618/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0 С.
574	ГАЛАЗОЛІН®	Xylometazoline	гель назальний 0,05 % по 10 г у флаконі з насосом-дозатором; по 1 флакону в пачці картонній	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; випуск серії)	Польща	UA/0401/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкривання флакона становить не більше 12 тижнів.
575	ГАЛАЗОЛІН®	Xylometazoline	гель назальний 0,1 % по 10 г у флаконі з насосом-дозатором; по 1 флакону в пачці картонній	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; випуск серії)	Польща	UA/0401/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкривання флакона становить не більше 12 тижнів.

576	ГАЛАЗОЛІН®	Xylometazoline	краплі назальні, розчин 0,05 %, по 10 мл у поліетиленових флаконах-крапельницях з контролем першого відкриття; по 1 флакону у картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (Виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; Випуск серії)	Польща	UA/0401/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкривання флакона становить 12 тижнів.
577	ГАЛАЗОЛІН®	Xylometazoline	краплі назальні, розчин 0,1 %; по 10 мл у поліетиленових флаконах-крапельницях з контролем першого відкриття; по 1 флакону у картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (Виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; Випуск серії)	Польща	UA/0401/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкривання флакона становить 12 тижнів.
578	ГАЛАЗОЛІН® КОМБІ	Comb drug	спрей назальний, розчин, (0,5 мг + 50,0 мг)/мл; по 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону з розчином у коробці картонній	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; випуск серії)	Польща	UA/16346/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття – 12 тижнів. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

579	ГАЛАЗОЛІН® КОМБІ	Comb drug	спрей назальний, розчин, (1,0 мг + 50,0 мг)/мл; по 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону з розчином у коробці картонній	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (Виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; Випуск серії)	Польща	UA/16346/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття – 12 тижнів. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
580	ГАРБУЗА ОЛІЯ	Cucurbita pero**	олія по 100 мл у флаконах; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	UA/5836/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
581	ГАСТРАЛЬ М`ЯТНА СУСПЕНЗІЯ	Comb drug	суспензія оральна по 90 мл або по 180 мл у флаконі; по 1 флакону у коробці з картону; по 10 мл у саше; по 20 саше у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/17032/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не зберігати у холодильнику та не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності препарату після розкриття флакона не більше 6 місяців.
582	ГАСТРАЛЬ М`ЯТНІ ТАБЛЕТКИ	Comb drug	таблетки жувальні, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/17407/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
583	ГАСТРИКУМЕЛЬ	Comb drug	таблетки; по 50 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/1629/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Закривати контейнер із таблетками негайно після застосування, захищати від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці! Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця.

584	ГАСТРИТОЛ	Comb drug	краплі оральні по 20 мл або по 50 мл, або по 100 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/17807/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона – 3 місяці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
585	ГАСТРИТОЛ "ДР. КЛЯЙН"	Comb drug	краплі оральні по 20 мл, або по 50 мл, або по 100 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/8950/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
586	ГАСТРО-ГРАН	Comb drug	гранули по 10 г гранул у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону або по 10 г гранул у флаконі з кришкою; по 1 флакону в пачці з картону, або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/8453/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25оС.
587	ГАСТРО-НОРМ®	Bismuth subcitrate	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 120 мг по 10 таблеток у блістері, по 4 або 10 блістерів у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна/ Україна	UA/1034/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
588	ГАСТРОФІТ	Comb drug	збір, по 50 г або 100 г у пакеті, вкладеному в пачку; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	UA/3565/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.

589	ГЕВКАМЕН	Comb drug	мазь по 15 г або по 25 г у тубах алюмінієвих; по 15 г або 25 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/0586/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
590	ГЕВКАМЕН	Comb drug	мазь по 20 г або по 30 г або по 40 г у тубах алюмінієвих; по 1 тубі у пачці з картону; по 20 г або по 30 г або по 40 г у тубах алюмінієвих; по 20 г або по 40 г у контейнерах; по 20 г, по 30 г або по 40 г у тубах ламінатних; по 20 г, по 30 г або по 40 г у тубах ламінатних; по 1 тубі в картонній пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7566/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
591	ГЕВКАМЕН	Comb drug	мазь, по 40 г в тубі; по 1 тубі в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/6071/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
592	ГЕВКАМЕН	Comb drug	мазь; по 20 г у контейнерах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8241/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
593	ГЕДЕЛАЙН	Hederae helicis folium	капсули по 52,5 мг, по 10 капсул у блістері, по 1 або по 2, або по 3 блістери в пачці	Приватне акціонерне товариство Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/21225/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

594	ГЕДЕЛИКС® КРАПЛІ БЕЗ СПИРТУ	Hederae helicis folium	краплі оральні, розчин; по 50 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у коробці	Кревель Мойзельбах ГмбХ	Німеччина	Кревель Мойзельбах ГмбХ	Німеччина	UA/8463/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після розкриття флакона – 6 місяців. Утворення осаду та помутніння препарату, що може виникнути при зберіганні протягом терміну придатності, не зменшує активності препарату і не є перешкодою для його застосування.
595	ГЕДЕЛИКС® СИРОП ВІД КАШЛЮ	Hederae helicis folium	сироп, 0,04 г/5 мл; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложкою в картонній коробці	Кревель Мойзельбах ГмбХ	Німеччина	Кревель Мойзельбах ГмбХ	Німеччина	UA/3521/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття флакона – 6 місяців. Під час зберігання може утворюватися осад, що при збовтуванні викликає помутніння.
596	ГЕДЕРИН	Hederae helicis folium	капсули по 52,5 мг, по 10 капсул у блістері, по 2 або по 3 блістера у коробці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18397/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
597	ГЕДЕРИН	Hederae helicis folium	капсули по 52,5 мг; по 10 капсул у блістері, по 2 або по 3 блістери у коробці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18397/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
598	ГЕДЕРИН	Hederae helicis folium	сироп по 90 мл у флаконі або банці; по 1 флакону або банці з дозуючою скляночкою в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/7526/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття упаковки препарат придатний протягом 6 місяців.
599	ГЕДЕРИН МАЗЬ	Comb drug	мазь по 20 г або по 25 г у банці; по 1 банці в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/11790/01/01	Зберігати у щільно укупореній тарі при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

600	ГЕКОКУР СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні по 30 мл, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/13592/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
601	ГЕКОКУР СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні по 30 мл, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/13592/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
602	ГЕКСАВІТ	Comb drug	драже по 50 драже в контейнері пластмасовому; по 1 контейнеру в пачці; по 50 драже в контейнері пластмасовому	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/5225/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
603	ГЕКСАВІТ	Comb drug	драже по 50 драже у контейнерах	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/3285/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
604	ГЕКСАВІТ	Comb drug	драже, по 50 драже у контейнерах (баночках); по 1 кг драже в пакеті поліетиленовому подвійному	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/4914/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
605	ГЕКСАЛІЗ	Comb drug	таблетки для розсмоктування; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці	Лабораторії Бушара Рекордаті	Франція	Лабораторії Бушара Рекордаті	Франція	UA/6005/01/01	Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.
606	ГЕКСАСПРЕЙ	Biclotymol*	спрей оромукозний, 750 мг/30 г, по 30 г у аерозольному флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Лабораторії Бушара Рекордаті	Франція	Лабораторії Бушара Рекордаті	Франція	UA/6180/01/01	Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

607	ГЕКСИТЕКС	Chlorhexidine	песарії по 16 мг; по 5 песаріїв у стрипі; по 1 або 2 стрипи у пачці із картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (контроль якості, повний цикл виробництва, випуск серії)	Україна	UA/15693/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
608	ГЕКСИТЕКС	Chlorhexidine	песарії по 16 мг; по 5 песаріїв у стрипі; по 1 або 2 стрипи у пачці із картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (контроль якості, повний цикл виробництва, випуск серії)	Україна	UA/15693/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
609	ГЕКСІГІН-М®	Chlorhexidine	песарії по 16 мг, по 5 песаріїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці із картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/13640/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
610	ГЕКСОСЕПТ®	Hexetidine	спрей для ротової порожнини 0,2 %, по 25 г у балоні; по 1 балону у пачці з картону	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/7900/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
611	ГЕКСОФАРМ	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 120 мл або по 200 мл у флаконі скляному; по 1 флакону з мірним стаканчиком в пачці; по 120 мл або по 200 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону з мірним стаканчиком в пачці	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/18048/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

612	ГЕКСОФАРМ	Comb drug	спрей для ротової порожнини по 50 мл у флаконі скляному, по 1 флакону разом з пульверизатором у пачці	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/18048/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
613	ГЕЛЬ ГЕПАРИНОВИЙ	Heparin	гель, 1000 МО/г по 25 г або 50 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/16419/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
614	ГЕЛЬ ГЕПАРИНОВИЙ	Heparin	гель, 1000 МО/г по 25 г або 50 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна)	Україна	UA/16419/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
615	ГЕЛЬ ПРИ ОПІКАХ ТА РАНАХ	Comb drug	гель по 30 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/17600/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальні упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

616	ГЕЛЬ ПРИ ОПІКАХ ТА РАНАХ	Comb drug	гель по 30 г, № 1 у тубі	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/17600/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальні упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
617	ГЕЛЬМІНТОКС	Pyrantel	суспензія оральна, 125 мг/2,5 мл; по 15 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в картонній коробці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі (виробник, відповідальний за контроль та випуск серії)/Тепеньє Фарма & Косметікс (виробник, відповідальний за виробництво in bulk та пакування)	Франція/ Франція	UA/10172/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
618	ГЕЛЬМІНТОКС	Pyrantel	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 125 мг; по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі	Франція	UA/10137/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
619	ГЕЛЬМІНТОКС	Pyrantel	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 250 мг; по 3 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі	Франція	UA/10137/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
620	ГЕМАТОГЕН	Mono	плитки, по 1 плитці (50 г) в плівці поліпропіленовій	ТОВ "Натур+"	Україна	ТОВ "Натур+"	Україна	UA/3794/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
621	ГЕМОПРОКТ	Comb drug	супозиторії ректальні; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/12641/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

622	ГЕМОРОЛЬ	Comb drug	супозиторії по 6 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці	Вроцлавське підприємство лікарських трав "ГЕРБАПОЛЬ" АТ	Польща	Вроцлавське підприємство лікарських трав "ГЕРБАПОЛЬ" АТ	Польща	UA/7628/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
623	ГЕМОРРОН	Comb drug	мазь для зовнішнього і ректального застосування по 57 г у тубі; по 1 тубі з аплікатором у картонній коробці	Фармасайнс Інк.	Канада	Фармасайнс Інк.	Канада	UA/7761/01/01	Зберігати у недоступних для дітей місцях при температурі не вище 25 °С.
624	ГЕМОФЕРОН	Iron, vitamin B12 and folic acid	розчин оральний по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком та/або дозуючим шприцом у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/7567/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
625	ГЕМОФЕРОН	Iron, vitamin B12 and folic acid	розчин оральний по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком та/або дозуючим шприцом у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/7567/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
626	ГЕНЕРОЛОН	Minoxidil	розчин нашкірний, 2 % по 60 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті з мірним насосом та розпилюючою насадкою в картонній пачці	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	Белупо, ліки та косметика, д.д. (вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Індастріал Фармасьютіка Кантабріа, С.А. (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування)	Хорватія/ Іспанія	UA/17808/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. 30 днів після першого відкриття флакону.

627	ГЕНЕРОЛОН	Minoxidil	розчин нашкірний, 2 %; по 60 мл у флаконі, по 1 флакону в комплекті з мірним насосом та розпилюючою насадкою в картонній пачці	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	Белупо, ліки та косметика, д.д. (вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Індастріал Фармасьютіка Кантабріа, С.А. (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування)	Хорватія/ Іспанія	UA/17808/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. 30 днів після першого відкриття флакона.
628	ГЕНЕРОЛОН	Minoxidil	розчин нашкірний, 5 %; по 60 мл у флаконі, по 1 флакону в комплекті з мірним насосом та розпилюючою насадкою в картонній пачці	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	Белупо, ліки та косметика, д.д. (вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Індастріал Фармасьютіка Кантабріа, С.А. (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування)	Хорватія/ Іспанія	UA/17808/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. 30 днів після першого відкриття флакона.

629	ГЕНЕРОЛОН	Minoxidil	розчин нашкірний, 5 %; по 60 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті з мірним насосом та розпилюючою насадкою в картонній пачці	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	Белупо, ліки та косметика, д.д. (вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Індастріал Фармасьютіка Кантабріа, С.А. (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування)	Хорватія/ Іспанія	UA/17808/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. 30 днів після першого відкриття флакону.
630	ГЕНТАКСАН®	Comb drug	порошок для нашкірного застосування, по 2 г, 5 г та 8 г у флаконі-крапельниці, по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону, по 1 флакону-крапельниці без вкладання у вторинну упаковку	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "ФарКоС" (виробництво дозованої форми, первинне та вторинне пакування)/ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС" (повний цикл виробництва ЛЗ, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/17134/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

631	ГЕНТАСЕПТ	Comb drug	порошок для зовнішнього застосування по 2 г або по 5 г у скляному флаконі-крапельниці; по 1 скляному флакону-крапельниці в пачці з картону; по 2 г у скляному флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 2 г або по 5 г у пластиковому флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/1279/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

632	ГЕПА-МЕРЦ	Ornithine*	гранулят, 3 г/5 г; по 5 г у пакеті; по 30 або 50 або 100 пакетів у картонній коробці	Мерц Фармасьютікалс ГмбХ	Німеччина	Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КГаА (випробування контролю якості та випуск серії) / БАВ Інститут фюр Гігієне унд Квалітетсзіхерунг ГмбХ (випробування контролю якості)/Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ (продукція in bulk; первинне та вторинне пакування, контроль якості) / ГБА Фарма ГмбХ (випробування контролю якості)/ХВІ фарма сервісес ГмбХ (випробування контролю якості) / Евонік Оперейшнс ГмбХ – Лабор Продакт Лайн Аналітікс (випробування контролю якості) / Евонік Оперейшнс ГмбХ/Престіж Промоушн Веркауфсфоердерунг & Вербесервіс ГмбХ (вторинне	Німеччина / Німеччина/Німеччина / Німеччина/Німеччина /Німеччина /Німеччина/Німеччина/Латвія / Німеччина	UA/0039/02/01	Зберігати препарат при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

633	ГЕПАБЕНЕ	Comb drug	капсули тверді по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль якості)	Німеччина	UA/2381/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
634	ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ	Heparin	гель, 600 МО/г; по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/2577/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
635	ГЕПАРИНОВА МАЗЬ	Heparin, combinations	мазь; по 25 г або по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/6719/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
636	ГЕПАТОФІТ	Comb drug	збір по 50 г або 100 г у пакеті, вкладеному в пачку; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	UA/3550/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.
637	ГЕПАТРОМБІН	Heparin	гель, 30 000 МО/100 г; по 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці	"Хемофарм" АД	Республіка Сербія	"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/"Хемофарм" АД (контроль серії, дозвіл на випуск серії)	Республіка Сербія/Республіка Сербія	UA/3054/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

638	ГЕПАТРОМБІН	Heparin	гель, 50 000 МО/100 г по 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці	"Хемофарм" АД	Республіка Сербія	"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/"Хемофарм" АД (контроль серії, дозвіл на випуск серії)	Республіка Сербія/Республіка Сербія	UA/3054/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
639	ГЕПАТРОМБІН	Heparin	крем, 30 000 МО/100 г по 40 г у тубі ; по 1 тубі в картонній упаковці	"Хемофарм" АД	Республіка Сербія	"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/"Хемофарм" АД (контроль серії, дозвіл на випуск серії)	Республіка Сербія/Республіка Сербія	UA/3054/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

640	ГЕПАТРОМБІН	Heparin	крем, 50 000 МО/100 г по 40 г у тубі ; по 1 тубі в картонній упаковці	"Хемофарм" АД	Республіка Сербія	"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/"Хемофарм" АД (контроль серії, дозвіл на випуск серії)	Республіка Сербія/Республіка Сербія	UA/3054/02/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
641	ГЕПТОР-ФАРМЕКС	Ornithine*	гранулят 3 г/5 г, 5 г в пакеті, по 30 пакетів в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, випуск серії)	Україна/Україна	UA/17685/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

642	ГЕРБІОН® ПЛЮЩ	Hederae helicis folium	льодяники по 35 мг по 8 льодяників у блістері, по 1 або по 2, або по 3, або по 4 блістери у картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю) / КРКА, д.д., Ново место (контроль та випуск серії) / КРКА, д.д., Ново место (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/Кемійські інститут, Центр за валідаційске технологіє ін аналітіко (ЦВТА) (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/Лабена д.о.о. (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/Кеміла б д.о.о. (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю))/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здрав'є, околє ін	Словенія/ Словенія/ Словенія/ Словенія/ Словенія	UA/12176/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
643	ГЕРПЕВІР®	Aciclovir	мазь 2,5 %, по 5 г або по 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/2466/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
644	ГЕРПЕМІЛ ДУО	Aciclovir, combinations	крем, по 2 г крему у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Мепро Фармасьютикалс Прівat Лімітед	Індія	UA/20916/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не охолоджувати і не заморожувати.

645	ГЕРПЕСТІЛ	Penciclovir	крем, 10 мг/г, по 5 г у тубі № 1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/16189/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
646	ГІДРАСЕК	Racecadotril	гранули для оральної суспензії по 10 мг; по 16 саше в картонній коробці	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	Софартекс	Франція	UA/13273/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
647	ГІДРАСЕК	Racecadotril	гранули для оральної суспензії по 30 мг; по 16 саше в картонній коробці	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	Софартекс	Франція	UA/13273/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
648	ГІДРАСЕК	Racecadotril	капсули тверді по 100 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	Софартекс	Франція	UA/13273/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
649	ГІНЕКОФІТ	Comb drug	настойка складна по 100 мл у банці скляній; по 1 банці в пачці; по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці в пачці; по 100 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону в пачці	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "Ейм"	Україна	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "Ейм"	Україна	UA/4322/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.
650	ГІНЕКОХЕЕЛЬ	Comb drug	краплі оральні, по 30 мл у скляному флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/7867/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
651	ГІНКГОБА®	Ginkgo folium	капсули по 120 мг по 10 капсул у блістері; по 2 або 6 блістерів у пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/15691/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

652	ГІНКГОБА®	Ginkgo folium	капсули по 40 мг, по 10 капсул у блістері; по 2 або 6 блістерів у пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/15691/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
653	ГІНКГОБА®	Ginkgo folium	капсули по 80 мг; по 10 капсул у блістері; по 2 або 6 блістерів у пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/15691/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
654	ГІПНОС®	Doxylamine	краплі оральні, розчин, 15 мг/0,6 мл, по 5 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/17957/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після розкриття флакону – 6 місяців.
655	ГІПНОС®	Doxylamine	краплі оральні, розчин, 15 мг/0,6 мл; по 5 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/17957/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після розкриття флакону – 6 місяців.
656	ГІПНОС®	Doxylamine	таблетки, вкриті оболонкою, по 15 мг; по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/17957/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
657	ГІРЧАКА ПТАШИНОГО ТРАВА	Polygonum aviculare**	трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільт-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2155/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.
658	ГІРЧАКА ПТАШИНОГО ТРАВА	Polygonum aviculare**	трава по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8888/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготований настій зберігати у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.

659	ГІСТАФЕН	Sequifenadine	таблетки по 50 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці картонній	АТ "Олайнфарм"	Латвія	АТ "Олайнфарм"	Латвія	UA/3567/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
660	ГЛАНДУМ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл; по 30 мл у флаконі зі спрей насосом та насадкою поворотною; по 1 флакону у пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17869/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
661	ГЛЕНЦЕТ	Levocetirizine	таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3, або по 10 блістерів в картонній упаковці	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	UA/11243/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

662	ГЛІЦЕРИН	Glycerol	рідина 85 %, по 25 г або по 40 г, або по 50 г, або по 100 г у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками; по 25 г або по 40 г, або по 50 г, або по 100 г у флаконі скляному, укупореному пробкою та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 40 г або по 50 г у флаконах скляних, укупорених пробками-крапельницями та кришками; по 40 г або по 50 г у флаконі скляному, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 г або по 40 г, або по 50 г у флаконах полімерних, укупорених кришками з контролем першого розкриття; по 25 г або по 40 г, або по 50 г у флаконі полімерному, укупореному кришкою з контролем першого розкриття; по 1 флакону в пачці з	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7463/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

663	ГЛІЦЕРИН	Glycerol	розчин для зовнішнього застосування 85 %, по 25 г у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/ випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8363/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

664	ГЛІЦЕРИН	Glycerol	розчин для зовнішнього застосування 85 %, по 25 г у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/ випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8363/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
665	ГЛІЦЕРИН	Glycerol	розчин нашкірний 85 % по 25 г у флаконах; по 25 г у флаконі; по 1 флакону в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/7946/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
666	ГЛІЦЕРИН	Glycerol	супозиторії по 0,88 г; по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/17198/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
667	ГЛІЦЕРИН	Glycerol	супозиторії по 2,63 г; по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/17198/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

668	ГЛІЦЕРИНОВІ МІКРОКЛІЗМИ ГЛІЦИК ДЛЯ МАЛЮКІВ	Glycerol	розчин ректальний, 1,8 г/2,5 мл; по 2,5 мл в аплікаторі в плівці; по 4 аплікатори в плівці в картонній коробці	КУПФЕР БІОТЕХ, УАБ	Литовська Республіка	Е.І. ЗАРБІС енд Ко., ЛП	Греція	UA/18738/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
669	ГЛІЦЕРИНОВІ МІКРОКЛІЗМИ ДЛЯ ДІТЕЙ ПЕЙДОЛАКС	Glycerol	розчин ректальний, 3,28 мл/4 мл; по 4 мл в аплікаторі; по 4 аплікатори в коробці з картону	Касен Рекордаті, С.Л.	Іспанія	Касен Рекордаті, С.Л.	Іспанія	UA/10351/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
670	ГЛІЦЕРИНОВІ МІКРОКЛІЗМИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ АДЮЛАКС	Glycerol	розчин ректальний, 6,14 мл/7,5 мл; по 7,5 мл в аплікаторі; по 4 аплікатори у коробці з картону	Касен Рекордаті, С.Л.	Іспанія	Касен Рекордаті, С.Л.	Іспанія	UA/10469/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
671	ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ	Glycerol	супозиторії по 0,88 г по 5 супозиторіїв у стрипі; по 1 або 2 стрипи у пачці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/14366/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
672	ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ	Glycerol	супозиторії по 2,63 г; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 1 або по 2 стрипи в пачці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/14366/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
673	ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ "ФАРМІНА"	Glycerol	супозиторії по 0,75 г; по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Фарміна Лтд	Польща	Фарміна Лтд	Польща	UA/11954/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

674	ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ "ФАРМІНА"	Glycerol	супозиторії по 1,5 г; по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістера в картонній коробці	Фарміна Лтд	Польща	Фарміна Лтд	Польща	UA/11954/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
675	ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ ГЛІЦИК ДЛЯ МАЛЮКІВ	Glycerol	супозиторії ректальні по 0,6 г по 5 супозиторіїв у стрипі, по 1 стрипу у картонній коробці	КУПФЕР БІОТЕХ, УАБ	Литовська Республіка	Е.І. ЗАРБІС енд Ко., ЛП	Греція	UA/18738/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
676	ГЛІЦЕРОЛ ЄВРО	Glycerol	супозиторії по 686 мг; по 6 супозиторіїв у термозапаяному стрипі з білої непрозорої ПВХ плівки; по 1 або 2 стрипи в картонній коробці	Євро Лайфкер Лтд	Велика Британія	Лабораторіус Басі - Індустріа Фармасьютіка, С.А.	Португалія	UA/12050/01/03	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

677	ГЛІЦЕРОЛ ЄВРО	Glycerol	супозиторії ректальні по 1000 мг; по 6 супозиторіїв у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній упаковці	Євро Лайфкер Лтд	Велика Британія	Лабораторіус Басі - Індустріа Фармасьютіка, С.А. (відповідальний за: виробництво нерозфасованого продукту; первинне пакування; вторинне пакування; контроль/випробування; випуск серії)/Ламп Сан Просперо СПА (відповідальний за: виробництво нерозфасованого продукту; первинне пакування; вторинне пакування; контроль/випробування серії)	Португалія/Італія	UA/12050/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

678	ГЛІЦЕРОЛ ЄВРО	Glycerol	супозиторії ректальні по по 2000 мг; по 6 супозиторіїв у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній упаковці	Євро Лайфкер Лтд	Велика Британія	Лабораторіус Басі - Індустріа Фармасьютіка, С.А. (відповідальний за: виробництво нерозфасованого продукту; первинне пакування; вторинне пакування; контроль/випробування; випуск серії)/Ламп Сан Просперо СПА (відповідальний за: виробництво нерозфасованого продукту; первинне пакування; вторинне пакування; контроль/випробування серії)	Португалія/Італія	UA/12050/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
679	ГЛІЦИН	Glycine	таблетки сублінгвальні по 100 мг, по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону; по 50 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/16293/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

680	ГЛІЦИН	Glycine	таблетки сублінгвальні по 100 мг, по 50 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	ПП "ГЛЕДЕКС"	Україна	ТОВ "Арпімед"	Республіка Вірменія	UA/14604/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
681	ГЛІЦИН-ДАРНИЦЯ	Glycine	таблетки сублінгвальні по 100 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 або 6 контурних чарункових упаковок в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/18282/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
682	ГЛІЦИН-ЗДОРОВ`Я	Glycine	таблетки сублінгвальні по 100 мг, по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у коробці з картону; по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/15153/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
683	ГЛІЦИСЕД®	Glycine	таблетки по 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/0585/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
684	ГЛОД-ВІШФА	Crataegus glycosides	настойка, по 50 мл або по 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконах полімерних	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16720/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
685	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка для перорального застосування по 25 мл або по 100 мл у флаконах	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/7464/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

686	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка для перорального застосування по 50 мл або по 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконах полімерних	ПП "Кілафф"	Україна	ПП "Кілафф"	Україна	UA/8311/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Під час зберігання можливе випадання осаду.
687	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 100 мл у скляних флаконах	ТОВ "Панацея"	Україна	ТОВ "Панацея"	Україна	UA/17322/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці.
688	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 100 мл у флаконах	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОДІЯ"	Україна	Дочірнє підприємство "Межиріцький вітамінний завод" Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром"	Україна	UA/16252/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
689	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 100 мл у флаконах	Дочірнє підприємство "Межиріцький вітамінний завод" Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром"	Україна	Дочірнє підприємство "Межиріцький вітамінний завод" Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром"	Україна	UA/17034/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
690	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 100 мл у флаконах скляних, по 100 мл у флаконах полімерних	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	UA/17226/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

691	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 25 мл або 100 мл у флаконах скляних; по 1 флакону в пачці; по 25 мл або 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у банках; по 100 мл у флаконах полімерних; по 100 мл у флаконах полімерних; по 1 флакону в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8383/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
692	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 25 мл або по 100 мл у флаконах скляних або полімерних	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8144/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
693	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 25 мл або по 100 мл у флаконах скляних або полімерних	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8144/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
694	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 25 мл або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/10638/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Під час зберігання можливе випадання осаду.
695	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 25 мл у флаконах-крапельницях або у флаконах; по 40 мл, або по 100 мл у флаконах; по 25 мл, або по 40 мл, або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	UA/6880/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

696	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 25 мл у флаконах-крапельницях; по 25 мл у флаконах-крапельницях; по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону; по 100 мл у флаконах; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8243/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
697	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка по 50 мл або по 100 мл у флаконах; по 100 мл у банках	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/7237/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

698	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка, по 25 мл або 80 мл, або 100 мл у флаконах; по 25 мл або 80 мл, або 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 25 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 25 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці; по 25 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками; по 25 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками; по 50 мл у флаконі скляному, укупореному пробкою та кришкою; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками-крапельницями та	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2121/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. При зберігання допускається випадання осаду.

699	ГЛОДУ НАСТОЙКА	Crataegus glycosides	настойка; по 25 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконах скляних, по 100 мл у флаконах полімерних; по 25 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8513/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
700	ГЛОДУ ПЛОДИ	Crataegus glycosides	плоди по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 4 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2121/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.
701	ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА	Glutamic acid*	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 250 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці; по 10 таблеток у блістерах	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/6723/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

702	ГЛУТАРГІН	Arginine glutamate	таблетки по 0,25 г; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/4022/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
703	ГЛУТАРГІН	Arginine glutamate	таблетки по 0,75 г по 10 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/4022/02/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

704	ГЛУТАРГІН АЛКОКЛІН	Arginine glutamate	порошок для орального розчину, 1 г/3 г; по 3 г порошку у пакеті; по 2, 5 або 10 пакетів у картонній коробці; по 3 г порошку у пакеті; по 5 пакетів спарених у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/4022/04/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
705	ГЛУТАРГІН АЛКОКЛІН	Arginine glutamate	таблетки по 1 г; для виробника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я», Україна: по 1 таблетці у блістері, по 2 блістери у картонній коробці; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці; для виробника Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП», Україна: по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/4022/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
706	ГЛЮКОЗА	Glucose	таблетки по 1 г; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картону	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/4518/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

707	ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ	Glucose	порошок дозований, 75 г/пакет, по 75,75 г порошку в пакеті, по 1 пакету в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/0758/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
708	ГОДАСАЛ®	Acetylsalicylic acid	таблетки по 100 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 5, або 10 блістерів у картонній коробці	Др. Пфлегер Арцнаймітель ГмбХ	Німеччина	Др. Пфлегер Арцнаймітель ГмбХ	Німеччина	UA/7763/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
709	ГОФЕН 200	Ibuprofen	капсули м’які по 200 мг по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру у картонному конверті; по 5 або по 6 картонних конвертів у картонній упаковці	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	UA/13624/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
710	ГОФЕН 400	Ibuprofen	капсули м’які по 400 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру у картонному конверті; по 5 або по 6 картонних конвертів у картонній упаковці	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	UA/13624/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
711	ГРАНЗОФЕН	Dequalinium	таблетки вагінальні по 10 мг, по 6 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/21008/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
712	ГРАНЗОФЕН®	Dequalinium	таблетки вагінальні по 10 мг, по 6 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/21008/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

713	ГРИП-ГРАН	Comb drug	гранули по 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 10 г гранул у флаконі з кришкою, по 1 флакону в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/8300/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25оС.
714	ГРИП-ГРАН ДИТЯЧИЙ	Comb drug	гранули, по 10 г у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/3810/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
715	ГРИП-ХЕЕЛЬ	Comb drug	таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому; по 1 контейнеру в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/4268/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці

716	ГРИПАУТ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки по 4 таблетки у стрипі або блістері; по 1 стрипу або блістеру у картонній коробці № 4 (4х1); по 4 таблетки у стрипі або блістері; по 1 стрипу або блістеру у картонній коробці, по 50 картонних коробок у картонній коробці № 200 (4х1х50); по 10 таблеток у стрипі або блістері; по 1 стрипу або блістеру у картонній коробці № 10 (10х1); по 10 таблеток у стрипі або блістері; по 1 стрипу або блістеру у картонній коробці, по 10 картонних коробок у картонній коробці № 100 (10х1х10)	Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед	Індія	ФДС Лімітед	Індія	UA/9253/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
717	ГРИПАУТ ГАРЯЧИЙ НАПІЙ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 6 г у пакетику; по 10 пакетиків у картонній коробці	Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед	Індія	ФДС Лімітед/Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія/Індія	UA/15361/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
718	ГРИПГО ХОТМІКС®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	гранули для орального розчину зі смаком лимона по 5 г у саше, по 5 або по 10, або по 20, або по 50 саше у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/16502/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

719	ГРИПГО ХОТМІКС®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	гранули для орального розчину зі смаком полуниці по 5 г у саше, по 5 або по 10, або по 20, або по 50 саше у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/16501/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
720	ГРИПГО ХОТМІКС®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	гранули для орального розчину зі смаком чорної смородини по 5 г у саше, по 5 або по 10, або по 20 саше у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/17055/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
721	ГРИПГО ХОТМІКС®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	гранули для орального розчину зі смаком чорної смородини по 5 г у саше, по 5 або по 10, або по 20 саше у картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/17055/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

722	ГРИПГО®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки по 4 таблетки у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці; по 4 таблетки у блістері, по 50 блістерів у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці, по 10 картонних упаковок у картонній коробці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/7630/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

723	ГРИПГО®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки по 4 таблетки у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці; по 4 таблетки у блістері, по 50 блістерів у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці, по 10 картонних упаковок у картонній коробці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/7630/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
724	ГРИПЕКС АКТИВ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 4 або 10, або 12 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці; по 10 або 12 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	Юнілаб, ЛП	США	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/11428/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
725	ГРИПЕКС АКТИВ МАКС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 4 або 10, або 12 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці; по 10 або 12 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	Юнілаб, ЛП	США	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/11429/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

726	ГРИПЕКС ХОТАКТИВ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 4 г в саше; по 5, або по 7, або по 8 або по 10 саше в картонній пачці	Юнілаб, ЛП	США	ТОВ ЮС Фармація (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)	Польща	UA/5737/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
727	ГРИПЕКС ХОТАКТИВ МАКС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 5 г порошку у саше; по 5 саше або по 8 саше у картонній пачці	Юнілаб, ЛП	США	ТОВ ЮС Фармація (виробник, відповідальний за виробництво за повним циклом)	Польща	UA/6285/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
728	ГРИПОМЕД®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	капсули, по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/6632/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
729	ГРИПОМЕД®	Paracetamol	розчин оральний 3 %, по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці у комплекті з дозувальною піпеткою у пачці з картону; по 100 мл у банці скляній; по 1 банці у комплекті з дозувальною піпеткою у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17686/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Термін придатності після першого розкриття — 3 місяці.

730	ГРИПОМЕД®	Paracetamol	розчин оральний 3 %, по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці у комплекті з дозувальною піпеткою у пачці з картону; по 100 мл у банці скляній; по 1 банці у комплекті з дозувальною піпеткою у пачці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМІС ЛТД»	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17686/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Термін придатності після першого розкриття — 3 місяці.
731	ГРИПОМЕД® ХОТ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з лимонним смаком по 5 г у саше; по 5 або 10 саше у пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/16532/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
732	ГРИПОМЕД® ХОТ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з малиновим смаком по 5 г у саше; по 5 або 10 саше у пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/16531/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
733	ГРИПОЦИТРОН-БРОНХО	Butamirate	краплі оральні, розчин 5 мг/мл, по 20 мл у флаконі; закупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/13593/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

734	ГРИПОЦИТРОН-БРОНХО	Butamirate	сироп, 1,5 мг/мл, по 100 мл або 200 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложкою у коробці з картону; по 5 мл або 15 мл у саше; по 20 саше у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/13783/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
735	ГРИПОЦИТРОН-БРОНХО	Butamirate	сироп, 1,5 мг/мл, по 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону разом з дозуючим пристроєм у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров’я народу" (фасування із форми "in bulk" виробництва Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/13794/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

736	ГРИПОЦИТРОН БАЛЬЗАМ	Cough suppressants and expectorants	емульсія нашкірна, 3 г/10 г у 100 г, по 40 г у тубі алюмінієвій або ламінатній; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/16045/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
737	ГРИПОЦИТРОН КІДС ЛИМОН	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 4 г порошку в пакеті; по 5 або 10 пакетів у коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/11498/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці
738	ГРИПОЦИТРОН КІДС ОРАНЖ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 4 г порошку в пакеті; по 5 або 10 пакетів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/11499/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
739	ГРИПОЦИТРОН ЛОР	Comb drug	спрей для ротової порожнини, по 30 мл у балоні, забезпеченим клапаном-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 балону в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/11005/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
740	ГРИПОЦИТРОН РИНІС	Comb drug	краплі назальні, розчин по 15 мл у флаконі з кришкою-крапельницею зі скляною піпеткою; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/11186/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

741	ГРИПОЦИТРОН ФІТО	Chlorophyllipt *	таблетки по 12,5 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/13193/01/01	При температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
742	ГРИПОЦИТРОН ФІТО	Chlorophyllipt *	таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/13193/01/02	При температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

743	ГРИПОЦИТРОН ФОРТЕ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 4,0 г порошку в пакеті; по 10 пакетів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/1470/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
744	ГРИПОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 4,0 г порошку у пакеті; по 5 або по 10 пакетів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/10174/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
745	ГРИПОЦИТРОН ХОТ ОРАНЖ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 4 г у пакеті; по 10 пакетів у картонній коробці; по 4 г у пакеті; по 5 спарених пакетів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/1470/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
746	ГРИППОСТАД® РИНО 0,05 % НАЗАЛЬНІ КРАПЛІ	Xylometazoline	краплі назальні, розчин 0,05 %; по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	СТАДА Арцнаймітель АГ	Німеччина	СТАДА Арцнаймітель АГ (виробництво за повним циклом)/"ХЕМОФАРМ" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Республіка Сербія	UA/3090/02/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

747	ГРИППОСТАД® РИНО 0,1 % НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,1 %; по 10 мл у флаконі з автоматичним пульверизатором та назальним наконечником; по 1 флакону в картонній коробці	СТАДА Арцнаймітель АГ	Німеччина	СТАДА Арцнаймітель АГ (виробництво за повним циклом)/"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)/СТАДА ХЕМОФАРМ СРЛ (контроль серій)	Німеччина/Республіка Сербія/Румунія	UA/3090/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття флакона: 6 місяців.
748	ГРИППОСТАД® РИНО 0,1 % НАЗАЛЬНІ КРАПЛІ	Xylometazoline	краплі назальні, розчин 0,1 %; по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	СТАДА Арцнаймітель АГ	Німеччина	СТАДА Арцнаймітель АГ (виробництво за повним циклом)/"ХЕМОФАРМ" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)	Німеччина/Республіка Сербія	UA/3090/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

749	ГРИПФЛЮ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки для виробника Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія: по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу у конверті; по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу у конверті; по 50 конвертів у картонній коробці; для виробника Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія: по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу у конверті; по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу у конверті; по 50 конвертів у картонній коробці; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у коробці	Ананта Медікеар Лтд.	Велика Британія	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд.	Індія/Індія	UA/6965/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.
750	ГРИЦИКІВ ТРАВА	Capsella bursa-pastoris**	трава по 40 г або по 50 г або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2122/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
751	ГРОВІРАЛ 500	Inosine pranobex	таблетки по 500 мг; по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕДСТАВНИЦТВО БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/20943/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

752	ГРУДНИЙ ЗБІР № 1	Comb drug	збір, по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2193/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не застосувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
753	ГРУДНИЙ ЗБІР № 2	Comb drug	збір по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2123/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
754	ГРУДНІ КРАПЛІ ВІД КАШЛЮ	Comb drug	рідина по 25 мл у флаконах	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/0625/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
755	ГУНА-БОВЕЛ	Comb drug	краплі оральні, по 30 мл у флакони-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці	Гуна С.п.а.	Італія	Гуна С.п.а.	Італія	UA/12657/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
756	ГУНА-МАТРІКС	Comb drug	краплі оральні; по 30 мл у флакони-крапельниці; по 1 флакону в картонній коробці	Гуна С.п.а.	Італія	Гуна С.п.а.	Італія	UA/12711/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
757	ГУНА-ПРОГЕСТЕРОН	Mono	краплі оральні, по 30 мл у флакони-крапельниці; по 1 флакону в картонній коробці	Гуна С.п.а.	Італія	Гуна С.п.а	Італія	UA/13485/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
758	ГУНА-ФЕМ	Comb drug	краплі оральні, по 30 мл у флакони-крапельниці; по 1 флакону в картонній коробці	Гуна С.п.а.	Італія	Гуна С.п.а	Італія	UA/13566/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Після відкриття флакона – 3 місяці.
759	ГУНА-ФЛУ	Comb drug	гранули по 1 г гранул у тубі; по 6 туб у картонній коробці	Гуна С.п.а.	Італія	Гуна С.п.а	Італія	UA/12639/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

760	ГУНА - БЕТА - ЕСТРАДІОЛ	Mono	краплі оральні по 30 мл у флаконах-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці	Гуна С.п.а.	Італія	Гуна С.п.а.	Італія	UA/13199/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
761	ГУТТАЛАКС® ПІКОСУЛЬФАТ	Sodium picosulfate	краплі, 7,5 мг/мл по 15 мл або 30 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Істітуто де Анжелі С.р.л.	Італія	UA/0832/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Використати протягом 12 місяців після першого відкриття флакона.
762	ДАЙВОБЕТ	Calcipotriol, combinations	мазь по 15 г або 30 г мазі у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	ЛЕО Фарма А/С	Данія	ЛЕО Лабораторіс Лімітед	Ірландія	UA/7276/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкривання – 1 рік.
763	ДАЙМІСИЛ	Nimesulide	гель, 10 мг/г; по 70 г у тубі; по 1 тубі в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕДСТАВНИЦТВО БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/21303/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
764	ДАЛМАКСІН	Tiazotic acid	мазь, 20 мг/г; по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/4182/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
765	ДАЛМАКСІН	Tiazotic acid	мазь, 20 мг/г; по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Мобіль Медікал"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/4182/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
766	ДАРСІЛ®	Silymarin	таблетки, вкриті оболонкою, по 22,5 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3, 5, або 10 контурних чарункових упаковок в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/2473/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

767	ДАРФЕН®	Ibuprofen	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг, по 7 таблеток у блістері, по 1 або по 2 блістери в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/19989/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
768	ДАРФЕН®	Ibuprofen	таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг, по 7 таблеток у блістері, по 1 або по 2 блістери в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/19989/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
769	ДАРФЕН® ГЕЛЬ	Comb drug	гель, по 15 г або по 50 г, або по 100 г у тубі, по 1 тубі в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/18641/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

770	ДАРФЕН® КІДС	Ibuprofen	суспензія оральна, 100 мг/5 мл; по 100 мл у флаконі або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті зі шприцом-дозатором в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Делфарм Бладел Б.В. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового продукту)/Едефарм, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії готового продукту)/Фармалідер, С.А. (контроль якості (за винятком мікробіологічного контролю), випуск серії готового продукту)/Біолаб, С.Л. (мікробіологічний контроль (субпідрядник компанії Farmalider, S.A.))	Нідерланди/Іспанія/ Іспанія/ Іспанія	UA/18549/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття флакона — 6 місяців.

771	ДАРФЕН® КІДС ФОРТЕ	Ibuprofen	суспензія оральна, 200 мг/5 мл по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті зі шприцом-дозатором в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Делфарм Бладел Б.В. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового продукту)/Едефарм, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії готового продукту)/Фармалідер С.А. (контроль якості (за винятком мікробіологічного контролю), випуск серії готового продукту)/Біолаб, С.Л. (мікробіологічний контроль (субпідрядник компанії Farmalider, S.A.))	Нідерланди/Іспанія/ Іспанія/ Іспанія	UA/18550/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття флакона – 6 місяців.
772	ДАРФЕН® ЛОНГ	Ibuprofen, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг/500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А.	Греція	UA/18537/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

773	ДАРФЕН® УЛЬТРАКАП 200	Ibuprofen	капсули м'які по 200 мг, по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Філ Інтер Фарма Ко., ЛТД.	В'єтнам	UA/20095/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
774	ДАРФЕН® УЛЬТРАКАП 400	Ibuprofen	капсули м'які по 400 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Філ Інтер Фарма Ко., ЛТД. (виробництво готової продукції, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серій; контроль якості)	В'єтнам	UA/20095/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
775	ДВАЦЕ 100	Acetylcysteine	гранули для орального розчину по 100 мг/0,5 г у саше, по 20 саше в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/19247/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
776	ДВАЦЕ 200	Acetylcysteine	гранули для орального розчину по 200 мг/1 г у саше, по 20 саше в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/19247/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
777	ДВАЦЕ 200	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 200 мг, по 20 таблеток у тубі; по 1 тубі в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Е Фарма Тренто С.п.А.	Італія	UA/18138/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, у щільно закритій тубі, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
778	ДВАЦЕ 200 ГАРЯЧИЙ НАПІЙ	Acetylcysteine	гранули для орального розчину по 200 мг/1 г у саше по 20 саше в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/19261/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
779	ДВАЦЕ ЛОНГ	Acetylcysteine	гранули для орального розчину по 600 мг/3 г у саше, по 10 саше в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/19310/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

780	ДВАЦЕ ЛОНГ	Acetylcysteine	таблетки шипучі, по 600 мг; по 10 таблеток у тубі; по 1 тубі в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Е Фарма Тренто С.п.А.	Італія	UA/18139/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, у щільно закритій тубі, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
781	ДВАЦЕ ЛОНГ ГАРЯЧИЙ НАПІЙ	Acetylcysteine	гранули для орального розчину по 600 мг/3 г у саше; по 6 саше в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/19262/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
782	ДЕ-НОЛ®	Bismuth subcitrate	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 120 мг, по 8 таблеток у блістері; по 7 або 14 блістерів у картонній коробці	ЧЕПЛАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ	Німеччина	Астеллас Фарма Юроп Б.В.	Нідерланди	UA/4355/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
783	ДЕАКУРА®	Biotin	таблетки, по 5 мг, по 50 або по 100 таблеток у флаконі, по 1 флакону у картонній пачці	ТОВ "МІБЕ УКРАЇНА"	Україна	мібе ГмбХ Арцнаймиттель	Німеччина	UA/11339/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після відкриття флакона – 9 місяців.
784	ДЕЗАЛЕРГАН	Desloratadine	розчин оральний, 0,5 мг/мл; по 120 мл у флаконі, по 1 флакону з мірним стаканчиком в картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Республіка Болгарія	ВЕТПРОМ АД, виробнича дільниця Віфарма	Болгарія	UA/20152/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

785	ДЕЗЛОРАТАДИН	Desloratadine	сироп, 0,5 мг/мл; по 50 мл у флаконі; по 1 флакону разом з дозуючим шприцом-піпеткою в коробці з картону; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з дозуючим шприцом-піпеткою в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/10913/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
786	ДЕЗЛОРАТАДИН	Desloratadine	таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2, або по 3, або по 10 блістерів в пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/13810/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

787	ДЕЗЛОРАТАДИН	Desloratadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"(всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/10913/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
788	ДЕКАЗОЛЬ	Decamethoxine	аерозоль 52 мг/60 г, по 60 г у балоні аерозольному алюмінієвому з клапаном безперервної дії у комплекті з насадкою та запобіжним ковпачком; по 1 балону в пачці з картону	АТ "СТОМА"	Україна	АТ "СТОМА"	Україна	UA/1260/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.
789	ДЕКАЛОР	Decamethoxine	таблетки по 0,2 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/20520/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
790	ДЕКАМЕВІТ®	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/4850/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

791	ДЕКАСАН®	Decamethoxine	розчин 0,2 мг/мл, по 50 мл або по 100 мл, або по 200 мл або по 400 мл в пляшках скляних; по 50 мл або по 100 мл, або по 250 мл, або по 500 мл, або по 1000 мл, або по 2000 мл, або по 3000 мл, або по 5000 мл в контейнерах полімерних; по 2 мл або по 5 мл в контейнері однодозовому, по 4, або по 8, або по 10, або по 12 контейнерів в пачці з картону	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	UA/5364/01/01	Зберігати у недоступному для дітей і захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° С. Не заморожувати.
792	ДЕКАСАН®	Decamethoxine	розчин, 0,2 мг/мл по 100 мл, або 200 мл, або 400 мл у пляшках скляних; по 100 мл, 250 мл, 1000 мл у контейнерах полімерних; по 2 мл у контейнері однодозовому, по 10 або 12 контейнерів у пачці з картону	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	UA/5364/01/01	Зберігати у недоступному для дітей і захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° С. Не заморожувати.

793	ДЕКАТИЛЕН™	Comb drug	таблетки для розсмоктування по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3, або 4 блістери у картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Ацино Фарма АГ (виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка)/Унтерзухунгсінститут Хеппелер ГмбХ (додаткова лабораторія, що приймає участь в контролі якості)/ННАС Лабор Д-р Хойслер ГмбХ (додаткова лабораторія, що приймає участь в контролі якості)/Балканфарма-Разград АТ (виробництво за повним циклом)	Швейцарія/ Німеччина/ Німеччина/Болгарія	UA/6633/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
794	ДЕКВАДОЛ	Comb drug	таблетки для розсмоктування з кокосовим смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці з картону; по 12 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці з картону	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/16839/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

795	ДЕКВАДОЛ	Comb drug	таблетки для розсмоктування з лимонним смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці з картону; по 12 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці з картону	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/16837/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
796	ДЕКВАДОЛ	Comb drug	таблетки для розсмоктування з м'ятним смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці з картону; по 12 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці з картону	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/14989/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
797	ДЕКВАДОЛ	Comb drug	таблетки для розсмоктування з малиновим смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці з картону; по 12 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці з картону	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/16838/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

798	ДЕКРІСТОЛ® 1000 МО	Colecalciferol	таблетки по 1000 МО, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці; по 25 таблеток у блістері; по 2, або по 4, або по 8 блістерів у пачці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІБЕ УКРАЇНА"	Україна	мібе ГмбХ Арцнаймітель (Виробництво, пакування, контроль серії та випуск серії)/Фіделіо Хелскеа Лімбург ГмбХ (первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Німеччина	UA/20129/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 Зберігати блістер у пачці для захисту від дії світла. Зберігати у недоступному для дітей місці.
799	ДЕКРІСТОЛ® 1000 МО	Colecalciferol	таблетки по 1000 МО, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці; по 25 таблеток у блістері; по 2, або по 4, або по 8 блістерів у пачці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІБЕ УКРАЇНА"	Україна	мібе ГмбХ Арцнаймітель (Виробництво, пакування, контроль серії та випуск серії)/Фіделіо Хелскеа Лімбург ГмбХ (первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Німеччина	UA/20129/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 Зберігати блістер у пачці для захисту від дії світла. Зберігати у недоступному для дітей місці.
800	ДЕКРІСТОЛ® 500 МО	Colecalciferol	таблетки по 500 МО; по 10 таблеток у блістері, по 5 або по 10 блістерів у пачці	ТОВ "МІБЕ УКРАЇНА"	Україна	мібе ГмбХ Арцнаймітель	Німеччина	UA/18957/01/01	Зберігати при температурі не вище 25°. Зберігати блістер у пачці для захисту від дії світла. Зберігати у недоступному для дітей місці.
801	ДЕКРІСТОЛ® 500 МО	Colecalciferol	таблетки по 500 МО; по 10 таблеток у блістері, по 5 або по 10 блістерів у пачці	ТОВ "МІБЕ УКРАЇНА"	Україна	мібе ГмбХ Арцнаймітель	Німеччина	UA/18957/01/01	Зберігати при температурі не вище 25°. Зберігати блістер у пачці для захисту від дії світла. Зберігати у недоступному для дітей місці.
802	ДЕКСТЕМП	Dexibuprofen	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18367/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

803	ДЕКСТЕМП	Dexibuprofen	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18367/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
804	ДЕЛАКС	Sodium picosulfate, combinations	капсули, по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру у пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕДСТАВНИЦТВО БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/20637/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
805	ДЕЛУФЕН®	Comb drug	спрей назальний; по 20 мл або по 30 мл у пластиковому флаконі з пластиковим розпилювачем; по 1 флакону в картонній упаковці	ТОВ "ПЕРРІГО УКРАЇНА"	Україна	Ріхард Біттнер АГ	Австрія	UA/8539/01/01	Зберігати у щільно закритому флаконі, в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Препарат придатний для застосування протягом 2 місяців з моменту першого відкриття флакона.
806	ДЕНЕБОЛ ГЕЛЬ	Comb drug	гель по 30 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Мепро Фармасьютикалс Пріват Лімітед	Індія	UA/9197/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці. Не заморожувати!
807	ДЕНТА КРАПЛІ	Comb drug	розчин зубний по 10 мл у флаконах; по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону; по 20 мл у флаконах-крапельницях; по 20 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8722/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

808	ДЕНТАГЕЛЬ®	Comb drug	гель для ясен по 20 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/6966/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

809	ДЕНТАГЕЛЬ®	Comb drug	гель для ясен; по 20 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/6966/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
810	ДЕНТІНОКС-ГЕЛЬ Н	Comb drug	гель для ясен по 10 г гелю у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарати Ленк та Шуппан	Німеччина	Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарати Ленк та Шуппан	Німеччина	UA/8625/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії світла. Після першого відкриття туби препарат придатний до застосування протягом 1 року.
811	ДЕПАНТОЛ®	Comb drug	супозиторії вагінальні по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ДП "СТАДА-УКРАЇНА"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"/ТОВ "ФЗ "СТАДА"	Україна/ Україна	UA/12910/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
812	ДЕПРИВІТ	Hypericine*	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 60 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/6967/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

813	ДЕРЕВІЮ ТРАВА	Achillea millefolium**	трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/5671/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
814	ДЕРЕВІЮ ТРАВА	Achillea millefolium**	трава по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2357/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.
815	ДЕРИВА ВОДНИЙ ГЕЛЬ	Adapalene	гель, 1 мг/г по 15 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	UA/9164/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
816	ДЕРИВА С МС	Adapalene, combinations	гель по 15 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	UA/14954/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
817	ДЕРМАЗИН	Silver sulfadiazine	крем 1 % по 50 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ (виробництво за повним циклом; вторинна упаковка)	Німеччина	UA/8997/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
818	ДЕРМАЗОЛ	Ketoconazole	супозиторії вагінальні по 400 мг; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 1 або по 2 стрипи у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/16144/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
819	ДЕРМАЗОЛ	Ketoconazole	супозиторії вагінальні по 400 мг; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 1 або по 2 стрипи у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/16144/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

820	ДЕРМАЗОЛ®	Ketoconazole	крем, 20 мг/г по 15 г або 30 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)	Індія/ Україна	UA/6725/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
821	ДЕРМАЗОЛ®	Ketoconazole	крем, 20 мг/г по 15 г або 30 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)	Індія/ Україна	UA/6725/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

822	ДЕРМАЗОЛ®	Ketoconazole	шампунь, 20 мг/мл; по 8 мл у саше; по 20 саше в картонній упаковці; по 50 мл або 100 мл у флаконі, кришечка якого обтягнута плівковою оболонкою; по 1 флакону в картонній упаковці (для виробника КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія); по 50 мл або 100 мл у флаконі, кришечка якого обтягнута плівковою оболонкою; по 1 флакону в картонній упаковці (для виробника ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна)	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)	Індія/ Україна	UA/6725/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

823	ДЕРМАЗОЛ®	Ketoconazole	шампунь, 20 мг/мл; по 8 мл у саше; по 20 саше в картонній упаковці; по 50 мл або 100 мл у флаконі, кришечка якого обтягнута плівковою оболонкою; по 1 флакону в картонній упаковці (для виробника КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія); по 50 мл або 100 мл у флаконі, кришечка якого обтягнута плівковою оболонкою; по 1 флакону в картонній упаковці (для виробника ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна)	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)	Індія/ Україна	UA/6725/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
824	ДЕРМАЗОЛ® ПЛЮС	Comb drug	шампунь по 50 мл або 100 мл у флаконі; кришечка якого обтягнута плівковою оболонкою; по 1 флакону в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/7632/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

825	ДЕРМАСАН	Comb drug	рідина нашкірна, по 50 мл у флаконах; по 50 мл або 100 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ТОВ "Фарма Черкас" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/0443/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

826	ДЕРМАСАН	Comb drug	рідина нашкірна, по 50 мл у флаконах; по 50 мл або 100 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ТОВ "Фарма Черкас" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/0443/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
827	ДЕТОКСИФІТ	Comb drug	збір, по 100 г у пакеті, вкладеному в пачку; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	UA/3564/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.
828	ДЕФЕНОРМ	Ispaghula (psylla seeds)	капсули тверді по 500 мг; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/5505/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

829	ДЕФТОЦИЛ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл, по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону або по 30 мл та по 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картонуу	ТзОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20649/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
830	ДЕФТОЦИЛ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону або по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	ТзОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20649/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

831	ДЕФТОЦИЛ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	ТзОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20649/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
832	ДЕФТОЦИЛ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	ТзОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20649/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

833	ДЖЕНТІАНА СТОМАК ГЛОБУЛІ ВЕЛАТІ	Comb drug	гранули гомеопатичні, по 20 г у флаконі; по 1 флакону в коробці з картону	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/15542/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
834	ДЖЕСІКА®	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3, або 9 блістерів у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"	Україна	UA/12092/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
835	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	Bendazol*	таблетки по 20 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/4780/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
836	ДИКЛАК® ЛІПОГЕЛЬ	Diclofenac	гель 1 % по 50 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ	Німеччина	UA/0981/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
837	ДИКЛАК® ЛОНГ	Diclofenac	гель, 2,32 % (23,2 мг/г) 50 г або 100 г гелю у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сандоз Україна"	Україна	Керн Фарма, С.Л. (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль/випробування серії)/Лек Фармацевтична компанія д.д. (дозвіл на випуск серії)	Іспанія/ Словенія	UA/21097/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не охолоджувати та не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.
838	ДИКЛАК® МАКС	Diclofenac	гель 5 %; по 50 г, 100 г або 150 г в тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ	Німеччина	UA/8908/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

839	ДИКЛОСАН	Comb drug	гель по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5712/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
840	ДИКЛОФЕН-ГЕЛЬ	Comb drug	гель по 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/1384/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
841	ДИКЛОФЕНАК	Diclofenac	гель 5 %, по 40 г, 50 г, 100 г у тубі алюмінієвій в пачці, по 40 г, 50 г, 100 г у тубі ламінатній в пачці, по 40 г, 50 г, 100 г у тубах ламінатних	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7167/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
842	ДИКЛОФЕНАК	Diclofenac	гель 5 %; по 40 г, 50 г, 100 г у тубі алюмінієвій в пачці; по 40 г, 50 г, 100 г у тубі ламінатній в пачці; по 40 г, 50 г, 100 г у тубах ламінатних; по 150 г, 180 г, 200 г у тубах ламінатних в пачці; по 150 г, 180 г, 200 г у тубах ламінатних	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7167/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

843	ДИКЛОФЕНАК	Diclofenac	гель 50 мг/г по 40 г гелю у тубі алюмінієвій № 1; у пачці з картону; по 100 г у тубі ламінатній № 1; у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/0708/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
844	ДИКЛОФЕНАК	Diclofenac	гель 50 мг/г по 40 г гелю у тубі алюмінієвій № 1; у пачці з картону; по 100 г у тубі ламінатній № 1; у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/0708/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
845	ДИКЛОФЕНАК	Diclofenac	гель 50 мг/г; по 35 г або по 40 г у тубах; по 35 г, 40 г або 100 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/19686/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
846	ДИКЛОФЕНАК	Diclofenac	гель, 10 мг/г, по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/0708/02/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
847	ДИКЛОФЕНАК-ВІОЛА	Diclofenac	гель 1 %; по 40 г у тубах; по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону; по 40 г або по 100 г у тубах ламінатних; по 40 г або по 100 г у тубі ламінатній; по 1 тубі в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7167/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.

848	ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я	Diclofenac	гель 1 % по 30 г або по 50 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/1539/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
849	ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРА	Diclofenac	гель, 50 мг/г по 50 г або по 100 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна	UA/1539/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
850	ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Diclofenac	гель, 30 мг/г, по 50 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; виробнича дільниця - всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна	UA/1539/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

851	ДИКЛОФЕНАК-ТЕВА ФОРТЕ 2 %	Diclofenac	гель 2 %; по 30 г або 50 г, або 100 г гелю у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (виробництво за повним циклом)/Трансфарм Логістік ГмбХ (вторинна упаковка)	Німеччина / Німеччина	UA/19275/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. Зберігати у недоступному для дітей місці.
852	ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ	Diclofenac	гель 50 мг/г по 50 г гелю або 100 г гелю у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/20542/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
853	ДИМЕКСИД	Dimethyl sulfoxide	рідина для зовнішнього застосування по 40 мл, по 50 мл або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 40 мл, по 50 мл або по 100 мл у флаконах	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/9117/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 15 °С до 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
854	ДИМЕКСИД	Dimethyl sulfoxide	рідина для зовнішнього застосування по 40 мл, по 50 мл або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 40 мл, по 50 мл або по 100 мл у флаконах	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/9117/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
855	ДИМЕКСИД-ЛУБНИФАРМ	Dimethyl sulfoxide	гель 50 %, по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/19735/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
856	ДИМЕКСИД® АРТЕРІУМ	Dimethyl sulfoxide	розчин нашкірний по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/4522/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

857	ДИМЕСТИЛ®	Dimetindene	гель, 1 мг/г, по 30 г або 50 г у тубі алюмінієвій, по 1 тубі в пачці картонній	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ "Гріндекс"	Латвія	UA/20286/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття: 3 місяці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
858	ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	Dimethyl sulfoxide	гель, 250 мг/г; по 15 г або по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії)	Україна	UA/19829/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
859	ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	Dimethyl sulfoxide	гель, 500 мг/г; по 15 г або по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії)	Україна	UA/19829/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

860	ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	Dimethyl sulfoxide	рідина для зовнішнього застосування, по 50 мл або 100 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками полімерними або ковпачками алюмінієвими з ущільнюючою прокладкою; по 50 мл або 100 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками та кришками полімерними	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	UA/19566/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
861	ДИМЕТИНДЕН	Dimetindene	гель 0,1 % по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/20816/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці
862	ДИМЕТИНДЕН-ЗДОРОВ'Я	Dimetindene	краплі оральні, розчин, 1 мг/мл, по 20 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/16699/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
863	ДИМЕТИНДЕН-ЗДОРОВ`Я	Dimetindene	таблетки, вкриті оболонкою, по 1 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/16699/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

864	ДИП РИЛІФ	Comb drug	гель по 15 г або по 50 г, або по 100 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці	Ментолатум Компані Лімітед	Велика Британія	Ментолатум Компані Лімітед	Велика Британія	UA/0377/01/01	Зберігати при температурі не вище 25° С у недоступному для дітей місці.
865	ДИП ХІТ	Comb drug	крем по 15 г або по 67 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Ментолатум Компані Лімітед	Велика Британія	Ментолатум Компані Лімітед	Велика Британія	UA/1453/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
866	ДИФЛАЗОН®	Fluconazole	капсули по 150 мг; по 1, 2 або 4 капсули у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	UA/2527/01/03	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
867	ДИФЛЮЗОЛ®	Fluconazole	капсули по 150 мг, по 1 капсулі у блістері, 1 або 2 блістери в пачці, або по 2 капсули у блістері, 1 блістер в пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/5156/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
868	ДІАГНОСТИН-ЗДОРОВ'Я	Macrogol, combinations	порошок для орального розчину; по 55,318 г порошку у пакеті; по 6 пакетів у коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/15448/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Готовий розчин придатний для використання впродовж 3 годин, якщо він зберігається при температурі не вище 25 °С або впродовж 48 годин, якщо він зберігається при температурі 2 °С–8 °С (в холодильнику). Зберігати в недоступному для дітей місці.
869	ДІАЗОЛІН-ДАРНИЦЯ	Mebhydrolin	таблетки по 100 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/0278/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
870	ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА	Mebhydrolin	драже по 100 мг; по 10 драже у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ТОВ "ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/20097/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

871	ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА	Mebhydrolin	драже по 50 мг; по 10 драже у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ТОВ "ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/20097/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
872	ДІАЗОЛІН ДЛЯ ДІТЕЙ	Mebhydrolin	гранули для оральної суспензії, 0,6 г/100 мл, по 9 г у флаконі; по 1 флакону зі стаканчиком для прийому ліків у пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/7633/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності суспензії — 7 діб.
873	ДІАЗОЛІН®	Mebhydrolin	драже по 0,05 г, по 10 драже у блістерах; по 10 драже у блістері; по 2 блістери у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/0270/02/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
874	ДІАЗОЛІН®	Mebhydrolin	драже по 0,1 г, по 10 драже у блістерах; по 10 драже у блістері; по 2 блістери у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/0270/02/02	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
875	ДІАЗОЛІН®	Mebhydrolin	таблетки по 0,05 г по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/0270/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

876	ДІАЗОЛІН®	Mebhydrolin	таблетки по 0,1 г по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/0270/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
877	ДІАРЕМІКС	Loperamide, combinations	капсули; по 10 капсул у блістері, 3 блістери у картонній коробці; по 8 капсул у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Мепро Фармасьютикалс Пріват Лімітед	Індія	UA/8224/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці.
878	ДІАФЛУ	Fluconazole	капсули по 150 мг по 1 капсулі у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону	М. Біотек Лтд	Велика Британія	СТРАЙДС ФАРМА САЙЕНС ЛІМІТЕД	Індія	UA/12183/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
879	ДІКЛОСЕЙФ®	Diclofenac	емульсійний гель для зовнішнього застосування 1,16 %, по 30 г, по 50 г або по 100 г у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/16445/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
880	ДІКЛОСЕЙФ® ФОРТЕ	Diclofenac	емульсійний гель для зовнішнього застосування 2,32 % по 30 г, по 50 г або по 100 г у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/16445/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
881	ДІОСМЕКТИТ	Diosmectite	порошок для оральної суспензії по 3 г, по 3,76 г порошку у саше-пакеті, по 10 або 30 саше-пакетів у пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"	Україна	UA/19967/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

882	ДІОСМЕКТИТ-ЗДОРОВ'Я	Diosmectite	порошок для оральної суспензії, 3 г/3,76 г, по 3,76 г порошку у саше; по 10 саше у коробці з картону; по 3,76 г порошку у саше; по 30 саше у коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/17181/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
883	ДІОСМІН-ГЕСПЕРИДИН-ДАРНИЦЯ	Diosmin, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/21263/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці
884	ДІОФЛАН®	Diosmin, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 або 6 блістерів у пачці з картону	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/10773/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
885	ДОКСИЛАМІН-КРЕВЕЛЬ	Doxylamine	краплі оральні, розчин, 25 мг/мл по 20 мл або 50 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці	Кревель Мойзельбах ГмбХ	Німеччина	Кревель Мойзельбах ГмбХ	Німеччина	UA/16406/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття флакона – 6 місяців.
886	ДОКТОР МОМ®	Comb drug	мазь, по 20 г у баночці; по 1 баночці в картонній коробці	ТОВ "Джонсон і Джонсон Україна"	Україна	"Юнік Фармасьютикал Лабораторіз" (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.")	Індія	UA/7868/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці. Після застосування слід щільно закривати баночку кришкою.

887	ДОКУЗАЛІЯ	Docusate sodium	капсули м'які по 100 мг; по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/21314/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
888	ДОКУЛАК® ІС	Docusate sodium	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 100 мг, по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/17963/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
889	ДОКУЛАК® ІС	Docusate sodium	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 50 мг, по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/17963/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
890	ДОЛАРЕН®	Diclofenac, combinations	гель по 20 г або по 50 г у тубі; по 1 тубі у картонній упаковці	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	UA/18576/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Після першого розкриття туби – 6 місяців.
891	ДОЛАРЕН®	Diclofenac, combinations	гель; по 20 г або по 50 г у тубі; по 1 тубі у картонній упаковці	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	UA/18576/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Після першого розкриття туби – 6 місяців.

892	ДОЛГІТ® ГЕЛЬ	Ibuprofen	гель, 50 мг/г по 20 г або по 50 г, або по 100 г, або по 150 г в тубі, по 1 тубі в картонній коробці	Долоргіт ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	Долоргіт ГмбХ і Ко. КГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії)/Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування; первинне та вторинне пакування, контроль серії)/ГБА Фарма ГмбХ (контроль серії (фізичний/хімічний))/БАВ ІНСТИТУТ гігієни та забезпечення якості ГмбХ (контроль серії (мікробіологічні випробування))/МікроБіологі Кремер ГмбХ (контроль серії (мікробіологічні	Німеччина / Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/4117/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
893	ДОЛГІТ® ГІРСЬКА СОСНА	Comb drug	розчин нашкірний по 100 мл або 250 мл, або 500 мл, або 1000 мл у поліетиленовій пляшці; по 1 пляшці у картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	UA/10820/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці

894	ДОЛГІТ® КРЕМ	Ibuprofen	крем, 50 мг/г по 20 г або 50 г, або 100 г або по 150 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Долоргіт ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	Долоргіт ГмбХ і Ко. КГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії)/Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль серії)/ГБА Фарма ГмбХ (контроль серії (фізичний/хімічний))/БАВ ІНСТИТУТ гігієни та забезпечення якості ГмбХ (контроль серії (мікробіологічні випробування))/МікроБіологі Кремер ГмбХ (контроль серії (мікробіологічні випробування))	Німеччина / Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/4117/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття – 12 місяців.

895	ДОЛОБЕНЕ	Comb drug	гель; по 20 г або 50 г, або 100 г гелю в тубі; по 1 тубі в коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинна та вторинна упаковка, контроль серії; дозвіл на випуск серії)	Німеччина	UA/5565/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
896	ДОЛОКСЕН СТРОНГ	Diclofenac	гель 50 мг/г, по 40 г гелю у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у пачці з картону; по 100 г гелю у тубі ламінатній; по 1 тубі у пачці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Конарк Інтелмед"	Україна	ПРАТ «ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/18755/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
897	ДОЛОКСЕН ФАСТ	Methylii salicylas*	мазь, 61,1 мг/г по 20 г або по 50 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці	Євро Лайфкер Лтд	Велика Британія	Лабораторіус Басі - Індустріа Фармасьютіка, С.А.	Португалія	UA/15394/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в захищеному від світла та вологи місці в щільно закритій тубі. Зберігати в недоступному для дітей місці.
898	ДОМІДОН®	Domperidone	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/2467/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
899	ДОМІДОН®	Domperidone	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/2467/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

900	ДОМІЛІУМ ОДТ	Domperidone	таблетки, що диспергуються у ротовій порожнині, по 10 мг; по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці	Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед	Індія	Атена Драг Делівері Солюшнз ПВТ. ЛТД.	Індія	UA/20253/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
901	ДОМІЛІУМ ОДТ	Domperidone	таблетки, що диспергуються у ротовій порожнині, по 10 мг; по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці	Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед	Індія	Атена Драг Делівері Солюшнз ПВТ. ЛТД.	Індія	UA/20253/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
902	ДОМПЕРИДОН-СТОМА	Domperidone	таблетки по 10 мг, 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці з картону	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/1990/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
903	ДОМРИД®	Domperidone	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/8976/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
904	ДОМРИД®	Domperidone	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/8976/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
905	ДОМРИД®	Domperidone	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери в картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "КУСУМ"	Україна/ Україна	UA/8976/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

906	ДОНОРМІЛ	Doxylamine	таблетки шипучі по 15 мг, по 10 таблеток у тубі; по 1 або 2 туби в картонній коробці	УПСА САС	Франція	УПСА САС	Франція	UA/7213/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
907	ДОНОРМІЛ	Doxylamine	таблетки, вкриті оболонкою, по 15 мг, по 10 або по 30 таблеток у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	УПСА САС	Франція	УПСА САС	Франція	UA/7213/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
908	ДОПРОКІН	Domperidone	таблетки по 10 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 або по 3 блістери у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/17940/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
909	ДОПРОКІН	Domperidone	таблетки по 10 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 або по 3 блістери у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/17940/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
910	ДОРИТРИЦИН®	Comb drug	таблетки для розсмоктування, по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери у картонній коробці	Меділе Фарма ГмбХ та Ко. КГ	Німеччина	Меділе Арцнаймітель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ (виробництво за повним циклом)	Німеччина	UA/12066/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.
911	ДОРИТРИЦИН®	Comb drug	таблетки для розсмоктування, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	Меділе Фарма ГмбХ та Ко. КГ	Німеччина	Меділе Арцнаймітель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ (виробництво за повним циклом)	Німеччина	UA/12066/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

912	ДРАМІНА®	Dimenhydrinate*	таблетки по 50 мг по 5 або по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	Ядран-Галенський Лабораторій д.д. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Університет Рієки-Кафедра біотехнологій (контроль якості готового продукту -фізичні та хімічні методи контролю)	Хорватія/ Хорватія	UA/8430/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
913	ДРОПЛЕКС	Comb drug	краплі вушні, розчин по 15 мл у полімерних флаконах-крапельницях; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	К.О. "Ромфарм Компані С.Р.Л."	Румунія	UA/12428/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат можна використовувати протягом 4 тижнів.
914	ДРОПЛЕКС	Comb drug	краплі вушні, розчин, по 15 мл у полімерних флаконах-крапельницях; 1 флакон-крапельниця у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/17706/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат можна використовувати протягом 28 днів.
915	ДРОТАВЕРИН	Drotaverine	таблетки по 0,04 г; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/2014/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

916	ДРОТАВЕРИН	Drotaverine	таблетки по 40 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в коробці з картону; по 10 таблеток у блістерах	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"(всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна/ Україна	UA/10344/01/01	При температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
917	ДРОТАВЕРИН	Drotaverine	таблетки по 40 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2, або 3 блістери у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/6289/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
918	ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	Drotaverine	таблетки, 40 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 2 або по 3 контурні чарункові упаковки у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/7468/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

919	ДРОТАВЕРИН ФОРТЕ	Drotaverine	таблетки, по 80 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в коробці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці з картону; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в коробці з картону. Маркування українською мовою (для виробників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС»); по 10 таблеток у блістері ; по 1 блістеру в коробці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці з картону. Маркування українською мовою (для виробника Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП»)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна/ Україна	UA/10344/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
920	ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД	Drotaverine	таблетки по 40 мг; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2 або 3 блістери у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/0834/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

921	ДУБА КОРА	Quercus**	кора по 100 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8866/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці!
922	ДУБА КОРА	Quercus**	кора по 50 г або 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2194/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлену водну витяжку – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.
923	ДУБА КОРА	Quercus**	кора по 50 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8278/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб. Зберігати в недоступному для дітей місці.
924	ДУОВІТ®	Multivitamins and trace elements	таблетки, вкриті оболонкою, комбі-упаковка: 5 таблеток червоного кольору + 5 таблеток блакитного кольору у блістері; по 4 або 6, або 8 блістерів у картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (контроль та випуск серій) / КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне пакування, вторинне пакування, контроль серії) / КРКА, д.д., Ново место (контроль серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здрав’є, околє ін храно) (контроль серії)	Словенія/ Словенія	UA/4077/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії світла та вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.

925	ДУОФІЛМ	Comb drug	розчин нашкірний по 15 мл у флаконі, по 1 флакону із пластиковою кришкою та приєднаним до неї пензликом в картонній коробці	ГлаксоСмітКляйн Консьюмер Хелскер (ЮК) Трейдінг Лімітед	Велика Британія	Стіфел Лабораторіз (Ірландія) Лтд.	Ірландія	UA/6634/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
926	ДУФАЛАК®	Lactulose	сироп, 667 мг/1 мл по 200 мл, або по 300 мл, або по 500 мл, або по 1000 мл у флаконі з поліетилену; по 15 мл у саше; по 10, або по 20, або по 50 саше у картонній коробці	Абботт Хелскеа Продактс Б.В.	Нідерланди	Абботт Біолоджікалз Б.В.	Нідерланди	UA/3255/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці!
927	ДУФАЛАК® ФРУТ	Lactulose	розчин оральний, 667 мг/мл по 200 мл або по 500 мл у пляшці з мірним стаканчиком	Абботт Хелскеа Продактс Б.В.	Нідерланди	Абботт Біолоджікалз Б.В.	Нідерланди	UA/15943/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
928	ЕБЕРСЕПТ	Ketoconazole	шампунь 2 %; по 25 мл або 60 мл, або 120 мл у пластиковому флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	БРОС ЛТД	Греція	БРОС ЛТД	Греція	UA/8776/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

929	ЕВКАБАЛ® БАЛЬЗАМ	Cough suppressants and expectorants	емульсія, 3 г/10 г в 100 г, по 25 мл, або по 40 мл, або по 100 мл в тубі, по 1 тубі в картонній коробці	Еспарма ГмбХ	Німеччина	Ліхтенхельдт ГмбХ Фармацевтична фабрика (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості)/Еспарма ГмбХ, Німеччина (випуск серії)	Німеччина / Німеччина	UA/5753/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
930	ЕВКАБАЛ® КРАПЛІ	Xylometazoline	краплі, 1 мг/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці	Еспарма ГмбХ	Німеччина	Фарма Вернігероде ГмбХ	Німеччина	UA/13241/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат придатний до застосування протягом 6 місяців.
931	ЕВКАБАЛ® КРАПЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ	Xylometazoline	краплі, 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці	Еспарма ГмбХ	Німеччина	Фарма Вернігероде ГмбХ	Німеччина	UA/13241/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат придатний для застосування протягом 6 місяців.
932	ЕВКАБАЛ® СИРОП	Comb drug	сироп, 3 г/15 г в 100 г, по 100 мл у флаконі із скла; по 1 флакону в картонній коробці	Еспарма ГмбХ	Німеччина	Фарма Вернігероде ГмбХ	Німеччина	UA/5754/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Після відкриття флакона препарат придатний до застосування протягом 12 тижнів.
933	ЕВКАБАЛ® СПРЕЙ	Xylometazoline	розчин назальний, 1 мг/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону з дозатором в картонній упаковці	Еспарма ГмбХ	Німеччина	Фарма Вернігероде ГмбХ	Німеччина	UA/13241/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат придатний до застосування протягом 6 місяців.

934	ЕВКАЗОЛІН® АКВА	Xylometazoline	спрей назальний, 1 мг/г по 10 г у флаконі скляному з насосом-дозатором з розпилювачем назального призначення; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/3664/02/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
935	ЕВКАЛІПТ	Eucalyptus vitaminalis**	настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування; по 25 мл у флаконах-крапельницях; по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці; по 100 мл у флаконах	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/7019/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
936	ЕВКАЛІПТА ЛИСТЯ	Eucalyptus vitaminalis**	листя, по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2124/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
937	ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА	Eucalyptus vitaminalis**	настойка по 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8517/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 С у недоступному для дітей місці.

938	ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА	Eucalyptus vitaminalis**	настойка по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 25 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці; по 25 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками; по 25 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою, по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками; по 50 мл у флаконі полімерному,	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6526/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається випадання осаду.
939	ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА	Eucalyptus vitaminalis**	настойка; по 25 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8724/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

940	ЕВКАЛІПТА ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЯ	Eucalyptus vitaminalis**	листя по 50 г або по 75 г у пачці з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8540/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.
941	ЕВКАЛІПТА ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЯ	Eucalyptus vitaminalis**	листя по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці; по 2,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/5756/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
942	ЕВКАЛІПТОВИЙ БАЛЬЗАМ ВІД ЗАСТУДИ Др.ТАЙСС	Comb drug	мазь, по 20 г або 50 г у банці; по 1 банці в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (дозвіл на випуск серії, виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування; виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)	Німеччина	UA/2332/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

943	ЕВКАСПРЕЙ	Xylometazoline	спрей назальний 1,0 мг/мл, по 10 мл у контейнері з пробкою-розпилювачем і кришкою з контролем першого відкриття, по 1 контейнеру у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/17018/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
944	ЕВКАСПРЕЙ	Xylometazoline	спрей назальний 1,0 мг/мл, по 10 мл у контейнері з пробкою-розпилювачем і кришкою з контролем першого відкриття, по 1 контейнеру у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/17018/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
945	ЕВКАСПРЕЙ ТУРБО	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 1,0 мг/мл; по 10 мл у поліетиленовому контейнері з насосом з розпилювачем у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/18958/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
946	ЕВКАСПРЕЙ ТУРБО	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 1,0 мг/мл; по 10 мл у поліетиленовому контейнері з насосом з розпилювачем у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/18958/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

947	ЕВКАСПРЕЙ ТУРБО	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 1,0 мг/мл; по 8 мл або 10 мл, або 12 мл у поліетиленовому контейнері з насосом з розпилювачем у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/18958/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
948	ЕВКАСПРЕЙ ТУРБО	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 1,0 мг/мл; по 8 мл або 10 мл, або 12 мл у поліетиленовому контейнері з насосом з розпилювачем у пачці з картону	СПЕРКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД	Кіпр	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/18958/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
949	ЕВКАФІЛІПТ®	Eucalyptus vitaminalis**	настойка по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 100 мл у банці; по 1 банці у пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/15852/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С . При зберіганні допускається випадання осаду. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
950	ЕВКАФІЛІПТ®	Eucalyptus vitaminalis**	спрей; по 20 мл у флаконі скляному зі спрей-насосом та насадкою поворотною; по 1 флакону в пачці з картону; по 50 мл у флаконі скляному зі спрей-насосом та насадкою горловою; по 1 флакону в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17182/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С .

951	ЕВКАФІЛІПТ® КСИЛО	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 0,1 %; по 10 мл у флаконах скляних з розпилювачем назальним; по 1 флакону в пачці з картону; по 10 мл у флаконах полімерних з розпилювачем назальним; по 1 флакону в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17019/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
952	ЕВКОЛЕК	Chlorophyllipt*	супозиторії по 0,05 г, по 5 супозиторіїв у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці	ТОВ "Мобіль Медікал"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/3682/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
953	ЕДЕЛОР ПЛЮЩ	Hederae helicis folium	сироп, по 90 мл у флаконі або банці; по 1 флакону або банці з дозуючою скляночкою в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕДСТАВНИЦТВО БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/7526/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття упаковки препарат придатний протягом 6 місяців.
954	ЕДЕМ®	Desloratadine	таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг, по 10 або по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/8360/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
955	ЕДЕМ® РІНО	Comb drug	спрей назальний, розчин по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/14054/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
956	ЕДЕРМІК	Dimetindene	гель 0,1 %, по 30 г у тубі, по 1 тубі в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/17481/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

957	ЕДЕРМІК	Dimetindene	краплі оральні, розчин по 1 мг/мл по 20 мл або 25 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16984/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
958	ЕКЗИФІН	Terbinafine	гель 1 % по 15 г або по 30 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд	Індія	Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед	Індія	UA/4720/03/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
959	ЕКЗО-ТІФІН	Naftifine	крем, 10 мг/г по 15 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/18288/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат стабільний 4 тижні при температурі 25 °С після першого відкриття.
960	ЕКЗО-ТІФІН	Naftifine	розчин нашкірний, 10 мг/мл; по 8 мл або по 20 мл у флаконі; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/18288/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона розчин зберігати 6 місяців при температурі не вище 25 °С.
961	ЕКЗО-ТІФІН	Naftifine	спрей нашкірний, розчин, 10 мг/мл; по 8 мл або по 15 мл у флаконі; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/18288/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
962	ЕКЗОЛІК	Naftifine	розчин нашкірний 1 %; по 10 мл або по 20 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/16629/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після відкриття флакона розчин зберігати 6 місяців при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

963	ЕКЗОЛІК®	Naftifine	крем 1 % по 15 г у тубі № 1 у пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/16629/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого розкриття — 4 тижні.
964	ЕКСТРАКТ ШАВЛІЇ З ВІТАМІНОМ С ДР. ТАЙСС	Comb drug	таблетки для смоктання; по 12 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	UA/4952/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
965	ЕКСТРАЛОР	Comb drug	розчин для ротової порожнини, по 120 мл або по 200 мл у флаконі скляному в пачці з мірним стаканчиком, по 120 мл або по 200 мл у флаконі полімерному в пачці з мірним стаканчиком	Товариство з обмеженою відповідальністю " Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/19769/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
966	ЕКСТРАЛОР	Comb drug	спрей для ротової порожнини по 50 мл у флаконі скляному, по 1 флакону разом з пульверизатором у пачці	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/19769/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

967	ЕКСТРАТЕРМ®	Comb drug	таблетки; по 12 таблеток у блістерах; по 12 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/3602/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
968	ЕКСТРАТЕРМ®	Comb drug	таблетки; по 12 таблеток у блістерах; по 12 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/3602/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

969	ЕКТЕРИЦИД®	Mono	розчин для зовнішнього застосування по 50 мл або по 250 мл в пляшці скляній, по 1 пляшці в пачці	ТОВ "БІОЛІК ФАРМА"	Україна	ТОВ "БІОЛІК ФАРМА"	Україна	UA/5630/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
970	ЕЛЕВІТ® ПРОНАТАЛЬ	Multivitamins and other minerals, incl. combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 10 блістерів у картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Драженофарм Апотекер Пюшль ГмбХ	Німеччина	UA/9996/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
971	ЕЛЕГІУС	Desloratadine	сироп 0,5 мг/мл; по 60 мл або по 100 мл у флаконах з мірною ложкою, по 1 флакону у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/18399/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після розкриття флакона – 90 діб.
972	ЕЛЕГІУС	Desloratadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/18399/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

973	ЕЛЕКАСОЛ	Comb drug	збір по 60 г або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах в індивідуальному пакетику, по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/5757/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
974	ЕЛЕРТ	Ebastine	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 3 блістери в картонній коробці	МІКРО ЛАБС ЛІМІТЕД	Індія	МІКРО ЛАБС ЛІМІТЕД	Індія	UA/18577/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °. Зберігати у недоступному для дітей місці.
975	ЕЛЕУТЕРОКОК	Eleutherococcus senticosus**	екстракт рідкий для перорального застосування, спиртовий, по 30 мл або по 50 мл у флаконах; по 30 мл або по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ЄВРАЗІЯ"	Україна	ТОВ "ЄВРАЗІЯ"	Україна	UA/12454/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

976	ЕЛЕУТЕРОКОК	Eleutherococcus senticosus**	екстракт рідкий для перорального застосування, спиртовий; по 40 мл у флаконах скляних; по 50 мл у флаконах скляних або полімерних; по 50 мл у флаконі скляному або полімерному в пачці з картону; по 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконі скляному в пачці з картону; по 20 кг у бутлях скляних	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/4566/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

977	ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ	Eleutherococcus senticosus**	екстракт рідкий по 20 мл, по 25 мл, по 30 мл або по 50 мл у скляних флаконах; по 30 мл або по 50 мл у полімерних флаконах, по 30 мл або по 50 мл у скляному або полімерному флаконі, по 1 флакону в пачці; по 20 мл, по 25 мл, по 30 мл або по 50 мл у скляних флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 20 мл, по 25 мл, по 30 мл або по 50 мл у скляних флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 1 флакону в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/11560/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
978	ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ	Eleutherococcus senticosus**	екстракт оральний, по 50 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3544/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.

979	ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ	Eleutherococcus senticosus**	екстракт рідкий, по 50 мл у флаконі скляному закупореному пробкою або полімерному закупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону; по 50 мл у флаконах скляних закупорених пробками або полімерних закупорених пробками-крапельницями	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8725/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
980	ЕЛІЗІУМ	Desloratadine	розчин оральний 0,5 мг/мл; по 60 мл або 120 мл у контейнері із поліетилентерефталату, закритому кришкою з контролем першого відкриття з дозуючою ложкою та дозуючим шприцом у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/18400/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття контейнера використати протягом 6 місяців.

981	ЕЛІЗІУМ	Desloratadine	розчин оральний 0,5 мг/мл; по 60 мл або 120 мл у контейнері із поліетилентерефталату, закритому кришкою з контролем першого відкриття з дозуючою ложкою та дозуючим шприцом у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/18400/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття контейнера використати протягом 6 місяців.
982	ЕЛІЗІУМ	Desloratadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці з картону	СПЕРКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД	Кіпр	Актавіс Лтд.	Мальта	UA/18453/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
983	ЕНАТ 200	Tocopherol (vit E)	капсули м`які 200 МО; по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в картонній коробці	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	UA/9439/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
984	ЕНАТ 400	Tocopherol (vit E)	капсули м'які по 400 МО по 10 капсул у блістері; 3 блістери в картонній коробці	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	UA/9439/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
985	ЕНГІСТОЛ	Comb drug	таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому, по 1 контейнеру в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/2053/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

986	ЕНЕМА-СЕЛЛА ОДНОРАЗОВА КЛІЗМА	Comb drug	розчин ректальний, 16 г/6 г, по 120 мл у флаконі; по 1 флакону з канюлею з кришкою у картонній упаковці	ХІМІЧНО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "А. СЕЛЛА" С.Р.Л.	Італія	ХІМІЧНО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "А. СЕЛЛА" С.Р.Л.	Італія	UA/16016/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
987	ЕНЕРІОН®	Sulbutiamine	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці з картону	Лє Лабораторуар Серв'є	Франція	Лабораторії Серв'є Індастрі	Франція	UA/2097/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
988	ЕНЕРІОН®	Sulbutiamine	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці з картону	Лє Лабораторуар Серв'є	Франція	Лабораторії Серв'є Індастрі	Франція	UA/2097/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
989	ЕНЗИМТАЛ	Comb drug	драже; по 10 драже у стрипі; по 1 або 10 стрипів у картонній коробці	Дженом Біотек Пвт. Лтд.	Індія	Дженом Біотек Пвт. Лтд.	Індія	UA/10790/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
990	ЕНЗИСТАЛ П	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці	Торрент Фармасьютікалс Лтд	Індія	Торрент Фармасьютікалс Лтд	Індія	UA/13355/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
991	ЕНЗИСТАЛ®	Comb drug	таблетки, вкриті цукровою оболонкою, кишковорозчинні по 10 таблеток у блістері; по 2 або 8 блістерів у картонній упаковці	Торрент Фармасьютікалс Лтд.	Індія	Торрент Фармасьютікалс Лтд.	Індія	UA/2874/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

992	ЕНТЕРОЛ 250	Saccharomyces boulardii	капсули по 250 мг, по 10 або по 20, або по 30, або по 50 капсул у пляшці скляній; по 1 пляшці скляній у картонній коробці; по 5 капсул у блістері; по 2 або по 4, або по 6 блістерів у картонній коробці; по 6 капсул у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці	БІОКОДЕКС	Франція	БІОКОДЕКС	Франція	UA/6295/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
993	ЕНТЕРОЛ 250	Saccharomyces boulardii	порошок для орального застосування по 250 мг; по 10 пакетиків у картонній коробці	БІОКОДЕКС	Франція	БІОКОДЕКС	Франція	UA/6295/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
994	ЕНТЕРОЛАКС	Sodium picosulfate	таблетки по 7,5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці з картону	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/2052/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С.
995	ЕНТЕРОСГЕЛЬ ЕКСТРАКАПС	Mono	капсули по 0,32 г по 7 капсул у блістері; по 1, 2 або 4 блістери у коробці з картону	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ"	Україна	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ"	Україна	UA/4415/03/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.
996	ЕНТЕРОСМЕКТИТ	Diosmectite	порошок для оральної суспензії по 3 г; по 3,76 г порошку у саше; по 10 або 30 саше в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/18203/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
997	ЕНТОБАН	Comb drug	капсули, по 20 або 60 капсул у флаконі; по 1 флакону в коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/2117/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

998	ЕНТОБАН	Comb drug	сироп; по 90 мл, 120 мл або 150 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/10300/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
999	ЕНТРОП®	Mono	таблетки по 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці з картону	ТОВ "ОЛФА"	Україна	АТ "Олайнфарм"	Латвія	UA/5233/01/02	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1000	ЕНТРОП®	Mono	таблетки по 50 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці з картону	ТОВ "ОЛФА"	Україна	АТ "Олайнфарм"	Латвія	UA/5233/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1001	ЕНУРАН	Comb drug	гранули; по 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/3820/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
1002	ЕПАДОЛ НЕО	Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids	капсули м'які по 5 капсул у блістері, по 6 або 12 блістерів у пачці; по 10 капсул у блістері, по 3 або 6 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/12187/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1003	ЕРГОФЕРОН	Comb drug	таблетки по 20 таблеток у блістері; по 1, 2 або 5 блістерів у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/12931/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1004	ЕРГОЦЕТАЛ	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/17457/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1005	ЕРЕБРА®	Hippophae rhamnoides**	таблетки сублінгвальні по 0,02 г; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в пачці з картону; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону	ТОВ "ГЕОЛІК ФАРМ МАРКЕТИНГ ГРУП"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/12485/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1006	ЕРІДЕЗ-ДАРНИЦЯ	Desloratadine	таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 або по 2, або по 3 контурні чарункові упаковки в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/12919/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1007	ЕРІДЕЗ®	Desloratadine	сироп, 0,5 мг/мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/20425/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття флакона зберігати не більше 90 діб.

1008	ЕРІДЕЗ®	Desloratadine	таблетки, що диспергуються у ротовій порожнині, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ДЖЕНЕФАРМ С.А. (виробництво готового продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії))/Фармапас С.А. (виробництво готового продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії)	Греція/ Греція	UA/18434/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1009	ЕРМІТАЛЬ 10 000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули гастрорезистентні тверді; по 20, або по 50, або по 100 капсул у пляшці; по 1 пляшці у картонній коробці	Нордмарк Фарма ГмбХ	Німеччина	Нордмарк Фарма ГмбХ	Німеччина	UA/7948/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1010	ЕРМІТАЛЬ 25 000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули гастрорезистентні тверді; по 20, або по 50, або по 100 капсул у пляшці; по 1 пляшці у картонній коробці	Нордмарк Фарма ГмбХ	Німеччина	Нордмарк Фарма ГмбХ	Німеччина	UA/7948/01/02	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

1011	ЕРМІТАЛЬ 36 000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули гастрорезистентні тверді; по 20, або по 50, або по 100 капсул у пляшці; по 1 пляшці у картонній коробці	Нордмарк Фарма ГмбХ	Німеччина	Нордмарк Фарма ГмбХ	Німеччина	UA/7948/01/03	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1012	ЕРОЦЕПТИН-ФАРМЕКС	Benzalkonium	песарії по 18,9 мг по 5 песаріїв у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці картонній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/14003/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1013	ЕСКУВЕН®	Hippocastani semen	гель 1 % по 30 г або 50 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/5105/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1014	ЕСКУВІТ®	Comb drug	краплі, по 15 мл або по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у пачці; по 25 мл у флаконі-крапельниці, закритому кришкою з контролем першого розкриття; по 1 флакону-крапельниці у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/3298/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1015	ЕСКУВІТ®	Hippocastani semen	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 або 4 блістери у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат" /ПАТ "Галичфарм"	Україна/ Україна	UA/3298/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1016	ЕСКУЗАН® ЛОНГ	Hippocastani semen	капсули пролонгованої дії по 50 мг; по 10 капсул у блістері; по 3, або по 6, або по 9 блістерів у картонній коробці; по 30 капсул у блістері; по 1, або по 2, або по 3 блістери у картонній коробці	Еспарма ГмбХ	Німеччина	Теммлер Ірeланд Лімітед (виробництво in bulk, контроль серії)/Драгенофарм Апотекер Пюшль ГмбХ (первинне та вторинне пакування)/Свісс Кепс ГмбХ (первинне та вторинне пакування)/Еспарма ГмбХ (випуск серії)/еспарма Фарма Сервісез ГмбХ (вторинне пакування)	Ірландія/ Німеччина/ Німеччина/ Німеччина	UA/15249/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1017	ЕСКУЛЮС-ЗДОРОВ`Я	Comb drug	краплі оральні, розчин, по 20 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/16920/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1018	ЕСКУЛЮС КОМПОЗИТУМ	Comb drug	краплі оральні по 30 мл у флаконі-крапельниці, по 1 флакону-крапельниці у коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/5632/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

1019	ЕСЛОТИН	Desloratadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 1, 2 або 3 блістери в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/16357/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.
1020	ЕСПА-БАСТИН®	Ebastine	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині по 10 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в упаковці	Еспарма ГмбХ	Німеччина	Лабораторіос Медікаментос Інтернасьоналес, С. А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)	Іспанія	UA/17918/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1021	ЕСПА-БАСТИН®	Ebastine	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині по 20 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в упаковці	Еспарма ГмбХ	Німеччина	Лабораторіос Медікаментос Інтернасьоналес, С. А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)	Іспанія	UA/17918/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1022	ЕСПІКОЛ БЕБІ	Silicones	краплі оральні по 30 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці разом з мірною піпеткою в індивідуальній упаковці	Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед	Індія	Некст Вейв (Індія)	Індія	UA/12949/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1023	ЕСПІКОЛ БЕБІ	Silicones	краплі оральні по 30 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці разом з мірною піпеткою в індивідуальній упаковці	Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед	Індія	Некст Вейв (Індія)	Індія	UA/12949/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1024	ЕСПОЛ	Comb drug	мазь по 30 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8518/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1025	ЕСПОЛ	Comb drug	мазь по 30 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі з аплікатором в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/11695/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1026	ЕСПУМІЗАН® БЕБІ	Silicones	краплі оральні, емульсія, 100 мг/мл; по 30 мл або по 50 мл у флаконі з насадкою для дозування крапель, кришкою, що загвинчується, та мірним стаканчиком; по 1 флакону у картонній коробці	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ	Німеччина	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ	Німеччина	UA/10476/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Лікарський засіб зберігати у недоступному для дітей місці. Не охолоджувати та не заморожувати. Термін придатності після першого відкриття флакона – 6 місяців.

1027	ЕССЕНЦІАЛЄ® ФОРТЕ Н	Mono	капсули по 300 мг; № 30 (10х3): по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у картонній коробці; № 90 (10х9): по 10 капсул у блістері, по 9 блістерів у картонній коробці; № 100 (10х10): по 10 капсул у блістері, по 10 блістерів у картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Ей. Наттерманн енд Сайі. ГмбХ (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій)/Опелла Хелскеа Поланд Сп. з о.о. (первинне та вторинне пакування, випуск серій)	Німеччина /Польща	UA/8682/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Для захисту від дії світла та вологи зберігати в оригінальному пакуванні при температурі не вище 25 °С.
1028	ЕССЛІВЕР ФОРТЕ®	Comb drug	капсули по 10 капсул у блістері; по 3 або по 5 блістерів у картонній упаковці	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	UA/7474/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.
1029	ЕСФАТИЛ	Heparin, combinations	гель, по 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/2105/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1030	ЕФЕРАЛГАН	Paracetamol	розчин оральний 3 % по 90 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті з мірною ложкою у коробці	УПСА САС	Франція	УПСА САС	Франція	UA/5237/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття флакона: 3 місяці.
1031	ЕФЕРАЛГАН З ВІТАМІНОМ С	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки шипучі, 330 мг/200 мг; по 10 таблеток у тубі; по 1 або по 2 туби у картонній коробці	УПСА САС	Франція	УПСА САС	Франція	UA/7278/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС у щільно закритій тубі та у картонній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1032	ЕХІНАСАЛЬ	Comb drug	сироп, по 125 г у флаконі; по 1 флакону в упаковці	Вроцлавське підприємство лікарських трав "Гербаполь" АТ	Польща	Вроцлавське підприємство лікарських трав "Гербаполь" АТ	Польща	UA/9100/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття флакона – 90 діб.

1033	ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА	Echinacea purpurea**	настойка по 20 мл, або по 25 мл, або по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками і кришками; по 50 мл у флаконах полімерних укупорених кришками; по 50 мл у флаконі скляному або полімерному укупорених кришками, по 1 флакону в пачці з картону; по 20 мл, або по 25 мл, або по 50 мл у скляних флаконах, укупорених пробками-крапельницями і кришками; по 20 мл, або по 25 мл, або по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками-крапельницями і кришками, по 1 флакону в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0363/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1034	ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА	Echinacea purpurea**	настойка по 40 мл у флаконах	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	UA/6882/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1035	ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА	Echinacea purpurea**	настойка, по 20 мл, або по 25 мл, або по 50 мл у флаконах; по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 20 мл, або по 25 мл, або по 50 мл у скляному флаконі, укупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці; по 20 мл, або по 25 мл, або по 50 мл у скляних флаконах, укупорених пробками-крапельницями	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0363/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1036	ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА	Echinacea purpurea**	настойка, по 50 мл у флаконах скляних; по 50 мл у флаконах полімерних, закупорених пробками-крапельницями; по 50 мл у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці з картону; по 50 мл у флаконі полімерному, закупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/1411/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1037	ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРНОЇ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ	Echinacea purpurea**	екстракт; по 30 мл, 50 мл або 100 мл у флаконах скляних; по 30 мл, 50 мл, або 100 мл у флаконі скляному, по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/6079/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1038	ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ КОРЕНЕВИЩ З КОРЕНЯМИ СВІЖИХ НАСТОЙКА	Echinacea purpurea**	настойка, по 40 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3423/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
1039	ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ НАСТОЙКА	Echinacea purpurea**	настойка по 40 мл, або по 50 мл, або по 100 мл у скляних флаконах	ПП "Кілафф"	Україна	ПП "Кілафф"	Україна	UA/12528/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Під час зберігання можливе випадання осаду.
1040	ЕХІНАЦЕЯ	Echinacea purpurea**	екстракт рідкий для перорального застосування по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ЄВРАЗІЯ"	Україна	ТОВ "ЄВРАЗІЯ"	Україна	UA/1855/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1041	ЕХІНАЦЕЯ-АСТРАФАРМ	Echinacea purpurea**	таблетки по 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у коробці з картону	ТОВ "Астрафарм"	Україна	ТОВ "Астрафарм"	Україна	UA/5915/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1042	ЕХІНАЦЕЯ-АСТРАФАРМ	Echinacea purpurea**	таблетки по 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у коробці з картону	ТОВ "Астрафарм"	Україна	ТОВ "Астрафарм"	Україна	UA/5915/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1043	ЕХІНАЦЕЯ-ЛУБНИФАРМ	Echinacea purpurea**	таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/6079/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1044	ЕХІНАЦЕЯ ФАРКОС	Echinacea purpurea**	таблетки; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/18348/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1045	ЕХІНАЦЕЯ ФАРКОС	Echinacea purpurea**	таблетки; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/18348/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1046	ЄВРОФАСТ ПЛЮС	Comb drug	гель, по 50 г у тубі; по 1 тубі у пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Конарк Інтелмед"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/19045/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
1047	ЄВРОФАСТ ПЛЮС	Comb drug	гель, по 50 г у тубі; по 1 тубі у пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Конарк Інтелмед"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/19045/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1048	ЖЕНЬШЕНЬ	Panax ginseng**	настойка для перорального застосування по 50 мл у флаконі скляному або полімерному, по 1 флакону у пачці з картону; по 100 мл у флаконі скляному; по 100 мл у флаконі скляному, по 1 флакону у пачці з картону; по 50 мл у флаконі скляному або полімерному; по 17 кг у бутлях	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5394/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1049	ЖЕНЬШЕНЮ НАСТОЙКА	Panax ginseng**	настойка по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8471/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1050	ЖИВОКОСТ	Comb drug	мазь; по 50 г або по 100 г у банці скляній або полімерній у пачці; по 40 г або по 100 г у тубі в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/16630/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1051	ЖИВОКОСТ	Comb drug	мазь; по 50 г або по 100 г у банці скляній або полімерній у пачці; по 40 г або по 100 г у тубі в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/16630/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1052	ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ	Comb drug	мазь по 25 г або по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону; по 25 г або по 50 г, або по 90 г у банці; по 1 банці в пачці з картону	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/6235/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці
1053	ЖИВОКОСТУ НАСТОЙКА	Sumphytum officinalis**	настойка по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/6735/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
1054	ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА	Chole medicata*	розчин нашкірний по 250 мл у пляшці; по 1 пляшці у пачці з картону; по 200 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону; по 100 мл у флаконі або банці у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Інфузія"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фарма Черкас"	Україна	UA/12368/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1055	ЖОВЧОГІННИЙ ЗБІР	Comb drug	збір по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2476/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1056	ЗАЛАЇН	Sertaconazole	крем 2 % по 20 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	Феррер Інтернаціональ, С.А., (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС (випуск серії)	Іспанія/ Угорщина	UA/1849/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1057	ЗАЛІЗА САХАРАТ - ЗАЛІЗНЕ ВИНО	Saccharated iron oxide	розчин оральний, 7,39 г/100 г по 100 г у флаконах або банках	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/2313/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1058	ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗБІР № 2	Comb drug	збір по 50 г або по 75 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2195/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати при температурі 8—15 °С не більше 2 діб.
1059	ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗБІР № 2 (СЕДАТИВНИЙ)	Comb drug	збір, по 60 г або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/6044/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.

1060	ЗВІРОБОЮ ТРАВА	Hypericum perforatum**	трава по 50 г або 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8280/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.
1061	ЗВІРОБОЮ ТРАВА	Hypericum perforatum**	трава по 50 г або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2126/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2-х діб.
1062	ЗВІРОБОЮ ТРАВА	Hypericum perforatum**	трава по 75 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/13726/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений відвар зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб. Зберігати в недоступному для дітей місці!
1063	ЗЕЛЕНІНА КРАПЛІ	Comb drug	краплі оральні по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону; по 25 мл у флаконах-крапельницях	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8628/01/01	Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС.
1064	ЗЕРКАЛІН®	Clindamycin	розчин нашкірний, 1 % по 30 мл у скляному флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	UA/12443/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1065	ЗИНЕРИТ®	Erythromycin, combinations	порошок для приготування розчину для зовнішнього застосування; 1 пластиковий флакон «А» з порошком (еритроміцину 1,2 г та цинку ацетату, дигідрату, мікронізованого 0,36 г) для приготування розчину для зовнішнього застосування, 1 пластиковий флакон «В» з розчинником (диізопропіл себакат, етанол безводний) по 30 мл та аплікатор (кришка для приготування лікарської форми та дозування одержаного розчину) у картонній коробці	ЧЕПЛАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ	Німеччина	ЛЕО Фарма А/С	Данія	UA/4359/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці. Готовий до використання розчин зберігати протягом 5 тижнів при температурі не вище 25 °С. Якщо необхідно подальше лікування за допомогою препарату Зинерит , слід придбати нову упаковку.

1066	ЗІПЕЛОР®	Benzydamine	льодяники зі смаком лимону по 3,0 мг; по 10 або 12 льодяників у блістері; по 1,2 або 3 блістери у пачці	АТ "Фармак"	Україна	ЛОЗІ'С ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ С.Л. (виробництво готової продукції, випуск серії, первинне і вторинне пакування)/ДР. МЕД. АУФДЕРМАУР АГ(виробництво готової продукції, первинне та вторинне пакування)/ІНФАРМЕЙД, С.Л. (контроль серій, випуск серій)/ЛАБОРАТОРІО ЕЧІВАРНЕ, С.А. (контроль серій)/КІМОС С.Л. (контроль серій)	Іспанія/ Швейцарія/Іспанія/ Іспанія/ Іспанія	UA/18556/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1067	ЗІПЕЛОР®	Benzydamine	льодяники зі смаком меду та апельсину по 3,0 мг; по 10 або 12 льодяників у блістері; по 1, 2 або 3 блістери у пачці	АТ "Фармак"	Україна	ЛОЗІ'С ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ С.Л. (виробництво готової продукції, випуск серії, первинне і вторинне пакування)/ДР. МЕД. АУФДЕРМАУР АГ (виробництво готової продукції, первинне та вторинне пакування)/ІНФАРМЕЙД, С.Л. (контроль серій, випуск серій)/ЛАБОРАТОРІО ЕЧІВАРНЕ, С.А. (контроль серій)/КІМОС С.Л. (контроль серій)	Іспанія/Швейцарія/Іспанія/Іспанія	UA/18683/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1068	ЗІПЕЛОР®	Benzydamine	розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16107/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1069	ЗІПЕЛОР®	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл по 15 мл або 30 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16107/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1070	ЗІПЕЛОР®	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл по 15 мл або 30 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16107/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1071	ЗІПЕЛОР® ФОРТЕ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 3,0 мг/мл, по 15 мл або 30 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16107/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1072	ЗІПЕЛОР® ФОРТЕ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 3,0 мг/мл, по 15 мл або 30 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16107/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1073	ЗІРКА	Comb drug	бальзам для інгаляцій, по 1,3 г в тубі-олівці; по 1 тубі-олівцю у картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Республіка Болгарія	Данафа Фармасьютікал Джоінт Сток Компані	В'єтнам	UA/7031/02/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1074	ЗІРКА	Comb drug	бальзам рідкий, по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Республіка Болгарія	Данафа Фармасьютікал Джоінт Сток Компані	В'єтнам	UA/7031/03/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1075	ЗІРКА	Comb drug	бальзам, по 4 г у баночці; по 1 баночці в картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Республіка Болгарія	Данафа Фармасьютікал Джоінт Сток Компані	В'єтнам	UA/7031/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1076	ЗОВІРАКС	Aciclovir	крем 5 % по 2 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед (виробництво лікарського засобу, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серій)/Халеон КХ С.а.р.л. (первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій)	Велика Британія/ Швейцарія	UA/8629/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
1077	ЗОВІРАКС	Aciclovir	крем 5 % по 2 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	Халеон КХ С.а.р.л.	Швейцарія	UA/8629/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
1078	ЗОТЕК®-200	Dexibuprofen	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/11501/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1079	ЗОТЕК®-300	Dexibuprofen	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 300 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/11501/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1080	ЗОТЕК®-400	Dexibuprofen	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/11501/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1081	ЗУБНІ КРАПЛІ	Comb drug	розчин зубний, по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону; по 10 мл у флаконах; по 20 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у пачці з картону; по 20 мл у флаконах-крапельницях	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8727/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1082	ІБЕРОГАСТ®	Comb drug	краплі оральні по 20 мл або 50 мл, або 100 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Штайгервальд Арцнаймittельверк ГмбХ	Німеччина	UA/6302/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Відкритий флакон можна використовувати протягом 8 тижнів.

1083	ІБУКЛІН®	Ibuprofen	суспензія оральна 200 мг/5 мл, по 100 мл суспензії у флаконі, по 1 флакону у комплекті зі шприцом-дозатором у картонній коробці	ТОВ "Др. Редді'с Лабораторіз"	Україна	ЕДЕФАРМ, С. Л. (виробництво готового продукту, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового продукту)/Фармалідер, С. А. (контроль якості (за винятком мікробіологічного контролю) та випуск серії готового продукту)/Біолаб, С.Л. (мікробіологічний контроль (субпідрядник компанії Фармалідер, С.А.)	Іспанія/ Іспанія/ Іспанія	UA/20673/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1084	ІБУКЛІН®	Ibuprofen	суспензія оральна, 100 мг/5 мл, по 100 мл суспензії у флаконі; по 1 флакону у комплекті зі шприцом-дозатором у картонній коробці	ТОВ "Др. Редді'с Лабораторіз"	Україна	ЕДЕФАРМ, С. Л. (виробництво готового продукту, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового продукту)/Фармалідер, С. А. (контроль якості (за винятком мікробіологічного контролю) та випуск серії готового продукту)/Біолаб, С.Л. (мікробіологічний контроль (субпідрядник компанії Фармалідер, С.А.)	Іспанія/ Іспанія/ Іспанія	UA/20673/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1085	ІБУМЕНТ	Comb drug	гель, по 50 г у тубі; по 1 тубі у пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17281/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1086	ІБУПРОМ ДЛЯ ДІТЕЙ	Ibuprofen	суспензія оральна, по 100 мг/5 мл по 100 мл, 150 мл або 200 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті зі шприцом-дозатором по 5 мл в картонній коробці	Юнілаб, ЛП	США	Фармасьєрра Мануфекчурін, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового лікарського засобу)/Едефарм, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Делфарм Бладел Б.В. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового лікарського засобу)/Фармаліде р, С.А. (контроль якості (за винятком мікробіологічного контролю), випуск серії готового продукту)/ТОВ ЮС Фармація (випуск серії готового продукту)/Біолаб	Іспанія/ Іспанія/ Нідерланд и/ Іспанія/ Польща/ Іспанія	UA/15878/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття – 6 місяців.

1087	ІБУПРОМ ДЛЯ ДІТЕЙ ФОРТЕ	Ibuprofen	суспензія оральна по 200 мг/5 мл по 30 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті зі шприцом-дозатором по 5 мл в картонній коробці	Юнілаб, ЛП	США	Фармасьєрра Мануфекчурін, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового продукту:)/Едефарм, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Біолаб С.Л. (альтернативна дільниця для проведення мікробіологічного контролю (субдоговір з виробником Фармалідер, С.А.))/Делфарм Бладел Б.В. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового продукту)/Фармалідер, С.А. (контроль якості (за винятком	Іспанія/ Іспанія/ Нідерланди/ Іспанія/ Польща	UA/15878/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття флакону – 6 місяців.

1088	ІБУПРОМ СПРИНТ КАПС	Ibuprofen	капсули м'які по 200 мг; по 6 або по 10, або по 12 капсул у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 12 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці	Юнілаб, ЛП	США	ТОВ ЮС Фармація (виробник, відповідальний за упаковку, контроль та випуск серії готового продукту)/Патеон Софтджелс Б.В. ((виробник, відповідальний за виробництво, контроль та випуск продукції in bulk))	Польща/ Нідерланди	UA/6045/02/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1089	ІБУПРОМ СПРИНТ МАКС	Ibuprofen	капсули м'які по 400 мг; по 6 капсул у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Юнілаб, ЛП	США	ТОВ ЮС Фармація (первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Патеон Софтджелс Б.В. (виробництво та контроль якості продукту in bulk, контроль в процесі виробництва, контроль серії)/Проксі Лабораторіз Б.В. (контроль серії)	Польща/ Нідерланди/ Нідерланди	UA/13880/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1090	ІБУПРОФЕН	Ibuprofen	капсули м'які по 200 мг по 10 капсул у блістері, по 1 або 2 блістера в картонній пачці	ТОВ "ІНФАРМА Трейдінг"	Латвійська Республіка	Каталент Джермані Шорндорф ГмбХ (первинне та вторинне пакування)/Каталент Джермані Ебербах ГмбХ (виробництво готового лікарського засобу, пакування балку, контроль якості, випуск серії)	Німеччина / Німеччина	UA/19458/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1091	ІБУПРОФЕН	Ibuprofen	капсули м'які по 400 мг; по 10 капсул у блістері, по 1 або 2 блістера в картонній пачці	ТОВ "ІНФАРМА Трейдінг"	Латвійська Республіка	Каталент Джермані Шорндорф ГмбХ (первинне та вторинне пакування)/Каталент Джермані Ебербах ГмбХ (виробництво готового лікарського засобу, пакування балку, контроль якості, випуск серії)	Німеччина / Німеччина	UA/19458/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1092	ІБУПРОФЕН	Ibuprofen	капсули по 400 мг, по 10 капсул у блістері, по 1 або 2 блістери у коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я", Україна)	Україна	UA/16147/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1093	ІБУПРОФЕН	Ibuprofen	капсули, по 200 мг, по 10 капсул у блістері, по 1 або 2 блістери у коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я", Україна)	Україна	UA/16147/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1094	ІБУПРОФЕН	Ibuprofen	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 90 блістерів у коробці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/7108/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1095	ІБУПРОФЕН	Ibuprofen	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2, або 3, або 4, або 5, або 6 блістерів у пачці з картону; по 7 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/8817/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1096	ІБУПРОФЕН	Ibuprofen	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2, або 3, або 4, або 5, або 6 блістерів у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/8817/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1097	ІБУПРОФЕН	Ibuprofen	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/3304/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1098	ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ	Ibuprofen	таблетки по 200 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1, по 2 або по 5 контурних чарункових упаковок у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/2350/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1099	ІБУПРОФЕН-ЗДОРОВ’Я	Ibuprofen	капсули по 200 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери в коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/11677/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1100	ІБУПРОФЕН-ЗДОРОВ’Я	Ibuprofen	капсули по 400 мг; по 10 капсул у блістері, по 1 або 2 блістери в коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/11677/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1101	ІБУПРОФЕН-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРАКАП	Ibuprofen	капсули м'які по 200 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2, або по 6 блістерів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, випуск серії; контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості)	Україна/ Україна	UA/19233/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1102	ІБУПРОФЕН-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРАКАП	Ibuprofen	капсули м'які по 200 мг, по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, випуск серії; контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості)	Україна/ Україна	UA/19233/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1103	ІБУПРОФЕН-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРАКАП	Ibuprofen	капсули м'які по 400 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2, або по 6 блістерів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, випуск серії; контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості)	Україна/ Україна	UA/19233/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1104	ІБУПРОФЕН-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРАКАП	Ibuprofen	капсули м'які по 400 мг, по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, випуск серії; контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості)	Україна/ Україна	UA/19233/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1105	ІБУПРОФЕН АЛКАЛОЇД	Ibuprofen	суспензія для перорального застосування, 100 мг/5 мл; по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	АЛКАЛОЇД АД Скоп’є	Республіка Північна Македонія	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є	Республіка Північна Македонія	UA/18564/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С.
1106	ІБУПРОФЕН БЕБІ	Ibuprofen	суспензія оральна, 100 мг/5 мл; по 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону разом з дозуючим пристроєм у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/11513/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1107	ІБУФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ МАЛИНА	Ibuprofen	суспензія оральна, 100 мг/5 мл; по 100 мл у пластиковому (ПЕТ) флаконі з поліетиленовим адаптером; по 1 флакону разом з шприцем-дозатором в картонній пачці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; випуск серії)	Польща	UA/9215/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Після відкриття флакона зберігати зі щільно закритою кришкою, використати протягом 6 місяців.
1108	ІБУФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ ПОЛУНИЦЯ	Ibuprofen	суспензія оральна, 100 мг/5 мл; по 100 або по 120 мл у пластиковому флаконі; по 1 флакону зі шприцом-дозатором у картонній пачці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; випуск серії)	Польща	UA/11881/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття флакона – 6 місяців.

1109	ІБУФЕН® ФОРТЕ	Ibuprofen	суспензія оральна з малиновим ароматом, по 200 мг/5 мл по 40 або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону зі шприцом-дозатором у картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (Виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; Випуск серії)	Польща	UA/14437/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності. Термін придатності після відкриття флакона – 6 місяців.
1110	ІБУФЕН® ФОРТЕ	Ibuprofen	суспензія оральна з полуничним ароматом, по 200 мг/5 мл; по 40 або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону зі шприцом-дозатором у картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (Виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; Випуск серії)	Польща	UA/12829/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності. Термін придатності після відкриття флакона – 6 місяців.
1111	ІБУФЕН® ЮНІОР	Ibuprofen	капсули м'які по 200 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; випуск серії)	Польща	UA/12829/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1112	ІВІТУСІН	Hederae helicis folium	сироп, 7 мг/мл; по 100 мл у банці полімерній, по 1 банці з ложкою дозувальною у пачці; по 100 мл у флаконі полімерному, по 1 флакону з ложкою дозувальною у пачці; по 200 мл у флаконі полімерному, по 1 флакону з ложкою дозувальною у пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/19215/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. У процесі зберігання допускається поява легкої опалесценції, що не впливає на терапевтичні властивості лікарського засобу. Після першого розкриття упаковки термін придатності лікарського засобу 3 місяці при температурі не вище 25 °С.
1113	ІМБРОЛІВ	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток в блістері, по 3 блістери у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/20168/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1114	ІМОДІУМ®	Loperamide	капсули по 2 мг по 6 або 20 капсул у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці	МакНіл Продактс Лімітед	Англія	ДЖНТЛ Консьюмер Хелс (Франс) САС	Франція	UA/9831/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1115	ІМОДІУМ® ЕКСПРЕС	Loperamide	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, по 2 мг, по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці	МакНіл Продактс Лімітед	Англія	Каталент ЮК Свіндон Зидіс Лімітед (виробництво, первинне пакування та контроль якості готового продукту)/ДЖНТЛ Консьюмер Хелс (Франс) САС (вторинна упаковка, контроль якості готового продукту, дозвіл на випуск серії)	Велика Британія/ Франція	UA/9831/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1116	ІМПАЗА	Comb drug	таблетки по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/5543/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1117	ІМУНО-ТОН®	Comb drug	сироп по 100 мл у банці; по 1 банці у пачці; по 100 мл або 200 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/2179/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1118	ІМУНО ТАЙСС ФОРТЕ	Echinacea purpurea**	краплі для перорального застосування по 50 мл у флаконах з крапельницею; по 1 флакону з крапельницею у картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	UA/4959/02/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. При зберіганні крапель можливе помутніння розчину або випадання осаду, що не впливає на активність лікарського засобу. Термін придатності після відкриття флакона – 6 місяців
1119	ІМУНОВЕЛ®	Comb drug	капсули; по 12 капсул у блістері, по 2 блістери в пачці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/18784/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1120	ІМУНОПЛЮС	Echinacea purpurea**	таблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/5398/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1121	ІМУНОФІТ	Comb drug	збір по 100 г у пакеті, вкладеному в пачку; по 2 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	UA/3645/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1122	ІМУПРЕТ®	Comb drug	краплі оральні по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці	Біонорика СЕ	Німеччина	Біонорика СЕ	Німеччина	UA/6909/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця. Після першого відкриття флакона препарат придатний для застосування протягом 6 місяців.
1123	ІМУСТАТ	Umifenovir	таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1, по 2 або по 4 контурні чарункові упаковки у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/9052/01/02	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1124	ІМУСТАТ	Umifenovir	таблетки, вкриті оболонкою, по 50 мг; по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/9052/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

1125	ІНГАВІРИН	Pentanedioic acid imidazolyl ethanamide	капсули по 90 мг по 7 капсул у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "РОКЕТ-ФАРМ"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/10409/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С.
1126	ІНГАЛІН®	Comb drug	рідина для інгаляцій по 40 мл у флаконах скляних; по 40 мл у флаконі полімерному, по 1 флакону в пачці з картону; по 40 мл у флаконах скляних, по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/4306/01/01	Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
1127	ІНГАЛІПТ	Comb drug	аерозоль по 30 мл у балоні аерозольному алюмінієвому; по 1 балону з розпилювачем в пачці	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/0827/02/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.
1128	ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	спрей для ротової порожнини по 30 мл у балоні з клапаном-насосом; по 1 балону з насадкою-розпилювачем і захисним ковпачком у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна	UA/3937/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1129	ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Comb drug	спрей для ротової порожнини, по 30 мл у балоні з клапаном-насосом; по 1 балону з насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком у коробці з картону; по 50 мл у флаконі; по 1 флакону з оральним розпилювальним пристроєм та захисним ковпачком у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії); (корпус 4) (всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна	UA/3937/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1130	ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ З РОМАШКОЮ	Comb drug	спрей для ротової порожнини по 30 мл у балоні з клапаном-насосом; по 1 балону з насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком у коробці з картону; по 50 мл у флаконі з захисним ковпачком; по 1 флакону з оральним розпилювальним пристроєм та захисним ковпачком у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна	UA/10947/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1131	ІНГАЛІПТ-КМ	Comb drug	спрей по 30 мл у балоні з клапаном насосного типу; по 1 балону з розпилювачем та захисним ковпачком у пачці з картону	АТ "СТОМА"	Україна	АТ "СТОМА"	Україна	UA/0827/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

1132	ІНГАЛІПТ-Н	Comb drug	спрей для ротової порожнини; по 30 г у балоні; по 1 балону з розпилювачем та захисним ковпачком у пачці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/0938/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці, подалі від вогню.
1133	ІНГАФІТОЛ-1	Comb drug	збір по 50 г у пачках із внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/14305/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1134	ІНГАФІТОЛ-2	Comb drug	збір, по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/14421/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1135	ІНДОВАЗИН-ТЕВА	Troxerutin, combinations	гель; по 45 г у тубі, по 1 тубі у картонній пачці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Троян АТ	Болгарія	UA/0400/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці! Після першого відкриття туби зберігати протягом 6 місяців у зазначених умовах!
1136	ІНДОВЕНОЛ	Rutoside, combinations	гель по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/2152/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1137	ІНДОМЕТАЦИН ПЛЮС	Comb drug	мазь по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8581/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

1138	ІНДОМЕТАЦИН СОФАРМА	Indometacin	мазь 10 % по 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка; дозвіл на випуск серії)	Болгарія	UA/2304/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Термін придатності після розкриття туби – 6 місяців.
1139	ІНЛАКС®	Saccharomyces boulardii	тверді капсули по 250 мг; по 10 твердих капсул у блістері; по 1 блістеру у саше; по 1 саше у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АБЕЛА ФАРМ ДОО БЕЛГРАД (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Факульті оф Фармасі (контроль якості)	Республіка Сербія/Республіка Сербія	UA/20543/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці, у захищеному від світла та вологи місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1140	ІНСТІ	Comb drug	гранули по 5,6 г у саше-пакетах; по 5 або по 10 саше-пакетів у картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/9038/01/01	Зберігати у оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1141	ІНСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ	Comb drug	гранули по 3,5 г у саше-пакеті; по 5 саше-пакетів в картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/11809/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1142	ІНСТІ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА	Comb drug	гранули по 5,6 г у саше-пакетах; по 5 або по 10 саше-пакетів у картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/9042/01/01	Зберігати у оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1143	ІНТЕЛЛАН	Comb drug	капсули по 20 або по 60 капсул у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/2009/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1144	ІНТЕЛЛАН	Comb drug	сироп по 90 мл, 120 мл або 150 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/10243/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1145	ІНФАКОЛ	Silicones	суспензія оральна, 40 мг/мл по 50 мл, або 75 мл, або 100 мл у флаконі з крапельним дозатором; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Пурна Фармасьютікалз НВ	Бельгія	UA/4419/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1146	ІНФЛЮЦИД	Comb drug	таблетки, по 20 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/6740/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1147	ІНФРАГІЛ СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні по 30 мл, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/14859/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1148	ІОВ-МАЛЮК УФК	Comb drug	гранули гомеопатичні по 20 г у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/8665/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці.

1149	ІРИКАР	Mono	мазь, 0,1 г/1 г по 50 г мазі у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	В. Шпітцнер Арцнаймітельфабрик ГмбХ (виробник дозованої форми, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ (виробник, відповідальний за випуск серії)	Німеччина / Німеччина	UA/3766/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1150	ІСЛА-МІНТ	Mono	пастилки по 100 мг, по 10 пастилок у блістері; по 3 блістери в картонній коробці	ПрАТ "Натурфарм"	Україна	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко.КГ (відповідальний за випуск серії, первинне та вторинне пакування)/Болдер Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ (відповідальний за виробництво нерозфасованого продукту)	Німеччина / Німеччина	UA/2187/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

1151	ІСЛА-МООС	Mono	пастилки по 80 мг по 10 пастилок у блістері; по 3 блістери в картонній коробці	ПрАТ "Натурфарм"	Україна	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ (відповідальний за випуск серії, первинне та вторинне пакування)/Болдер Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ (відповідальний за виробництво нерозфасованого продукту)	Німеччина / Німеччина	UA/2188/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1152	ІСМІЖЕН	Comb drug	таблетки сублінгвальні по 50 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Лаллеманд Фарма АГ	Швейцарія	Брусчеттіні с.р.л.	Італія	UA/15678/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці при температурі не вище +25 °С.
1153	ІТІРЕС ЗАЛ СПАГ. ПЄКА	Comb drug	мазь по 35 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	Пекана Натурхайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/16275/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1154	ІТІРЕС СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні по 30 мл, по 50 мл у флаконі з крапельним дозатором; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/14839/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1155	ІХТІОЛ	Ichthammol*	мазь 10 %; по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/0056/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1156	ІХТІОЛ	Ichthammol*	мазь 20 % по 25 г у банках скляних; по 25 г у тубі алюмінієвій, по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5472/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1157	ІХТІОЛОВА МАЗЬ	Ichthammol*	мазь 10 %, по 25 г в тубі; по 25 г в тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/14713/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1158	ІХТІОЛОВА МАЗЬ 10 %	Ichthammol*	мазь 10 %; по 25 г у контейнерах; по 30 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці; по 20 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці; по 30 г у тубах алюмінієвих; по 20 г у тубах алюмінієвих; по 20 г або по 30 г у тубах ламінатних; по 20 г або по 30 г у тубі ламінатній; по 1 тубі в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6654/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1159	ЙОД	Iodine	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 10 мл або по 20 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3043/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

1160	ЙОД	Iodine	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 10 мл, або по 20 мл, або по 100 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за вирбництво, первинне пакування, контроль якості та випсук серії)/ПП "КІЛАФФ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості	Україна/ Україна	UA/8248/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1161	ЙОД	Iodine	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 10 мл, або по 20 мл, або по 100 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за вирбництво, первинне пакування, контроль якості та випсук серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ПП "КІЛАФФ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8248/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1162	ЙОД	Iodine	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 %, по 10 мл або по 20 мл у флаконах скляних або полімерних	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	UA/18027/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1163	ЙОД	Iodine	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 %, по 10 мл, або по 20 мл, або по 1000 мл у флаконах	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8247/01/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1164	ЙОД	Iodine	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 %, по 20 мл, 100 мл у флаконах; по 1 л у каністрах	ПП "Кілафф"	Україна	ПП "Кілафф"	Україна	UA/8324/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1165	ЙОД	Iodine	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 %, у флаконах по 10 мл, 20 мл або по 25 мл в груповій упаковці	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України"	Україна	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України"	Україна	UA/18516/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1166	ЙОД-ВІШФА	Iodine	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 20 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16869/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1167	ЙОД-НОРМІЛ	Potassium iodide	таблетки по 100 мкг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/6383/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1168	ЙОД-НОРМІЛ	Potassium iodide	таблетки по 200 мкг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/6383/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1169	ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ	Povidone-iodine	розчин для зовнішнього застосування 10 %, по 30 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці із картону; по 50 мл або по 100 мл у флаконі з насадкою, по 1 флакону в пачці із картону; по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею; по 1 банці в пачці; по 1000 мл у контейнерах пластмасових	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/12321/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1170	ЙОДАДІН	Povidone-iodine	мазь 10 %; по 20 г або по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18716/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1171	ЙОДАДІН	Povidone-iodine	розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % по 30 мл або по 120 мл у флаконах; по 30 мл або по 120 мл у флаконах, по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18716/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1172	ЙОДДИЦЕРИН®	Iodine	розчин нашкірний 5 мг/г по 25 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/7890/01/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1173	ЙОДИД-ФАРМАК®	Potassium iodide	таблетки по 100 мкг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/6821/01/01	Зберігати у захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 оС.
1174	ЙОДИД-ФАРМАК®	Potassium iodide	таблетки по 200 мкг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/6821/01/02	Зберігати у захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 оС.
1175	ЙОДІКСОЛ®	Povidone-iodine	спрей, 85 мг/г; по 30 г у контейнері пластиковому з механічним насосом та розпилювачем; по 1 контейнеру в пачці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/5764/01/01	При температурі не вище 25 °С, для захисту від дії світла контейнер слід тримати в зовнішній пачці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1176	ЙОДОМАРИН® 200	Potassium iodide	таблетки по 200 мкг по 25 таблеток у блістері з жорсткої полівінілхлоридної плівки та жорсткої алюмінієвої фольги; по 2 блістери в картонній коробці	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ	Німеччина	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", контроль серій; пакування, контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування та контроль серій)	Німеччина / Німеччина	UA/0156/01/02	Упаковку, що містить ПВХ/алюмінієвий блістер, зберігати при температурі не вище 25 °С. Для упаковки, що містить алюміній/алюмінієвий блістер, спеціальні умови зберігання не вимагаються. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

1177	ЙОДУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 5 %	Iodine	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 10 мл або по 20 мл, або 100 мл у флаконах	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/8729/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці
1178	ЙОДУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 5 %	Iodine	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 9 мл у флаконах, по 9 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 20 мл у флаконах-крапельницях; по 20 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону - крапельниці в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8249/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1179	КАЛЕНДУЛА - ВІШФА	Calendula officinalis**	настойка, по 50 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16870/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1180	КАЛЕНДУЛИ КВІТКИ	Calendula officinalis**	квітки по 25 г, 40 г або 50 г або 55 г у пачках з внутрішнім пакетом з цільною сировиною; по 25 г, 40 г або 50 г або 55 г у пачках з внутрішнім пакетом з подрібненою сировиною; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8282/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 оС до 15 оС не більше 2 діб.

1181	КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ	Calendula officinalis**	мазь по 20 г у тубі; по 1 тубі у пачці; по 20 г у тубах	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8418/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1182	КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ	Calendula officinalis**	мазь по 25 г в тубі; по 1 тубі в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3042/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1183	КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ	Calendula officinalis**	мазь по 30 г у тубах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8039/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1184	КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ	Calendula officinalis**	мазь по 40 г в банках; по 30 г в тубах; по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/6780/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1185	КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ	Calendula officinalis**	мазь по 40 г у контейнерах; по 20 або по 30 г у тубах; по 20 або по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону; по 20 г або по 30 г у тубах ламінатних; по 20 г або по 30 г у тубі ламінантній; по 1 тубі в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7242/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1186	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	Calendula officinalis**	настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування; по 50 мл, 40 мл або 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконі скляному, по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/6780/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1187	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	Calendula officinalis**	настойка по 20 мл або по 25 мл, або по 40 мл, або по 50 мл у флаконах укупорених пробками та кришками або пробками-крапельницями та кришками; по 20 мл або по 25 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею та кришками, по 1 флакону в пачці з картону; по 40 мл або по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою або пробкою і кришкою, по 1 флакону в пачці з картону; по 20 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками; по 20 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою, по 1 флакону в пачці; по 25 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7242/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1188	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	Calendula officinalis**	настойка по 40 мл або по 50 мл у флаконах скляних або полімерних	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8418/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

1189	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	Calendula officinalis**	настойка по 40 мл у флаконах скляних або полімерних	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8039/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1190	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	Calendula officinalis**	настойка по 40 мл у флаконах скляних або полімерних	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8039/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1191	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	Calendula officinalis**	настойка по 40 мл, 50 мл, 100 мл у флаконах	ПП "Кілафф"	Україна	ПП "Кілафф"	Україна	UA/12540/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.
1192	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	Calendula officinalis**	настойка по 50 мл або 100 мл у флаконах; по 100 мл у банках	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/7241/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1193	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	Calendula officinalis**	настойка по 50 мл або по 100 мл у флаконах скляних, по 100 мл або 50 мл у флаконах полімерних	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	ТОВ "МЕДЛЕВ "	Україна	UA/17231/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.
1194	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	Calendula officinalis**	настойка по 50 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3042/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
1195	КАЛІЮ ОРОТАТ	Potassium orotate*	таблетки по 500 мг по 10 таблеток у блістерах	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/9207/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1196	КАЛІЮ ОРОТАТ	Potassium orotate*	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм"	Україна/ Україна	UA/7308/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. В недоступному для дітей місці.
1197	КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ	Potassium permanganate	порошок для розчину для зовнішнього застосування по 5 г, 1 флакон з порошком	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	UA/5815/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1198	КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ	Potassium permanganate	порошок по 3 г або 5 г у банках	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0283/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1199	КАЛЬЦЕМІН® СІЛЬВЕР	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою; по 30 або 60 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Контракт Фармакал Корпорейшн (первинна та вторинна упаковка, контроль якості, дозвіл на випуск серії; виробництво in bulk)	США	UA/7138/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у щільно закупореному флаконі. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1200	КАЛЬЦЕОС	Comb drug	таблетки жувальні, по 15 таблеток у поліпропіленовій тубі з поліетиленовою пробкою; по 2 туби в картонній пачці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі	Франція	UA/13337/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Пробка для туби всередині містить дрібні гранули силікагелю з метою захисту таблеток від вологи. Тримати пробку туби поза полем зору та досяжності дітей. Не ковтати гранули силікагелю.
1201	КАЛЬЦЕОС	Comb drug	таблетки жувальні, по 15 таблеток у поліпропіленовій тубі з поліетиленовою пробкою; по 2 туби в картонній пачці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі	Франція	UA/13337/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Пробка для туби всередині містить дрібні гранули силікагелю з метою захисту таблеток від вологи. Тримати пробку туби поза полем зору та досяжності дітей. Не ковтати гранули силікагелю.
1202	КАЛЬЦИЙ КВЕРКУС ГЛОБУЛІ ВЕЛАТІ	Mono	гранули гомеопатичні, по 20 г у флаконі; по 1 флакону в коробці з картону	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/16276/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1203	КАЛЬЦИКЕР	Comb drug	суспензія оральна по 120 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложкою у картонній упаковці	Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед	Індія	Індоко Ремедіс Лімітед/Некст Вейв (Індія)	Індія/Індія	UA/2515/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1204	КАЛЬЦІ-М	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 15 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	Туліп Лаб Прайвіт Лімітед	Індія	Туліп Лаб Пвт. Лтд.	Індія	UA/16477/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1205	КАЛЬЦІ-М	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 15 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	АМОЛ ФАРМАСЬЮТІКАЛС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД	Індія	Туліп Лаб Пвт. Лтд.	Індія	UA/16477/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1206	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	Calcium gluconate	таблетки по 0,5 г по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 3 або по 10 блістерів у пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/1933/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1207	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	Calcium gluconate	таблетки по 500 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 10 блістерів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/6048/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С Зберігати у недоступному для дітей місці.
1208	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	Calcium gluconate	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 10 блістерів в пачці з картону; по 10 таблеток у блістерах	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	UA/8474/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1209	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	Calcium gluconate	таблетки по 500 мг; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1, 5 або 10 блістерів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/6048/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С Зберігати у недоступному для дітей місці.
1210	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	Calcium gluconate	таблетки по 500 мг; по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна/ Україна	UA/8542/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1211	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ	Calcium gluconate	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках; по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 або по 10 контурних чарункових упаковок у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/6589/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1212	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ЗДОРОВ'Я	Calcium gluconate	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 10 блістерів у картонній коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/4726/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1213	КАМЕТОН	Comb drug	аерозоль по 30 г у балоні аерозольному алюмінієвому; по 1 балону з розпилювачем в пачці	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/4658/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

1214	КАМЕТОН	Comb drug	аерозоль; по 30 г у балоні аерозольному; по 1 балону в пачці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/0939/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Забороняється застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1215	КАМЕТОН-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	спрей назальний та оромукозний по 25 г у балоні із захисним ковпачком забезпеченому дозуючим клапаном-насосом та назальною насадкою-розпилювачем з захисним ковпачком і оральним розпилювачем; по 1 балону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/2288/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1216	КАМЕТОН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Comb drug	спрей оромукозний; по 25 г у балоні забезпеченому клапаном-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 балону у коробці з картону; по 40 г у флаконі з оральним розпилювальним пристроєм та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/2288/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1217	КАМІДЕНТ-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	гель для ротової порожнини по 10 г або 20 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/3310/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1218	КАМФОМЕН®	Comb drug	аерозоль по 30 г у балоні аерозольному алюмінієвому, по 1 балону з розпилювачем в пачці	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/4361/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

1219	КАМФОРНА ОЛІЯ	Camphora	олія для зовнішнього застосування 10 %, по 25 мл або по 30 мл, або по 40 мл, або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками або пробками-крапельницями та кришками; по 25 мл або по 30 мл, або по 40 мл, або по 50 мл, або по 100 мл у флаконі скляному, укупореному пробкою та кришкою або пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 мл або по 30 мл або по 40 мл, або по 50 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками; по 25 мл або по 30 мл або по 40 мл, або по 50 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 30 мл або	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0725/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1220	КАМФОРНА ОЛІЯ	Camphora	розчин олійний 10 %, нашкірний по 30 мл у скляних флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/0590/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1221	КАМФОРНА ОЛІЯ	Camphora	розчин олійний 10 %, нашкірний, по 30 мл у скляних флаконах	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/0590/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1222	КАМФОРНИЙ СПИРТ- ВІШФА	Camphora	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10 % по 40 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16903/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1223	КАНДІД	Clotrimazole	крем, 10 мг/1 г по 20 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	UA/9754/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1224	КАНДІД	Clotrimazole	порошок нашкірний, 10 мг/г по 30 г у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	UA/9754/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1225	КАНДІД	Clotrimazole	розчин для зовнішнього застосування, 10 мг/1 мл, по 20 мл у флаконі з ковпачком з контролем першого відкриття: по 1 флакону в картонній упаковці	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	UA/9754/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1226	КАНДІД	Clotrimazole	розчин для ротової порожнини 1 % по 15 мл у флаконі із пробкою-крапельницею та ковпачком з контролем першого відкриття; по 1 флакону в картонній упаковці	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	UA/8209/01/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1227	КАНЕСТЕН®	Clotrimazole	таблетки вагінальні по 100 мг, по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру в комплекті з аплікатором в картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Байєр АГ	Німеччина	UA/3588/03/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1228	КАНЕСТЕН®	Clotrimazole	таблетки вагінальні по 200 мг, по 3 таблетки у блістері; по 1 блістеру в комплекті з аплікатором в картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Байєр АГ	Німеччина	UA/3588/03/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1229	КАНЕСТЕН®	Clotrimazole	таблетки вагінальні по 500 мг, по 1 таблетці у блістері; по 1 блістеру в комплекті з аплікатором в картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Байєр АГ	Німеччина	UA/3588/03/03	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1230	КАНЕФРОН® Н	Comb drug	краплі оральні, по 100 мл у флаконі зі скла з дозуючим крапельним пристроєм; по 1 флакону в коробці з картону	Біонорика СЕ	Німеччина	Біонорика СЕ	Німеччина	UA/4708/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона лікарський засіб придатний для застосування протягом 6 місяців. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця.
1231	КАПСИКАМ®	Comb drug	мазь, по 15 г, по 30 г або по 50 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі та 1 аплікатору в пачці картонній	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ Талліннський фармацевтичний завод/АТ "Гріндекс"	Естонія/ Латвія	UA/6191/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не зберігати у холодильнику та морозильній камері. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1232	КАПСИОЛ®	Comb drug	розчин нашкірний, спиртовий; по 10 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 4, 8 або 12 флаконів в пачці; по 100 мл або по 200 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці; по 100 мл або по 200 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону з пробкою-крапельницею в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/1046/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Лікарський засіб не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!
1233	КАПСУЛИ З АНІСОВОЮ ОЛІЄЮ ДР. ТАЙСС	Anisum vulgare**	капсули по 100 мг по 10 капсул у блістері; по 2 або 3, або 5 блістерів у картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (дозвіл на випуск серії готового лікарського засобу)/Аенова Румунія С.Р.Л. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)/Свісс Кепс ГмбХ (первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Румунія/ Німеччина	UA/6823/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1234	КАРБАЦИД ПЕЧАЄВСЬКИЙ	Comb drug	таблетки жувальні, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону, по 10 таблеток у контейнері, по 2 контейнери у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/13520/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1235	КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ®	Carbamide	крем, 100 мг/г по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/2351/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1236	КАРВЕЛІС	Comb drug	краплі оральні, розчин по 30 мл, по 50 мл, по 100 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в картонній пачці	ПРОФАРМА Інтернешнл Трейдинг Лімітед	Мальта	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/13314/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла місці, у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона термін придатності складає 6 місяців.
1237	КАРДІО-ГРАН	Comb drug	гранули, по 10 г у пеналі або флаконі з кришкою; по 1 пеналу або флакону в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/8454/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25оС.

1238	КАРДІО-ДАР®	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг; по 30 або по 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці; по 10 таблеток в контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/18901/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1239	КАРДІО-ДАР®	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг; по 30 або по 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці; по 10 таблеток в контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/18901/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1240	КАРДІО-ДАР®	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг; по 30 або по 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці; по 10 таблеток в контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/18901/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1241	КАРДІО-ДАР®	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг; по 30 або по 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці; по 10 таблеток в контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/18901/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1242	КАРДІОАРГІНІН-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	сироп по 50 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканом у коробці з картону; по 100 мл у флаконі, по 1 флакону з мірним стаканом у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/11187/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не охолоджувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1243	КАРДІОВІОЛ® СЕРЦЕВІ КРАПЛІ	Comb drug	краплі оральні; по 25 мл або по 50 мл, або по 80 мл, або по 100 мл у флаконах з пробкою-крапельницею та кришкою; по 25 мл або по 50 мл, або по 80 мл, або по 100 мл у флаконі з пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/16005/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1244	КАРДІОЛІН	Comb drug	краплі для перорального застосування по 30 мл або по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/5676/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.

1245	КАРДІОМАГНІЛ	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг; по 30 або по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	ТОВ "АСІНО УКРАЇНА"	Україна	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом)/Асіно Естонія ОУ (альтернативна дільниця для первинного та вторинного пакування, випуску серії)/Асіно Фарма АГ (альтернативна дільниця виробництва та контролю якості)/Приватний науково-дослідний інститут Хеппелер ГмбХ (контрактна лабораторія для контролю "Мікробіологічної чистоти")	Німеччина/ Естонія/ Швейцарія/ Німеччина	UA/10141/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці!
1246	КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг по 30 або по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	ТОВ "АСІНО УКРАЇНА"	Україна	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом)	Німеччина	UA/10141/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці!

1247	КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг по 30 або по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	ТОВ "АСІНО УКРАЇНА"	Україна	Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом)	Німеччина	UA/10141/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці!
1248	КАРДІОСЕД	Comb drug	краплі оральні; по 25 мл, по 40 мл, або по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/18003/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1249	КАРДІОФІТ	Comb drug	настойка складна по 100 мл у банці скляній; по 1 банці в пачці з картону; по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці в пачці з картону; по 100 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "Ейм"	Україна	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "Ейм"	Україна	UA/8710/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1250	КАРДІСЕЙВ®	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/14585/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1251	КАРДІСЕЙВ®	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/14585/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1252	КАРДІТАБ ІС	Barbiturates in combination with other drugs	таблетки по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці; по 6 таблеток у блістері	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/14659/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1253	КАРДІТАБ ІС	Barbiturates in combination with other drugs	таблетки сублінгвальні по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці; по 6 таблеток у блістері	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/14659/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1254	КАРДІТАБ® ІС ФІТО	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/15572/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1255	КАРДОНАТ	Comb drug	капсули, по 20 або 30 капсул у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/6386/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1256	КАРДОНАТ	Comb drug	капсули, по 20 або 30 капсул у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/6386/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1257	КАРДОНАТ L-КАРНІТИН	Levocarnitine	розчин оральний 200 мг/мл, по 60 мл у контейнері із поліетилентерефталат у закритим кришкою з контролем першого відкриття; по 1 контейнеру з дозуючим шприцом у пачці з картону; по 100 мл у контейнері із поліетилентерефталат у закритим кришкою з контролем першого відкриття; по 1 контейнеру з дозуючою ложкою та з дозуючим шприцом у пачці з картону; по 100 мл у скляному контейнері закритим кришкою з контролем першого відкриття, по 1 контейнеру з дозуючою ложкою та дозуючим шприцом у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/19316/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1258	КАРДОНАТ L-КАРНІТИН	Levocarnitine	розчин оральний, 200 мг/мл по 60 мл у контейнері із поліетилентерефталат у закритим кришкою з контролем першого відкриття; по 1 контейнеру з дозуючим шприцом у пачці з картону; по 100 мл у контейнері із поліетилентерефталат у закритим кришкою з контролем першого відкриття; по 1 контейнеру з дозуючою ложкою та з дозуючим шприцом у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/19316/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1259	КАРДОНАТ L-КАРНІТИН	Levocarnitine	розчин оральний, 200 мг/мл, по 60 мл у контейнері із поліетилентерефталат у закритим кришкою з контролем першого відкриття; по 1 контейнеру з дозуючим шприцом у пачці з картону; по 100 мл у контейнері із поліетилентерефталат у закритим кришкою з контролем першого відкриття; по 1 контейнеру з дозуючою ложкою та з дозуючим шприцом у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/19316/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1260	КАРМІНАТИВУМ БЕБІНОС	Comb drug	краплі оральні, розчин, по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону	Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарати Ленк та Шуппан	Німеччина	Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарати Ленк та Шуппан	Німеччина	UA/8686/01/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС у щільно закритій упаковці. Після першого відкриття флакона препарат придатний до застосування протягом 1 року.
1261	КАРСИЛ®	Silymarin	таблетки, вкриті оболонкою, по 22,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 8 блістерів у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма"	Болгарія	UA/2773/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

1262	КАРСИЛ®	Silymarin	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 22,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 8 блістерів у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма"	Болгарія	UA/2773/02/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С.
1263	КАРТАН	Levocarnitine	розчин оральний, 1 г/10 мл по 10 мл в ампулі; по 10 ампул у картонній пачці	ДЕМО СА Фармасьютикал Індастрі	Греція	ДЕМО СА Фармасьютикал Індастрі	Греція	UA/15595/02/01	Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
1264	КАРУМ КАРВІ ДИТЯЧІ	Comb drug	супозиторії ректальні по 5 супозиторіїв (по 1 г кожен) в контурній чарунковій упаковці; по 2 контурній чарунковій упаковці у картонній упаковці	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ (випуск нерозфасованої продукції, вторинна упаковка та дозвіл на випуск серії)/АМКАФАРМ Фармасьютікал ГмбХ (випуск нерозфасованої продукції, первинна упаковка)	Німеччина / Німеччина	UA/17577/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1265	КАТАРІЯ	Sodium citrate	гранули по 4,0 г/5,6 г; по 5,6 г гранул в саше; по 6 саше в картонній коробці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	Кусум Хелтхкер Пвт Лтд	Індія	UA/12090/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1266	КАТАРІЯ	Sodium citrate	гранули по 4,0 г/5,6 г; по 5,6 г гранул в саше; по 6 саше в картонній коробці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	Кусум Хелтхкер Пвт Лтд	Індія	UA/12090/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1267	КАФФЕТІН® ЛЕДІ	Ibuprofen	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в коробці	АЛКАЛОЇД АД Скоп'є	Республіка Північна Македонія	Алкалоїд АД Скоп'є	Північна Македонія	UA/9605/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1268	КВАДЕВІТ®	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці; по 15 таблеток у блістері; по 4 або по 6 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/8633/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1269	КВАЙТ®	Comb drug	розчин оральний; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з дозуючим стаканом/стаканом дозуючим у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/13812/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1270	КВАЙТ® ЗАСПОКІЙЛИВИЙ	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 4 блістери у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/17603/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
1271	КВАЙТ® ЗАСПОКІЙЛИВИЙ	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 4 блістери у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/17603/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

1272	КВЕНТАКЕЛЬ D5	Mono	краплі для перорального та місцевого застосування по 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в картонній пачці	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/11595/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці. Після першого відкриття препарат придатний протягом 2 місяців.
1273	КВЕРТИН	Quercetin*	таблетки жувальні по 40 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці; по 90 таблеток у контейнерах; по 90 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/0119/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1274	КВЕРТИН	Quercetin*	таблетки жувальні по 40 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці; по 90 таблеток у контейнерах; по 90 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/0119/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1275	КВЕРЦЕТИН	Quercetin*	гранули, 0,04 г/1 г, по 1 г або по 2 г у пакетах; по 1 г або по 2 г у пакеті; по 20 пакетів у пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/0119/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. У недоступному для дітей місці.

1276	КЕТО ПЛЮС	Comb drug	шампунь; по 60 мл або по 150 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	UA/10142/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1277	КЕТОДІН	Ketoconazole	крем, 20 мг/г по 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/5825/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1278	КЕТОДІН	Ketoconazole	супозиторії вагінальні по 400 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/5825/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1279	КЕТОДІН	Ketoconazole	супозиторії вагінальні по 400 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/5825/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1280	КЕТОЗОРАЛ®-ДАРНИЦЯ	Ketoconazole	шампунь, 20 мг/г по 60 г або по 100 г у флаконі; по 1 флакону у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/8226/02/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі від 15 °С до 25 °С.

1281	КЕТОКОНАЗОЛ -ФАРМЕКС	Ketoconazole	песарії по 400 мг; по 5 песаріїв у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/13582/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1282	КЕТОКОНАЗОЛ -ФІТОФАРМ	Ketoconazole	крем для зовнішнього застосування 2 %, по 15 г або по 25 г у тубі, по 1 тубі у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/4126/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1283	КЕТОРОЛ ГЕЛЬ	Ketorolac	гель 2 % по 30 г у тубі; по 1 тубі в коробці	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд	Індія	Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед	Індія	UA/2566/03/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1284	КИСЛОТА АСКОРБІНОВА З ГЛЮКОЗОЮ	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/4572/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1285	КИСЛОТА НІКОТИНОВА	Nicotinic acid	таблетки по 50 мг, по 50 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру в пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/4362/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
1286	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 40 мл у флаконах; по 40 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8493/01/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1287	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА 1 %	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 25 мл або по 40 мл у флаконах	ТОВ "Фарма Черкас"	Україна	ТОВ "Фарма Черкас"	Україна	UA/18142/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
1288	КІДДІФЄН	Ibuprofen	суспензія оральна, 100 мг/5 мл, по 100 мл у флаконі із поліетилентерефталат у закритим кришкою, по 1 флакону у комплекті з дозуючим шприцом в пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Едефарм, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії готового продукту)/Фармалідер, С.А. (контроль якості (за винятком мікробіологічного контролю), випуск серії готового продукту)/Біолаб, С.Л. (мікробіологічний контроль (субпідрядник компанії Farmalider, S.A.))	Іспанія/ Іспанія/ Іспанія	UA/20290/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1289	КЛАРИТИН®	Loratadine	сироп, 1 мг/мл; по 60 мл або по 120 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканом у картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Дельфарм Монреаль Інк.	Канада	UA/2171/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

1290	КЛАРИТИН®	Loratadine	таблетки по 10 мг по 7 або 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Байєр Біттерфельд ГмбХ	Німеччина	UA/10060/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.
1291	КЛІМАДИНОН®	Cimicifugae rhizoma	краплі оральні, по 50 мл у флаконі з дозуючим крапельним пристроєм; по 1 флакону в картонній коробці	Біонорика СЕ	Німеччина	Біонорика СЕ	Німеччина	UA/5021/02/01	Зберігати для захисту від світла в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
1292	КЛІМАКСАН ГОМЕОПАТИЧНИЙ	Comb drug	таблетки, по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/12815/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1293	КЛІМАКТ-ХЕЕЛЬ	Comb drug	таблетки, по 50 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/2945/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Закривати контейнер із таблетками негайно після застосування, захищати від вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.
1294	КЛІМАКТО-ГРАН	Comb drug	гранули по 10 г гранул у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону; по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/3822/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

1295	КЛІМАКТОПЛАН	Comb drug	таблетки по 20 таблеток у блістері; по 3 або по 5 блістерів у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ (Виробник, відповідальний за кінцевий продукт, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серій)	Німеччина	UA/13672/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в сухому, недоступному для дітей місці.
1296	КЛІОРОН	Chlorhexidine	супозиторії вагінальні по 16 мг, по 5 супозиторіїв у блістері, по 2 блістери в пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/13358/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1297	КЛІФЕ СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні; по 30 мл, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/13591/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1298	КЛОБЕСИЛ	Diclofenac	гель, 50 мг/г; по 45 г гелю в тубі; по 1 тубі у картонній пачці	АНТИБІОТИКИ СА	Румунія	АНТИБІОТИКИ СА	Румунія	UA/19630/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1299	КЛОДИФЕН	Diclofenac	гель, 10 мг/г, по 45 г в тубі; по 1 тубі у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	К.О. СЛАВІЯ ФАРМ С.Р.Л.	Румунія	UA/10810/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1300	КЛОДИФЕН	Diclofenac	гель, 50 мг/г по 45 г у тубах; по 1 тубі у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/13861/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1301	КЛОТРИМАЗОЛ	Clotrimazole	мазь 1 % по 15 г або по 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/3967/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1302	КЛОТРИМАЗОЛ	Clotrimazole	мазь 1 %, по 25 г у тубі, по 1 тубі у пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/1645/02/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1303	КЛОТРИМАЗОЛ	Clotrimazole	мазь 1%; по 15 г або по 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/3967/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1304	КЛОТРИМАЗОЛ	Clotrimazole	розчин для зовнішнього застосування 1 % по 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/1645/03/01	У захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1305	КЛОТРИМАЗОЛ	Clotrimazole	таблетки вагінальні по 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/1645/04/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. В недоступному для дітей місці.
1306	КЛОФАН	Clotrimazole	крем 1 % по 20 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/19381/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1307	КЛОФАН	Clotrimazole	крем 2 %, по 20 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/19381/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1308	КЛОФАН	Clotrimazole	супозиторії вагінальні по 100 мг; по 6 супозиторіїв у стрипі; по 1 стрипу у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/14084/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1309	КЛОФАН	Clotrimazole	супозиторії вагінальні по 100 мг; по 6 супозиторіїв у стрипі; по 1 стрипу у картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/14084/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1310	КЛОФАН	Clotrimazole	супозиторії вагінальні по 500 мг; по 1 супозиторію у стрипі; по 1 стрипу у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/14084/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1311	КЛОФАН	Clotrimazole	супозиторії вагінальні по 500 мг; по 1 супозиторію у стрипі; по 1 стрипу у картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/14084/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1312	КЛОФАН®	Clotrimazole	крем вагінальний 10 %; по 7 г у тубі; по 1 тубі разом з аплікатором у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/14084/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1313	КМИНУ ПЛОДИ	Carum carvi**	плоди по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/7082/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1314	КОЛДІБЕЛ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру у картонному конверті	ТОВ "Аміла Хелс Кеа"	Україна	Прісайз Хеміфарма Пвт. Лтд.	Індія	UA/11466/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

1315	КОЛДІФЕНС ІЗІ ДРІНК	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з лимонним смаком; по 5 г порошку в саше, по 10 саше в картонній коробці	ТОВ "Представництво Баум Фарм ГМБХ"	Україна	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/20509/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1316	КОЛДІФЕНС ІЗІ ДРІНК	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з малиновим смаком; по 5 г порошку в саше, по 10 саше в картонній коробці	ТОВ "Представництво Баум Фарм ГМБХ"	Україна	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/20508/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1317	КОЛДІФЕНС МАЗЬ	Comb drug	мазь по 25 г в банці; по 1 банці в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕДСТАВНИЦТВО БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/6397/01/01	Зберігати у щільно укупореній тарі при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
1318	КОЛДРЕКС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	СТАДА Арцнаймиттель АГ	Німеччина	ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед (виробництво за повним циклом)/ХАЛЕОН АЛКАЛА, С.А. (відповідає за первинну, вторинну упаковку, контроль якості (тільки мікробіологічна чистота), випуск серії)	Ірландія/ Іспанія	UA/2675/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1319	КОЛДРЕКС МАКСГРИП 3І СМАКОМ ЛИМОНУ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; 5 або 10 пакетиків у картонній коробці	СТАДА Арцнаймітель АГ	Німеччина	ХАЛЕОН АЛКАЛА, С.А.	Іспанія	UA/8393/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.
1320	КОЛДРЕКС МАКСГРИП 3І СМАКОМ ЛИМОНУ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; 5 або 10 пакетиків у картонній коробці	СТАДА Арцнаймітель АГ	Німеччина	ХАЛЕОН АЛКАЛА, С.А. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серій, випуск серій)/Хемофарм д.о.о. (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування)/СТАДА ХЕМОФАРМ С.Р.Л. (фізико-хімічний контроль серій)/алльфамед Фарбіл Арцнаймітель ГмбХ (мікробіологічний контроль серій)/СТАДА Арцнаймітель АГ (випуск серій)	Іспанія/ Боснія і Герцеговина/Румунія/Німеччина/Німеччина	UA/8393/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.

1321	КОЛДРЕКС ХОТРЕМ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНУ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 5 г порошку у пакетику; по 5 або 10 пакетиків у картонній коробці	СТАДА Арцнаймітель АГ	Німеччина	ХАЛЕОН АЛКАЛА, С.А.	Іспанія	UA/2560/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1322	КОЛІГАЗ-ЗДОРОВ'Я	Silicones	краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/17462/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності препарату після розкриття флакона 28 діб.
1323	КОЛІГАЗ-ЗДОРОВ'Я	Silicones	таблетки жувальні по 125 мг; по 7 таблеток у блістері, по 1 або по 2 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/16593/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1324	КОЛІГАЗ-ЗДОРОВ`Я	Silicones	капсули м'які по 125 мг по 10 капсул у блістері; по 1, по 2 або по 3 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/17037/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1325	КОЛІГАЗ-ЗДОРОВ`Я	Silicones	таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг, по 7 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/17462/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1326	КОЛІКІД®	Silicones	суспензія оральна, 40 мг/мл; по 30 мл суспензії у скляному флаконі; кожен флакон у картонній упаковці разом із шприцом-дозатором об'ємом 5 мл та адаптером для шприца	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/10461/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакону препарат зберігати не більше 6 місяців.
1327	КОЛІКІД®	Silicones	таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг; по 7 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній упаковці; по 15 таблеток у блістері; по 1, 2 або 4 блістери у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/10461/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1328	КОЛЛОМАК® М	Salicylic acid	розчин нашкірний 167,0 мг/г, по 10 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці	АЛЕКСФАРМ ГМБХ ЛТД	Сполучене Королівство	Медінфар Мануфактурінг С.А.	Португалія	UA/17397/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Легкозаймистий препарат. Зберігати щільно закритим. Термін придатності після першого розкриття флакону 1 рік.

1329	КОМБІГРИП ДЕКСА®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки; по 4 таблетки у блістері з фольги алюмінієвої і плівки полівінілхлоридної; по 1 блістеру у пачці з картону; по 20 пачок у груповій пачці з картону; по 8 таблеток у блістері з фольги алюмінієвої і плівки полівінілхлоридної; по 1 блістеру у пачці з картону; по 10 пачок у груповій пачці з картону; по 4 таблетки у блістері з фольги алюмінієвої; по 1 блістеру у пачці з картону; по 20 пачок у груповій пачці з картону; по 8 таблеток у блістері з фольги алюмінієвої; по 1 блістеру у пачці з картону; по 10 пачок у груповій пачці з картону; по 4 таблетки у блістері із фольги алюмінієвої; по 1 блістеру у паперовому конверті; по 20 паперових конвертів у груповій пачці з картону	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/2068/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1330	КОМБІГРИП ІЗІ ДРІНК	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з лимонним смаком; по 5 г порошку в саше, по 10 саше в картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/20509/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1331	КОМБІГРИП ІЗІ ДРІНК	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з малиновим смаком; по 5 г порошку в саше, по 10 саше в картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/20508/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1332	КОМБІГРИП ХОТ СІП®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з лимонним смаком по 5 г порошку в саше, по 10 саше в картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед/Сага Лайфсаєнсиз Лімітед	Індія/Індія	UA/11503/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1333	КОМБІГРИП ХОТ СІП®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з малиновим смаком по 5 г порошку в саше; по 10 саше в картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед/Сага Лайфсаєнсиз Лімітед	Індія/Індія	UA/11504/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1334	КОМБІГРИП®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 8 таблеток у блістері з фольги алюмінієвої і плівки полівінілхлоридної або по 8 таблеток у блістері із фольги алюмінієвої; по 1 блістеру у пачці з картону; по 8 таблеток у блістері з фольги алюмінієвої і плівки полівінілхлоридної або по 8 таблеток у блістері із фольги алюмінієвої; по 1 блістеру у пачці з картону; по 10 пачок у груповій пачці з картону; по 4 таблетки у блістері з фольги алюмінієвої; по 1 блістеру у паперовому конверті; по 20 паперових конвертів у груповій пачці з картону; по 4 таблетки у блістері з фольги алюмінієвої; по 1 блістеру у пачці з картону; по 20 пачок у груповій пачці з картону	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/2913/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1335	КОМБІЛІВЕ	Comb drug	капсули тверді; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/20213/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1336	КОМБІСПАЗМ®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістері з фольги алюмінієвої та плівки поліхлорвінілової; по 1 блістеру в картонній пачці; по 10 таблеток в алюмінієвому блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 10 таблеток в алюмінієвому блістері; по 2 блістери в картонній пачці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед (повний цикл виробництва)/ТОВ "МАРІФАРМ" (повний цикл виробництва)	Індія/ Словенія	UA/3088/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1337	КОМБІСПАЗМ® ГАСТРОКОМФОРТ	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у блістері з плівки алюмінієвої та фольги алюмінієвої; по 1 або 2 блістери у пачці з картону	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/15710/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1338	КОМБІЦИТРОН	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 13,60 г в саше; по 10 саше у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/19918/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1339	КОМПЛЕВІТ®	Comb drug	капсули тверді по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/2090/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1340	КОНВАЛІЙНО-ВАЛЕРІАНОВІ КРАПЛІ	Comb drug	краплі оральні, по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону; по 25 мл у флаконах-крапельницях	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8636/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1341	КОНТРАКТУБЕКС	Comb drug	гель, по 10, 20 або 50 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Мерц Фармасьютікалс ГмбХ	Німеччина	Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КГаА (Продукція in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/Престіж Промоушн Веркауфсфоердерунг & Вербесервіс ГмбХ (вторинне пакування)/Лабораторі фо Аналізіс оф Біолоджикаллі Ектів Компоундс Латвіан Інстітьют оф Органік Сінтезіс (Випробування контролю якості)/Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (Випробування контролю якості)/ДЕЛФ-і ГмбХ (Випробування контролю якості)/ГБА Фарма ГмбХ (Випробування контролю якості)	Німеччина / Німеччина /Латвія/ Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/6090/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності після першого розкриття: 6 місяців.

1342	КОНТРАПІЛ®	Myramistin*	супозиторії вагінальні, по 0,015 г, по 5 супозиторіїв в блістері, по 1 блістеру в пачці з картону	Колективне науково впроваджувальне мале підприємство "Існа"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/19545/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1343	КОНТРАХІСТ АЛЕРДЖІ®	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 7 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	АТ "Адамед Фарма"	Польща	АТ "Адамед Фарма" (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)	Польща	UA/15823/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.
1344	КОПАЦИЛ®	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 6 або 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/2930/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1345	КОРВАЛАЗИД	Barbiturates in combination with other drugs	краплі оральні по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16296/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1346	КОРВАЛДИН®	Barbiturates in combination with other drugs	краплі оральні, по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/2553/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1347	КОРВАЛКАПС	Barbiturates in combination with other drugs	капсули м'які; по 9 капсул у блістерах; по 9 капсул у блістері; по 2 або 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/13448/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1348	КОРВАЛКАПС ЕКСТРА	Barbiturates in combination with other drugs	капсули тверді, по 10 капсул у блістерах; по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/13729/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1349	КОРВАЛМЕНТ®	Validol*	капсули м'які по 100 мг; по 10 капсул у блістерах; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці; по 20 капсул у блістері; по 1 або по 3, або по 4 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/3969/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1350	КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ®	Barbiturates in combination with other drugs	краплі оральні, розчин по 25 мл або по 40 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (пакування із in bulk фірми-виробника ТОВ "Фармхім", Україна)	Україна	UA/14817/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1351	КОРВАЛОЛ®	Barbiturates in combination with other drugs	капсули м'які по 10 капсул у блістері; по 1 або по 3 блістери в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/2554/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1352	КОРВАЛОЛ®	Barbiturates in combination with other drugs	краплі оральні по 25 мл або по 50 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/2554/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1353	КОРВАЛОЛ®	Barbiturates in combination with other drugs	таблетки; по 10 таблеток у блістері; по 1, 3 або 5 блістерів у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/2554/02/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

1354	КОРВАЛОЛ® К	Comb drug	капсули м'які по 10 капсул у блістері; по 1 або по 3 блістери у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/14667/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1355	КОРВАЛОЛ® Н	Comb drug	краплі оральні по 25 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/3684/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1356	КОРВАЛТАБ	Barbiturates in combination with other drugs	таблетки; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 2 та 10 блістерів у пачці з картону	ТОВ "АСІНО УКРАЇНА"	Україна	ТОВ "Фарма Старт"	Україна	UA/1028/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1357	КОРВАЛТАБ ЕКСТРА	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній пачці	ТОВ "АСІНО УКРАЇНА"	Україна	ТОВ "Фарма Старт"	Україна	UA/14729/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1358	КОРИЧКА	Mono	настойка по 50 мл або по 100 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/19476/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1359	КОРНЕРЕГЕЛЬ ®	Dexpanthenol	гель очний, 50 мг/г, по 5 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВ "БАУШ ХЕЛС"	Україна	Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ	Німеччина	UA/8545/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття вміст туби слід використати протягом щонайбільше 6 тижнів.

1360	КОФАЛЬГІН	Metamizole sodium, combinations excl. psycholeptics	таблетки; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФАРМ"	Україна/ Україна	UA/3620/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1361	КРАЛОНІН	Comb drug	краплі оральні по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/3125/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці!
1362	КРАПЛІ БЕРЕШ ПЛЮС®	Comb drug	краплі оральні; по 30 мл або 100 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в картонній коробці; по 30 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 4 флакони в картонній коробці	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	UA/9101/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Після першого відкриття флакона препарат придатний до застосування протягом 6 місяців.

1363	КРАПЛІ БЕРЕШ® ЕКСТРА	Comb drug	краплі оральні, розчин, по 30 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 або по 4 флакони у картонній коробці; по 100 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону у картонній коробці; по 30 мл у флаконі, по 1 або по 4 флакони у комплекті з окремим дозуючим насосом у картонній коробці; по 100 мл у флаконі по 1 флакону у комплекті з окремим дозуючим насосом у картонній коробці	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	UA/16660/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1364	КРАПЛІ ВІД КАШЛЮ ПУЛЬМО	Butamirate	краплі оральні, розчин 5 мг/мл по 20 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону у коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс", Україна (виробництво з продукції in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я", Україна)	Україна	UA/15904/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1365	КРАПЛІ ЗЕЛЕНІНА	Comb drug	краплі оральні по 25 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/7361/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

1366	КРАТАЛ	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці; по 60 або по 90 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/3866/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
1367	КРАТАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону; по 90 таблеток у контейнерах; по 90 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/12660/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1368	КРАТАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону; по 90 таблеток у контейнерах; по 90 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/12660/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1369	КРЕАЗИМ 10000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули тверді, кишковорозчинні, по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці із картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/2822/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1370	КРЕАЗИМ 20000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули тверді, кишковорозчинні, по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці із картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/2822/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1371	КРЕОН® 10000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули тверді з гастрорезистентними гранулами по 150 мг; по 20 або 50, або 100 капсул у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці; по 10 капсул у блістері; по 1 або 2, або 3 блістери в картонній коробці	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	UA/9842/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у щільно закритій упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого розкриття – 6 місяців.
1372	КРЕОН® 25000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули тверді з гастрорезистентними гранулами по 300 мг по 20 або 50, або 100 капсул у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці; по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	UA/9842/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С у щільно закритій упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого розкриття – 6 місяців.
1373	КРЕОН® 40000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули тверді з гастрорезистентними гранулами по 400 мг по 20 або 50, або 100 капсул у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці; по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	UA/9842/01/03	Зберігати при температурі не вище 25 °С у щільно закритій упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого розкриття – 6 місяців.

1374	КРЕОН®ЧИК	Multienzymes (lipase, protease etc.)	гастрорезистентні гранули, по 60,12 мг/100 мг; по 20 г гранул у скляній пляшці; по 1 пляшці з мірною ложкою у картонній коробці	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	Абботт Лабораторіз ГмбХ	Німеччина	UA/15046/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у щільно закритій упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1375	КРОМОФАРМ®	Cromoglicic acid	спрей назальний 2 % по 15 мл у флаконі, забезпеченому насосом-дозатором з розпилювачем; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/0885/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1376	КРОПИВИ ЛИСТЯ	Urtica dioica**	листя по 50 г в пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/14074/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1377	КРОПИВИ ЛИСТЯ	Urtica dioica**	листя по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2127/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.
1378	КРОПУ ПАХУЧОГО ПЛОДИ	Anethum graveolens**	плоди по 50 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/5975/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1379	КРОПУ ПАХУЧОГО ПЛОДИ	Anethum graveolens**	плоди по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 3 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2257/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

1380	КРУШИНИ КОРА	Frangula alnus**	кора по 50 г або по 100 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2128/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений відвар (настій) – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.
1381	КСИЛАЗОЛ	Comb drug	спрей назальний, розчин; по 10 мл у флаконі з розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18500/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат можна використовувати протягом 12 тижнів.
1382	КСИЛАЗОЛ-КІДС	Comb drug	спрей назальний, розчин; по 10 мл у флаконі з розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18501/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат можна використовувати протягом 12 тижнів.
1383	КСИЛО-ТЕВА	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,5 мг/мл; по 10 мл у скляному флаконі з дозатором; по 1 флакону у картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (дільниця, яка відповідає за виробництво препарату in bulk, пакування та випуск серій); (дільниця, яка відповідає за контроль якості)	Німеччина	UA/8161/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона – 1 рік.

1384	КСИЛО-ТЕВА	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 1 мг/мл по 10 мл у скляному флаконі з дозатором; по 1 флакону у картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (дільниця, яка відповідає за виробництво препарату in bulk, пакування та випуск серій); (дільниця, яка відповідає за контроль якості)	Німеччина	UA/8161/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона – 1 рік.
1385	КСИЛОМЕТАЗОЛІН	Xylometazoline	гель назальний, 1 мг/г по 10 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/12577/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1386	КСИЛОНЕКС	Xylometazoline	спрей назальний, розчин дозований, 1 мг/мл по 10 мл у полімерному флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/19571/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1387	КСИЛОРІФ	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 0,1 %, по 10 мл у флаконах скляних з розпилювачем назальним або флаконах полімерних з розпилювачем назальним, по 1 флакону у пачці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОЦЕВТИКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/20675/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1388	КУКУРУДЗИ СТОВПЧИКИ З ПРИЙМОЧКАМИ	Zea mays**	стовпчики із приймочками по 30 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2477/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.
1389	КУПЛАТОН	Silicones	краплі оральні (300 мг/мл), по 30 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	Оріон Корпорейшн	Фінляндія	Оріон Корпорейшн/Квінта - Аналітіка с.р.о. (альтернативний виробник, що здійснює контроль якості (тільки Кількісний вміст та Ідентифікація))	Фінляндія/Чеська Республіка	UA/7479/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Використати протягом 3 місяців після розкриття флакона.
1390	КУЧИКУ® НАЗАЛЬ	Xylometazoline	краплі назальні, розчин 0,05 %, по 10 мл у флаконі з назальним аплікатором, по 1 флакону в картонній упаковці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Біофарм СА (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Біофарм С.А. (контроль серії (фізико-хімічний та мікробіологічний контроль))	Румунія/Румунія	UA/18502/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1391	ЛАЗИН	Levocetirizine	розчин оральний 2,5 мг/5 мл по 148 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці	Гетеро Лабз Лімітед	Індія	Гетеро Лабз Лімітед	Індія	UA/17410/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1392	ЛАЗИН	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Гетеро Лабз Лімітед	Індія	Гетеро Лабз Лімітед	Індія	UA/17410/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1393	ЛАЗОЛВАН®	Ambroxol	розчин для інгаляцій та перорального застосування, 15 мг/2 мл; по 100 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону у комплекті з мірним ковпачком в картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Істітуто де Анжелі С.р.л.	Італія	UA/3430/06/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у місці, недоступному для дітей!
1394	ЛАЗОЛВАН® З ПОЛУНИЧНО-ВЕРШКОВИМ СМАКОМ	Ambroxol	сироп, 30 мг/5 мл, по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті з пластиковим мірним ковпачком у картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Дельфарм Реймс/Берінгер Інгельхайм Еспана, СА	Франція/ Іспанія	UA/13771/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у місці, недоступному для дітей. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності після першого відкривання флакона – 6 місяців.
1395	ЛАЗОЛВАН® З ПОЛУНИЧНО-ВЕРШКОВИМ СМАКОМ	Ambroxol	сироп, 30 мг/5 мл, по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті з пластиковим мірним ковпачком у картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Дельфарм Реймс/Берінгер Інгельхайм Еспана, СА	Франція/ Іспанія	UA/13771/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у місці, недоступному для дітей. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності після першого відкривання флакона – 6 місяців.
1396	ЛАЗОЛЕКС	Ambroxol	розчин для інгаляцій та перорального застосування, 7,5 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 2 мл в ампулі; по 4 мл в ампулі; по 5, по 10 або по 20 ампул у пачці з картону	ТОВ "ФАРМАСЕЛ"	Україна	ТОВ "ФАРМАСЕЛ"	Україна	UA/12750/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1397	ЛАЗОРИН®	Tramazoline	спрей назальний, 1,18 мг/мл; по 10 мл у скляному балончику з дозуючим пристроєм; по 1 балончику в картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Істітуто де Анжелі С.р.л./Юнітер Ліквід Мануфекчурінг	Італія/ Франція	UA/3590/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у місці, недоступному для дітей. Термін придатності після відкриття упаковки - 12 місяців.
1398	ЛАКТІОЛ-ІСТОК®	Lactitol	порошок для орального застосування; по 5 г у саше, по 20 саше у картонній коробці; по 10 г у саше, по 15 саше у картонній коробці; по 200 г у контейнері пластмасовому; по 500 г у контейнері пластмасовому	Товариство з обмеженою відповідальністю "Исток-Плюс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Исток-Плюс"	Україна	UA/19081/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1399	ЛАКТОВІТ ФОРТЕ	Lactic acid producing organisms, combinations	капсули по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці; по 7 капсул у блістері; по 2 або по 4 блістери в картонній коробці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Мепро Фармасьютикалс Пріват Лімітед	Індія	UA/0160/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
1400	ЛАКТУВІТ®	Lactulose	сироп, 3,335 г/5 мл по 100 мл або 200 мл у флаконах полімерних; по 1 флакону в пачці* з картону *(можливе додаткове вкладання в пачку мірного пристрою)	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	UA/12566/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Розкритий флакон зберігати не більше 30 діб при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1401	ЛАКТУЛОЗА	Lactulose	сироп, 670 мг/мл, по 100 мл у флаконах полімерних з кришкою з контролем першого відкриття; по 1 флакону з дозуючим пристроєм у картонній коробці; по 200 мл у флаконах полімерних з кришкою з контролем першого відкриття; по 1 флакону з мірним стаканчиком у картонній коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk виробника Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія)	Україна	UA/16601/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1402	ЛАКТУЛОЗА	Lactulose	сироп, 670 мг/мл; по 200 мл або по 300 мл або по 500 мл у флаконі; по 1 флакону з дозуючою скляночкою в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/20039/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати в зв’язку зі здатністю лактулози до кристалізації. Термін придатності після відкриття флакона — 2 місяці при температурі не вище 25 °С.
1403	ЛАКТУНОРМ®	Lactulose	сироп, 670 мг/мл, по 100 мл або по 200 мл, або по 500 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (виробництво з продукції in bulk виробника Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія)	Україна	UA/17762/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1404	ЛАМІДЕРМ	Terbinafine	крем, 10 мг/г; по 15 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед	Індія	Індоко Ремедіс Лімітед	Індія	UA/1679/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1405	ЛАМІКОН®	Terbinafine	крем 1 %, по 15 г у тубі; по 1 тубі у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/2714/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Заморожування препарату не допускається. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1406	ЛАМІКОН®	Terbinafine	спрей нашкірний 1 % по 25 г у флаконі з насосом-дозатором; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/2714/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Заморожування не допускається. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1407	ЛАМІКОН® ДЕРМГЕЛЬ	Terbinafine	гель 1 % по 15 г або 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/2714/04/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Заморожування не допускається. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1408	ЛАМІСКІН	Terbinafine	спрей нашкірний, розчин, 10 мг/г, по 30 мл розчину у полімерному флаконі зі спрей-насосом з розпилювачем, по 1 флакону у пачці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/20427/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1409	ЛАМІФЕН®	Terbinafine	гель 1 %, по 15 г або по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/6136/02/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1410	ЛАМІФЕН®	Terbinafine	гель 1 %, по 15 г або по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/6136/02/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1411	ЛАНГЕС	Carbocisteine	розчин оральний, 50 мг/мл, по 60 мл в контейнері; по 1 контейнеру з дозуючим шприцом у пачці з картону; по 200 мл в контейнері; по 1 контейнеру з мірним стаканчиком у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/11561/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності розчину після відкриття контейнера – 12 місяців.
1412	ЛАРГІНУС	Arginine aspartate*	розчин оральний, 200 мг/мл по 100 мл у банці або по 200 мл у флаконі; по 1 банці або по 1 флакону з мірною ложкою у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/20455/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Термін придатності після розкриття банки — 14 діб.

1413	ЛАРИТИЛЕН®	Comb drug	таблетки для розсмоктування зі смаком м`яти та лимону; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2 або 4 блістери у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/16644/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1414	ЛАРИТИЛЕН®	Comb drug	таблетки для розсмоктування зі смаком м`яти та малини; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2 або 4 блістери у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/16645/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1415	ЛАРИТИЛЕН®	Comb drug	таблетки для розсмоктування зі смаком м`яти; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2 або 4 блістери у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/16643/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1416	ЛАРНАМІН®	Ornithine*	гранули для орального розчину, 3 г/5 г, по 5 г в саше, по 10 або 30 саше у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/13304/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1417	ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я	Levamisole	таблетки по 150 мг; по 1 таблетці у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/6389/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1418	ЛЕВЗІРІН	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у картонній коробці	Мега Лайфсайенсіз (Австралія) Пті Лтд	Австралія	Гетеро Лабз Лімітед	Індія	UA/15776/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1419	ЛЕВОМЕКОЛЬ	Comb drug	мазь по 25 г або 40 г у тубах; по 25 г або 40 г або по 100 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/2647/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1420	ЛЕВОМЕКОЛЬ	Comb drug	мазь по 25 г у контейнерах; по 30 г, або по 40 г у тубах алюмінієвих; по 30 г, або по 40 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у картонній пачці ; по 20 г у тубах алюмінієвих; по 20 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у картонній пачці; по 20 г, по 30 г або по 40 г у тубах ламінатних; по 20 г, по 30 г або по 40 г у тубі ламінатній; по 1 тубі в картонній пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0867/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, не допускати заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1421	ЛЕВОМЕКОЛЬ	Comb drug	мазь по 25 г у контейнерах; по 30 г, або по 40 г у тубах алюмінієвих; по 30 г, або по 40 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у картонній пачці; по 20 г у тубах алюмінієвих; по 20 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у картонній пачці; по 20 г, по 30 г або по 40 г у тубах ламінатних; по 20 г, по 30 г або по 40 г у тубі ламінатній; по 1 тубі в картонній пачці; по 50 г у тубах алюмінієвих; по 50 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у картонній пачці; по 50 г або по 100 г у тубах ламінатних; по 50 г або по 100 г у тубі ламінатній; по 1 тубі у картонній пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0867/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, не допускати заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1422	ЛЕВОМЕКОЛЬ	Comb drug	мазь; по 40 g (г) у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8436/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1423	ЛЕВОМЕКОЛЬ	Comb drug	мазь; по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/1197/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1424	ЛЕВОМІЦЕТИН-ОЗ	Chloramphenicol	краплі очні, 2,5 мг/мл по 5 мл або по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з кришкою-крапельницею у пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/13220/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін зберігання розчину після розкриття флакону 15 діб.
1425	ЛЕВОМІЦЕТИН У РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 0,25 %	Chloramphenicol	розчин нашкірний, спиртовий 0,25 % по 25 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8046/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1426	ЛЕВОМІЦЕТИН У РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 0,25 %	Chloramphenicol	розчин нашкірний, спиртовий 0,25 % по 25 мл у флаконах	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8046/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1427	ЛЕВОМІЦЕТИН У РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 1 %	Chloramphenicol	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 25 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці з картону; по 25 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками; по 25 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою, по 1 флакону в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/8211/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1428	ЛЕВОСЕТИЛ	Levocetirizine	краплі оральні, розчин, 5 мг/мл, по 20 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18085/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона лікарський засіб можна використовувати протягом 3 місяців.

1429	ЛЕВОСЕТИЛ	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 2, 3, 4 блістери у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18085/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1430	ЛЕВОСЕТИЛ	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2, 3, 4 блістери у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18085/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1431	ЛЕВОСИН	Comb drug	мазь по 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8326/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1432	ЛЕГКОЛАКС	Macrogol	порошок для орального розчину по 10,0 г; виробник ПАТ "Київмедпрепарат": по 10 г в пакеті-саше; по 4 або 10 або 20 пакетів-саше у пачці; по 300 г у банці; по 1 банці з мірною ложкою в пачці. Виробник ТОВ «МАРІФАРМ»: по 10 г в пакеті-саше; по 4 або 10 або 20 пакетів-саше у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат" /ТОВ "МАРІФАРМ"	Україна/ Словенія	UA/15646/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Для упаковки у банках: після першого відкриття зберігати у щільно закрученій банці.

1433	ЛЕГКОЛАКС	Macrogol	порошок для орального розчину по 10,0 г; по 10 г в пакеті-саше; по 4 або 10 або 20 пакетів-саше у пачці; по 300 г у банці; по 1 банці з мірною ложкою в пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/15646/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Для упаковки у банках: після першого відкриття зберігати у щільно закрученій банці.
1434	ЛЕГКОЛАКС	Macrogol	порошок для орального розчину по 4,0 г; Виробник ПАТ "Київмедпрепарат": по 4 г в пакеті-саше; по 4 або 10 або 20 пакетів-саше у пачці; по 150 г у банці; по 1 банці з мірною ложкою в пачці. Виробник ТОВ «МАРІФАРМ»: по 4 г в пакеті-саше; по 4 або 10 або 20 пакетів-саше у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат" /ТОВ "МАРІФАРМ"	Україна/ Словенія	UA/15646/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Для упаковки у банках: після першого відкриття зберігати у щільно закрученій банці.
1435	ЛЕГКОЛАКС	Macrogol	порошок для орального розчину по 4,0 г; по 4 г в пакеті-саше; по 4 або 10 або 20 пакетів-саше у пачці; по 150 г у банці; по 1 банці з мірною ложкою в пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/15646/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Для упаковки у банках: після першого відкриття зберігати у щільно закрученій банці.

1436	ЛЕДІСЕПТ-ФАРМЕКС	Chlorhexidine	песарії по 16 мг по 5 песаріїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/12023/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1437	ЛЕПЕХИ КОРЕНЕВИЩА	Acorus calamus**	кореневища по 30 г або по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/9367/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.
1438	ЛЕПЕХИ КОРЕНЕВИЩА	Acorus calamus**	кореневища по 30 г, або по 75 г, або по 100 г у пачці з внутрішнім пакетом, по 1,5 г в фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/5771/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1439	ЛЕПЕХИ КОРЕНЕВИЩА	Acorus calamus**	кореневища по 50 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2129/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1440	ЛЕСПЕНЕФРИЛ -ЛУБНИФАРМ	Lespedeza bicolor**	розчин оральний по 100 мл у флаконах у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/19188/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1441	ЛЕСПЕФРИЛ	Lespedeza bicolor**	розчин оральний по 100 мл у флаконі або у банці; по 1 флакону або банці в пачці	ТОВ "Сумифітофармація"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/10830/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1442	ЛИМОНТАР	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 5 г у саше, по 10 або по 30 саше у коробці з картону	ТОВ "Астрафарм"	Україна	ТОВ "Астрафарм"	Україна	UA/20441/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1443	ЛИПИ КВІТКИ	Tilia**	квітки по 40 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6598/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.
1444	ЛІВАГІН-М®	Ketoconazole	песарії по 400 мг; по 5 песаріїв у стрипі; по 1 або 2 стрипи в пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/13883/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1445	ЛІВАРОЛ	Ketoconazole	песарії по 400 мг, по 5 песаріїв у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	ДП "СТАДА-УКРАЇНА"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/17172/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1446	ЛІВЕРІЯ® ІС	Metadoxine	таблетки по 0,5 г, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/13164/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1447	ЛІДОКСАН ЛИМОН	Comb drug	льодяники, 5 мг/1 мг; по 12 льодяників у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Сандоз Україна"	Україна	Лек фармацевтична компанія д.д. (випуск серій)/Лабораторіа Кваліфар НВ (Кваліфар НВ) (виробництво за повним циклом)	Словенія/ Бельгія	UA/16168/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1448	ЛІДОКСАН ЛИМОН СПРЕЙ	Comb drug	спрей для ротової порожнини, 2 мг/0,5 мг на 1 мл; по 30 мл у флаконі, по 1 флакону в коробці	ТОВ "Сандоз Україна"	Україна	Лек Фармацевтична компанія д.д. (випуск серій)/Лабораторіа Кваліфар НВ (Кваліфар НВ) (виробництво за повним циклом)	Словенія/ Бельгія	UA/16227/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1449	ЛІДОКСАН МЕНТОЛ	Comb drug	льодяники, 5 мг/1 мг по 12 льодяників у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Сандоз Україна"	Україна	Лек Фармацевтична компанія д.д. (випуск серій)/Лабораторіа Кваліфар НВ (Кваліфар НВ) (виробництво за повним циклом)	Словенія/ Бельгія	UA/16208/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1450	ЛІДОКСАН МЕНТОЛ СПРЕЙ	Comb drug	спрей для ротової порожнини, 2 мг/0,5 мг на 1 мл; по 30 мл у флаконі; по 1 флакону в коробці	ТОВ "Сандоз Україна"	Україна	Лек Фармацевтична компанія д.д. (випуск серій)/Лабораторіа Кваліфар НВ (Кваліфар НВ) (виробництво за повним циклом)	Словенія/ Бельгія	UA/16228/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1451	ЛІДОКСАН® МЕД	Comb drug	льодяники, 5 мг/1 мг, 12 льодяників в блістері, по 2 блістери в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Лек Фармацевтична компанія д.д. (випуск серій)/Лабораторіа Кваліфар НВ (Кваліфар НВ) (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серій)	Словенія/ Бельгія	UA/18785/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1452	ЛІДОКСАН® МЕД	Comb drug	льодяники, 5 мг/1 мг; 12 льодяників в блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Лек фармацевтична компанія д.д. (випуск серій)/Лабораторіа Кваліфар НВ (Кваліфар НВ) (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серій)	Словенія/ Бельгія	UA/18785/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1453	ЛІДОКСАН® ПОЛУНИЦЯ	Comb drug	льодяники, 5 мг/1 мг; 12 льодяників в блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Лек Фармацевтична компанія д.д. (випуск серій)/Лабораторіа Кваліфар НВ (Кваліфар НВ) (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серій)	Словенія/ Бельгія	UA/18801/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1454	ЛІДОКСАН® ПОЛУНИЦЯ	Comb drug	льодяники, 5 мг/1 мг; 12 льодяників в блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Лек Фармацевтична компанія д.д. (випуск серій)/Лабораторіа Кваліфар НВ (Кваліфар НВ) (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серій)	Словенія/ Бельгія	UA/18801/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1455	ЛІЗАК®	Comb drug	таблетки для смоктання зі смаком анісу і м'яти: по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці; по 6 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці; по 10 таблеток у блістері; по 1або 4 блістери в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/10649/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1456	ЛІЗАК®	Comb drug	таблетки для смоктання зі смаком апельсину по 6 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2 або 4 блістери в пачці.	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/10651/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1457	ЛІЗАК®	Comb drug	таблетки для смоктання зі смаком малини по 10 таблеток у блістері, по 1, 2 або 4 блістери в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16033/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1458	ЛІЗАК®	Comb drug	таблетки для смоктання зі смаком шоколаду; по 6 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2 або 4 блістери в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/10650/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1459	ЛІМФОМІОЗОТ	Comb drug	краплі оральні по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/6673/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
1460	ЛІНЕКС БЕБІ®	Lactic acid producing organisms	порошок для оральної суспензії, 1 000 000 000 КУО/пакет; по 1,5 г у пакеті; по 10 або 20 пакетів в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Лек Фармацевтична компанія д.д. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування; контроль та випуск серії; контроль серії)	Словенія	UA/14576/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1461	ЛІНЕКС ФОРТЕ®	Lactic acid producing organisms	капсули тверді; по 7 капсул у блістері; по 1 або 2, або 4 блістери у картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Лек Фармацевтична компанія д. д. (виробництво in bulk, пакування; випуск серії)	Словенія	UA/14763/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1462	ЛІНЕКС®	Lactic acid producing organisms	капсули тверді, по 32 капсули у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці; по 8 капсул у блістері; по 2, або по 4; або по 6 блістерів у картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Лек Фармацевтична компанія д.д. (виробництво in bulk, пакування; випуск серії)	Словенія	UA/14267/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати флакон щільно закритим (для капсул у флаконі). Зберігати в недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона – 4 місяці (для капсул у флаконі).
1463	ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ)	Comb drug	лінімент по 25 г у тубах; по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8731/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1464	ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ)	Comb drug	лінімент по 40 г у тубах; по 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/0228/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1465	ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ)	Comb drug	лінімент по 40 г у тубах; по 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/0228/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1466	ЛІНКАС	Comb drug	сироп по 90 мл, або 120 мл, або 150 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/7815/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1467	ЛІНКАС БЕЗ ЦУКРУ	Comb drug	сироп по 90 мл або 120 мл або 150 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/10374/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1468	ЛІНКАС ПАСТИЛКИ	Comb drug	пастилки зі смаком апельсина; по 8 пастилок у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/9890/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1469	ЛІНКАС ПАСТИЛКИ	Comb drug	пастилки зі смаком м'яти, по 8 пастилок у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/9889/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1470	ЛІНКАС ПАСТИЛКИ	Comb drug	пастилки зі смаком меду та лимона; по 8 пастилок у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/9888/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1471	ЛІНКАС ПЛЮС ЕКСПЕКТОРАНТ	Comb drug	сироп по 120 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці картонній	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/10961/01/01	Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1472	ЛІОГЕЛЬ 1000	Heparin	гель для зовнішнього застосування по 30 г, або по 50 г, або по 100 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/5922/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1473	ЛІОГЕЛЬ 1000	Heparin	гель для зовнішнього застосування, по 30 г або по 50 г, або по 100 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	Приватне акціонерне товариство Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/5922/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1474	ЛІОТОН® 1000 ГЕЛЬ	Heparin	гель, 1000 МО/г по 30 г, 50 г або 100 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	А. МЕНАРІНІ Індустріє Фармацеутиче Ріуніте С.р.Л.	Італія	А.Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л.	Італія	UA/10905/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття – 6 місяців.
1475	ЛІОТРОМБ 1000-ЗДОРОВ’Я	Heparin	гель, 1000 МО/г; по 25 г, 50 г або 100 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/11418/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1476	ЛІПСТЕР®	Aciclovir	крем 5 % по 5 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/1325/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1477	ЛІПСТЕР® МІНТ	Aciclovir	крем 5 % по 5 г у тубі; по 1 тубі у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/19355/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1478	ЛІСОБАКТ ДУО®	Comb drug	льодяники пресовані, по 10 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	UA/17498/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1479	ЛІСОБАКТ ДУО® СПРЕЙ З АРОМАТОМ М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ	Comb drug	спрей оромукозний, розчин по 30 мл у флаконі з темного скла з насосом-розпилювачем та аплікатором, по 1 флакону у картонній коробці	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	UA/18997/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1480	ЛІСОБАКТ КОМПЛІТ СПРЕЙ®	Comb drug	спрей оромукозний, розчин по 30 мл у флаконі з темного скла з насосом-розпилювачем та аплікатором; по 1 флакону у картонній коробці	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	UA/18160/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1481	ЛІСОБАКТ КОМПЛІТ СПРЕЙ®	Comb drug	спрей оромукозний, розчин; по 30 мл у флаконі з темного скла з насосом-розпилювачем та аплікатором; по 1 флакону у картонній коробці	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	UA/18160/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1482	ЛОМА ЛЮКС ПСОРІАЗ	Comb drug	розчин оральний, по 237 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній пачці	Лома Люкс Лебореторіз	США	Апотека Інк.	США	UA/2679/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1483	ЛОМЕКСИН®	Fenticonazole	капсули вагінальні м’які по 200 мг по 3 або по 6 капсул у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці	Рекордаті Аіленд Лтд	Ірландія	Каталент Італі С.п.А.	Італія	UA/6094/01/02	Зберігати при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1484	ЛОМЕКСИН®	Fenticonazole	капсули вагінальні м’які по 600 мг по 1 або по 2 капсули у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці	Рекордаті Аіленд Лтд	Ірландія	Каталент Італі С.п.А.	Італія	UA/6094/01/01	Зберігати при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1485	ЛОМЕКСИН®	Fenticonazole	крем 2 % по 30 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Рекордаті Аіленд Лтд	Ірландія	Рекордаті Індастріа Хіміка е Фармасевтіка С.п.А./ВАМФАРМА С.Р.Л.	Італія/ Італія	UA/6094/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1486	ЛОМЕКСИН®	Fenticonazole	крем вагінальний 2 %; по 78 г крему у тубі; по 1 тубі у комплекті з аплікатором у контейнері; по 1 контейнеру в картонній коробці	Рекордаті Аіленд Лтд	Ірландія	Рекордаті Індастріа Хіміка е Фармасевтіка С.п.А./ВАМФАРМА С.Р.Л.	Італія/ Італія	UA/6094/03/01	Зберігати при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Придатний до використання після першого розкриття протягом 30 днів.
1487	ЛОПЕДІУМ®	Loperamide	капсули тверді по 2 мг; по 6 капсул у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Сандоз Фармасьютікалз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ (виробництво in bulk, пакування, випуск серії)/Лек С.А. (пакування, випуск серії)/Сандоз С.Р.Л. (виробництво за повним циклом)	Німеччина /Польща/ Румунія	UA/9738/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1488	ЛОПЕРАМІД	Loperamide	таблетки по 0,002 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2, або 50, або 100 блістерів у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"/ПрАТ "Технолог"	Україна/ Україна	UA/6919/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1489	ЛОПЕРАМІД	Loperamide	таблетки по 2 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат" /ТОВ "МАРІФАРМ"	Україна/ Словенія	UA/7581/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1490	ЛОПЕРАМІД-ЗДОРОВ`Я	Loperamide	таблетки по 2 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/1674/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1491	ЛОПЕРАМІД ГРІНДЕКС	Loperamide	капсули тверді по 2 мг по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ "Гріндекс"	Латвія	UA/6390/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1492	ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД	Loperamide	капсули по 2 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2 блістери в коробці з картону; по 10 капсул у блістері	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"	Україна	UA/6599/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1493	ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД "ОЗ"	Loperamide	таблетки по 2 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2, або 3 блістери в пачці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна/ Україна	UA/8232/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1494	ЛОРАНГІН	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 100 мл, 120 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/17765/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1495	ЛОРАНГІН	Comb drug	спрей для ротової порожнини; по 50 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/14801/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 0С.

1496	ЛОРАНГІН® ХЛОРГЕКСИДИН З ВІТАМІНОМ С	Comb drug	таблетки для застосування у ротовій порожнині; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/5655/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1497	ЛОРАСЕЙВ®	Comb drug	таблетки для розсмоктування, по 10 таблеток у блістері, по 1 або 3 блістери в пачці	ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/18557/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1498	ЛОРАСЕЙВ®	Comb drug	таблетки для розсмоктування, по 10 таблеток у блістері, по 1 або 3 блістери у пачці	ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/18557/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1499	ЛОРАТАДИН	Loratadine	сироп, 1 мг/мл, по 90 мл у флаконі або у банці; по 1 флакону або по 1 банці з дозуючою скляночкою в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/9333/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1500	ЛОРАТАДИН	Loratadine	таблетки по 0,01 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці з картону; по 10 таблеток у блістері, по 50 або 100 блістерів в пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"/ПрАТ "Технолог"	Україна/ Україна	UA/4033/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1501	ЛОРАТАДИН	Loratadine	таблетки по 0,01 г по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/5404/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1502	ЛОРАТАДИН	Loratadine	таблетки по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/7014/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1503	ЛОРАТАДИН	Loratadine	таблетки по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2, 9 або по 10 блістерів в коробці з картону	ТОВ "Астрафарм"	Україна	ТОВ "Астрафарм"	Україна	UA/2610/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1504	ЛОРАТАДИН-ДАРНИЦЯ	Loratadine	таблетки по 10 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/2191/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1505	ЛОРАТАДИН-ЗДОРОВ'Я	Loratadine	сироп, 5 мг/5 мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в коробці з картону; по 5 мл або 10 мл у саше; по 20 саше у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров’я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/0100/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1506	ЛОРАТАДИН-ЗДОРОВ'Я	Loratadine	таблетки по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/0100/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1507	ЛОРАТАДИН-СТОМА	Loratadine	таблетки по 10 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці, по 20 таблеток у банці полімерній, по 1 банці у пачці	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/8394/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С.
1508	ЛОРАТЕК®	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,05 %; по 10 г у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону у пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/17398/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1509	ЛОРАТЕК®	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,05 %; по 10 г у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону у пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	ТОВ "Мікрофарм" (виробництво, пакування, контроль якості)/ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (випуск серії)	Україна/ Україна	UA/17398/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1510	ЛОРГЕКС	Comb drug	спрей для ротової порожнини по 50 мл у флаконі скляному, по 1 флакону разом з пульверизатором у пачці	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/19971/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1511	ЛОРГЕКС	Comb drug	спрей для ротової порожнини; по 50 мл у флаконі скляному або полімерному, укупореному пульверизатором, по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконі скляному або полімерному, укупореному кришкою, по 1 флакону разом з пульверизатором в пачці	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/19971/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1512	ЛОРДЕС®	Desloratadine	сироп 2,5 мг/5 мл по 150 мл у флаконі; по 1 флакону разом із пластиковою мірною ложкою в картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/11552/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після першого відкриття сироп зберігати протягом 6 місяців.
1513	ЛОРДЕС®	Desloratadine	таблетки вкриті оболонкою по 5 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1, 2 або 3 блістери у картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/11552/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1514	ЛОРДІФЕНС	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	ТзОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії, контроль якості)	Україна	UA/20819/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1515	ЛОРДІФЕНС	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	ТзОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії, контроль якості)	Україна	UA/20819/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1516	ЛОРДІФЕНС	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	ТзОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії, контроль якості)	Україна	UA/20819/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1517	ЛОРДІФЕНС	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	ТзОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії, контроль якості)	Україна	UA/20819/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1518	ЛОРИЗАН®	Loratadine	таблетки по 10 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/0905/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1519	ЛОРОЛІК	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 125 мл у банці; по 1 банці у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/15920/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1520	ЛОРОЛІК	Comb drug	спрей для ротової порожнини по 50 мл у флаконі з пульверизатором, по 1 флакону в пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/15920/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1521	ЛОРОСАН	Flores helianthi**	спрей оромукозний, розчин по 30 мл у флаконі з насосом-дозатором з розпилювачем; по 1 флакону у пачці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/12867/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1522	ЛОРОСАН	Flores helianthi**	спрей оромукозний, розчин по 30 мл у флаконі з насосом-дозатором з розпилювачем; по 1 флакону у пачці з картону	ТОВ "ГЕОЛІК ФАРМ МАРКЕТИНГ ГРУП"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/12867/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1523	ЛОРТУМ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20696/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1524	ЛОРТУМ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20696/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1525	ЛОРТУМ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20696/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1526	ЛОСПИРИН®	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою, по 75 мг по 10 таблеток у стрипі, по 3, по 8 або по 10 стрипів у картонній упаковці; по 30 таблеток у стрипі, по 1, або по 2, або по 3, або по 4 стрипи в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)/КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або вторинне пакування,	Україна/ Індія/ Україна	UA/9202/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1527	ЛОСПИРИН®	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою, по 75 мг; по 10 таблеток у стрипі, по 3, по 8 або по 10 стрипів у картонній упаковці; по 30 таблеток у стрипі, по 1, або по 2, або по 3, або по 4 стрипи в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)/КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або вторинне пакування,	Україна/ Індія/ Україна	UA/9202/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1528	ЛОФЛАТІЛ®	Loperamide, combinations	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці; по 10 таблеток у стрипі, по 1 стрипу у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці, по 10 упаковок у картонній коробці; по 10 таблеток у стрипі, по 1 стрипу у картонній упаковці, по 10 упаковок у картонній коробці; по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/7643/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1529	ЛОФЛАТІЛ®	Loperamide, combinations	таблетки, вкриті оболонкою; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці; по 10 таблеток у стрипі, по 1 стрипу у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці, по 10 упаковок у картонній коробці; по 10 таблеток у стрипі, по 1 стрипу у картонній упаковці, по 10 упаковок у картонній коробці; по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/7643/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1530	ЛЬОНУ НАСІННЯ	Linum**	насіння по 100 г або по 200 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2259/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1531	ЛЬОНУ НАСІННЯ	Linum**	насіння по 100 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8875/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений лікарський засіб не зберігати.
1532	ЛЬОНУ НАСІННЯ	Linum**	насіння по 100 г, 200 г у пачках з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/9368/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1533	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 г у флаконах; по 25 г у флаконах полімерних в комплекті з кришками; по 25 г у флаконах полімерних в комплекті з кришкою, по 1 флакону в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/8047/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1534	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування; по 25 г або по 50 г у флаконі скляному, укупореному пробкою та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 або по 50 г у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками; по 25 г або по 50 г у флаконі полімерному в комплекті з кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 або по 50 г у флаконах полімерних в комплекті з кришками; по 100 г у флаконі скляному, укупореному пробкою та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 100 г у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками; по 100 г у флаконі полімерному, укупореному насадкою та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 100 г у флаконах полімерних,	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/8047/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1535	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН	Comb drug	розчин по 25 г у флаконах; по 25 г у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8547/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1536	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН З ГЛІЦЕРИНОМ	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 25 г у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8255/01/01	Зберігати в оригінальній упаковц, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1537	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН З ГЛІЦЕРИНОМ	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 25 г у флаконах	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8255/01/01	Зберігати в оригінальній упаковц, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1538	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН З ГЛІЦЕРИНОМ	Comb drug	розчин оромукозний по 25 г у флаконах; по 25 г у флаконі, по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/0343/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1539	ЛЮГС	Iodine	розчин для зовнішнього застосування 1 % по 20 мл у контейнері або у флаконі з механічним розпилювачем, по 1 контейнеру або флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/5719/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1540	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ЛИСТЯ	Mentha piperita**	листя по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8285/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.
1541	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ЛИСТЯ	Mentha piperita**	листя по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 10 або по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2261/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.
1542	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ЛИСТЯ	Mentha piperita**	листя по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/5979/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.

1543	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ЛИСТЯ	Mentha piperita**	листя по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8876/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 оС до 15 оС не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці!
1544	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА	Mentha piperita**	настойка по 25 мл у флаконах скляних, укупорених пробками або пробками-крапельницями і кришками, або по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками-крапельницями і кришками, в пачці або без пачки; по 25 мл або 50 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями і кришками; по 25 мл або 50 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею і кришкою; по 1 флакону у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2261/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. При зберігання можливе випадання осаду.

1545	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА	Mentha piperita**	настойка по 25 мл у флаконі (скляному або полімерному) або у флаконі-крапельниці; по 1 флакону (скляному або полімерному) або 1 флакону-крапельниці в пачці з картону; по 25 мл у флаконах (скляних або полімерних) або у флаконах-крапельницях	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8483/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1546	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА	Mentha piperita**	настойка, по 25 мл у флаконах	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/19798/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1547	М'ЯТНІ ТАБЛЕТКИ	Mentha piperita**	таблетки по 0,0025 г, по 10 таблеток у блістерах	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8920/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1548	М'ЯТНІ ТАБЛЕТКИ	Mentha piperita**	таблетки по 2,5 мг по 10 таблеток у блістерах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8485/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1549	МАГНЕ-В6®	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою; № 60 (20х3): по 20 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	САНОФІ ВІНТРОП ІНДАСТРІА (виробництво, контроль якості, пакування, маркування, випуск серії)/Опелла Хелскеа Хангері Кфт. (виробництво, контроль якості, пакування, маркування, випуск серії)/ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Підприємство №3 (Підприємство в Чаніквельдь) (мікробіологічний контроль ГЛЗ)/ЄУРОАПІ Хангері Лтд. (мікробіологічний контроль ГЛЗ)	Франція/ Угорщина / Угорщина / Угорщина	UA/5476/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1550	МАГНЕ-В6® АНТИСТРЕС	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонко № 60 (20х3): по 20 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці; № 100 (20х5): по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів в картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Опелла Хелскеа Хангері Кфт. (виробництво за повним циклом)/ОПЕЛЛА ХЕЛСКЕА ІНТЕРНЕШНЛ САС (виробництво за повним циклом)/ЄУРОАПІ Хангері Лтд. (мікробіологічний контроль ГЛЗ)/ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Підприємство № 3 (Підприємство в Чаніквельдь) (мікробіологічний контроль ГЛЗ)	Угорщина / Франція/ Угорщина / Угорщина	UA/4130/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С.
1551	МАГНЕЛІС	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 15 таблеток у блістері; по 4 блістера у картонній коробці	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/20662/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1552	МАГНЕЛІС	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 15 таблеток у блістері; по 4 блістера у картонній коробці	ТОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/20662/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1553	МАГНЕМАКС-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	розчин оральний, по 10 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/16940/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1554	МАГНЕМАКС-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	розчин оральний, по 10 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/16940/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1555	МАГНЕМАКС-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/15597/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1556	МАГНЕФАР® В6	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній коробці	Біофарм Лтд	Польща	Біофарм Лтд	Польща	UA/2789/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1557	МАГНІКОР	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 10 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/11211/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1558	МАГНІКОР ФОРТЕ	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 або 10 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/11211/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1559	МАГНІКУМ	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні, по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/7038/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1560	МАГНІКУМ-АНТИСТРЕС®	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці; по 12 таблеток у блістері; по 4 або 5 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/16534/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1561	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	Magnesium sulfate	порошок для розчину для орального застосування по 25 г у контейнері або саше	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	UA/5775/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1562	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	Magnesium sulfate	порошок; по 25 г у контейнерах; по 10 г або по 25 г у пакетах	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0764/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1563	МАЗЬ ДР. ТАЙССА З ЖИВОКОСТОМ	Comb drug	мазь; по 20 г, 50 г або 100 г у банці; по 1 банці в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (дозвіл на випуск серії; виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)	Німеччина	UA/2333/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1564	МАКСІСОРБ	Silicium dioxide*	порошок для оральної суспензії; по 12 г у флаконі; по 1 флакону в пачці;, по 2 г у банці; по 12 банок в пачці; по 1 г у пакетику; по 24 пакетики у пачці	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/14999/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1565	МАЛІПІН®	Tilia**	сироп, 97 мг/5 мл, по 125 г у флаконі; по 1 флакону з дозуючою скляночкою в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18615/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття — 12 місяців.
1566	МАНТІ	Ordinary salt combinations and antiflatulents	таблетки жувальні по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у картонній коробці; по 8 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 3, або по 4 блістери у картонній коробці	Юнілаб, ЛП	США	ТОВ ЮС Фармація	Польща	UA/6751/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1567	МАСТО-ГРАН	Comb drug	гранули; по 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/3825/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1568	МАСТОДИНОН ®	Comb drug	краплі оральні по 50 мл або по 100 мл у флаконах № 1	Біонорика СЕ	Німеччина	Біонорика СЕ	Німеччина	UA/6239/01/01	Зберігати для захисту від світла в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона препарат придатний до застосування протягом 6 місяців. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності відноситься до останнього дня місяця.
1569	МАТЕРИНКИ ТРАВА	Origanum vulgare**	трава по 50 г або 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/3538/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ° С.
1570	МАТЕРИНКИ ТРАВА	Origanum vulgare**	трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2358/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати в холодильнику не більше 2-х діб.
1571	МАТИ-Й-МАЧУХИ ЛИСТЯ	Tussilago farfara**	листя по 40 г або по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2359/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

1572	МАТРОМАКС	Comb drug	розчин оральний по 25 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/20277/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1573	МЕДИХРОНАЛ ®-ДАРНИЦЯ	Comb drug	гранули, пакет № 1 та пакет № 2 у пачці; 7 пакетів № 1 та 7 пакетів № 2 у пачці; 21 пакет № 1 та 21 пакет № 2 у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/6504/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1574	МЕДОБІОТИН®	Biotin	таблетки по 2,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	ТОВ "МІБЕ УКРАЇНА"	Україна	Антон Хюбнер ГмбХ & Ко. КГ (виробник, відповідальний за випуск серії, включаючи контроль/випробування серії)/мібе ГмбХ Арцнаймітель (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування; виробник, відповідальний за випуск серії, включаючи контроль/випробування серії)	Німеччина / Німеччина	UA/2432/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці.

1575	МЕДУЛАК	Lactulose	сироп по 667,0 мг/мл по 180 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	АВС Фармачеутічі С.п.А	Італія	UA/17234/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона лікарський засіб використати протягом 12 місяців.
1576	МЕЗИМ® КАПСУЛИ 10000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками, по 20 або по 50 капсул у банці з поліпропілену; по 1 банці в картонній коробці; по 10 капсул у алюміній-алюмінієвому блістері; по 2 або 5 блістерів у картонній коробці	Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.	Люксембург	Адер Фармасьютіклс СРЛ (виробництво "in bulk", контроль серій)/Клоке Ферпакунгс - Сервіс ГмбХ (кінцеве пакування)/Артезан Фарма ГмбХ & Ко. КГ (кінцеве пакування)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (контроль та випуск серій)	Італія/ Німеччина/ Німеччина	UA/6763/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Лікарський засіб зберігати в недоступному для дітей місці. Після першого відкриття банки – 6 місяців (для поліпропіленової банки).
1577	МЕЗИМ® КАПСУЛИ 25000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками; по 20 або по 50 капсул у банці з поліпропілену; по 1 банці в картонній коробці; по 10 капсул у алюміній-алюмінієвому блістері; по 2 або 5 блістерів у картонній коробці	Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.	Люксембург	Адер Фармасьютіклс СРЛ (виробництво "in bulk", контроль серій)/Клоке Ферпакунгс - Сервіс ГмбХ (кінцеве пакування)/Артезан Фарма ГмбХ & Ко. КГ (кінцеве пакування)/БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (контроль та випуск серій)	Італія/ Німеччина/ Німеччина	UA/6763/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Лікарський засіб зберігати в недоступному для дітей місці. Після першого відкриття банки – 6 місяців (для поліпропіленової банки).

1578	МЕЛІСИ ТРАВА	Melissa officinalis**	трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/12619/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.
1579	МЕМОПЛАНТ	Ginkgo folium	таблетки, вкриті оболонкою, по 40 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці	Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/0204/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С в місцях, недоступних для дітей.
1580	МЕМОПЛАНТ ФОРТЕ	Ginkgo folium	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 3 блістери в картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 3 блістери в в картонній коробці	Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/0204/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у місці, недоступному для дітей.
1581	МЕМОРИН	Ginkgo folium	краплі оральні, 40 мг/мл по 40 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/6601/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1582	МЕМОРИН® НЕО	Ginkgo folium	капсули по 40 мг, по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18757/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1583	МЕНОВАЗАН	Comb drug	мазь; по 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/5829/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1584	МЕНОВАЗАН ФЛЕКСПРЕЙ	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий; по 20 мл або по 50 мл у флаконах з механічним розпилювачем; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/17592/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. .
1585	МЕНОВАЗИН	Comb drug	гель; по 40 г у тубі; по одній тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/20717/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1586	МЕНОВАЗИН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних або полімерних; по 50 мл у кулькових флаконах	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8824/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1587	МЕНОВАЗИН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 40 мл у флаконах або у флаконах з механічним розпилювачем; по 40 мл у флаконі або у флаконі з механічним розпилювачем; по 1 флакону в пачці	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм" (виробництво за повним циклом (включаючи первинне та вторинне пакування); відповідальний за контроль та випуск серії)/ТОВ "Мікрофарм" (виробництво за повним циклом (включаючи первинне та вторинне пакування); відповідальний за контроль та випуск серії)	Україна/ Україна	UA/8480/01/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

1588	МЕНОВАЗИН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 40 мл у флаконах; по 40 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконі скляному або полімерному з механічним розпилювачем; по 1 флакону в пачці; по 100 мл у флаконах скляних або полімерних; по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці; по 200 мл у флаконах скляних, укупорених кришками; по 200 мл у флаконі скляному, укупореному кришкою; по 1 флакону в пачці; по 200 мл у флаконах полімерних, укупорених кришками або насадками та кришками; по 200 мл у флаконі полімерному, укупореному кришкою або насадкою та кришкою; по 1 флакону в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7484/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1589	МЕНОВАЗИН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних; по 40 мл у флаконах полімерних	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8167/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

1590	МЕНОВАЗИН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних; по 40 мл у флаконах полімерних	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8167/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1591	МЕНОВАЗИН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 40 мл або по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці з картонним піддоном або без нього	ТОВ "Фарма Черкас"	Україна	ТОВ "Фарма Черкас"	Україна	UA/17573/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
1592	МЕНОВАЗИН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками полімерними по 40 або 100 мл; у полімерних флаконах, укупорених пробками та кришками полімерними по 40 або 100 мл	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	UA/19402/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1593	МЕНОВАЗИН	Comb drug	розчин нашкірний; по 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконах полімерних	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/5829/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1594	МЕНОВАЗИН - ВІШФА	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконах полімерних	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16905/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Лікарський засіб не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1595	МЕНОВАЛЕН	Comb drug	капсули, по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/5279/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1596	МЕНОВАЛЕН-ЗДОРОВ`Я КОМБІ	Barbiturates in combination with other drugs	краплі оральні, розчин по 20 мл у флаконах № 1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (фасування із "in bulk" препарату фірми-виробника ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", Україна)	Україна	UA/16170/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1597	МЕНОЛІДИН	Comb drug	гель, по 30 г або 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/21185/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1598	МЕРАЛІС®	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,05 % по 10 мл або по 15 мл розчину у флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній коробці	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	UA/12207/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та у недоступному для дітей місці.
1599	МЕРАЛІС®	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,1 % по 10 мл або по 15 мл розчину у флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній коробці	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	UA/12207/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та у недоступному для дітей місці.
1600	МЕРКУРІД	Comb drug	гранули по 10 г, 15 г, 20 г, 30 г у баночках або контейнерах, по 1 баночці або контейнеру в пачці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Меркурід"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/6098/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1601	МЕТАКАРТИН	Levocarnitine	розчин оральний 1 г/10 мл; по 10 мл у флаконах; по 10 флаконів у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18059/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1602	МЕТАКАРТИН	Levocarnitine	розчин оральний 2 г/10 мл; по 10 мл у флаконах; по 10 флаконів у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18029/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1603	МЕТЕОКСАН	Comb drug	капсули, по 15 капсул у блістері; по 1 або 2 або 4 блістери в картонній коробці	Альфасігма Франс	Франція	Альфасігма С.п.А.	Італія	UA/11345/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати! Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

1604	МЕТЕОРІК АЙРОН ГЛОБУЛІ ВЕЛАТІ	Comb drug	гранули гомеопатичні по 20 г у флаконі, по 1 флакону в коробці	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/16194/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому темному місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1605	МЕТЕОСПАЗМІЛ	Alverine, combinations	капсули по 10 капсул у блістері; по 2 або по 3 блістери у картонній коробці	Лабораторії Майолі Спіндлер	Франція	Лабораторії Майолі Спіндлер (первинна та вторинна упаковка, контроль якості, відповідальний за випуск серії)/Лабораторії Галенік Вернін (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості, відповідальний за випуск серії)	Франція/ Франція	UA/8767/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1606	МЕТИЗОЛОН	Methylprednisolone	крем для зовнішнього застосування, 1 мг/г, по 15 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (контроль якості)	Україна/ Україна	UA/12727/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1607	МЕТИЛУРАЦИЛ	Methyluracil*	мазь 10 %; по 15 г, 25 г або 40 г у тубах; по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/20743/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1608	МЕТИЛУРАЦИЛ	Methyluracil*	супозиторії ректальні по 0,5 г по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/2895/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1609	МЕТИЛУРАЦИЛ	Methyluracil*	таблетки по 0,5 г по 10 таблеток у стрипі; по 1 стрипу в паперовому конверті; по 10 таблеток у стрипі; по 2 або по 10 стрипів у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 10 блістерів у пачці з картону; по 10 таблеток у стрипах або у блістерах	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/6754/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1610	МЕТИЛУРАЦИЛ-ФАРМЕКС	Methyluracil*	супозиторії ректальні, 500 мг; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/11698/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1611	МЕТИЛУРАЦИЛ З МІРАМІСТИНОМ	Comb drug	мазь; по 15 г або 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/1750/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.

1612	МЕТІОНІН	Methionine	таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/6674/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1613	МЕТОВІТАН	Comb drug	капсули тверді, по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/15531/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1614	МЕТРОВІОЛ ДЕНТА	Comb drug	гель для ясен, по 20 г у тубах алюмінієвих; по 20 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у пачці з картону; по 20 г у тубах ламінантних; по 20 г у тубі ламінантній, по 1 тубі у пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/11820/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1615	МЕТРОГІЛ ДЕНТА®	Comb drug	гель для ясен по 20 г в тубі; по 1 тубі у картонній коробці	ТОВ "Джонсон і Джонсон Україна"	Україна	"Юнік Фармасьютикал Лабораторіз" (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.")	Індія	UA/2871/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1616	МЕТРОНІДАЗОЛ ДЕНТА	Metronidazole, combinations	гель для ясен, по 20 г гелю в тубі; по 1 тубі в картонній пачці	ПП "ГЛЕДЕКС"	Україна	ТОВ "Арпімед"	Республіка Вірменія	UA/14905/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1617	МЕФЕНАМІНКА®	Mefenamic acid	таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 або по 2 контурні чарункові упаковки у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/14487/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1618	МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА	Mefenamic acid	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1, 2 або 10 блістерів в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/20104/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1619	МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА	Mefenamic acid	таблетки по 500 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці; по 1 блістеру без вкладання у вторинну упаковку	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/18370/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1620	МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА	Mefenamic acid	таблетки по 500 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці; по 1 блістеру без вкладання у вторинну упаковку	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/18370/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1621	МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА	Mefenamic acid	таблетки по 500 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/17139/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1622	МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ	Mefenamic acid	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/7015/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1623	МЕФЕНАТ	Comb drug	мазь по 15 г або по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/7845/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1624	МІКОКС	Comb drug	краплі оральні, по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці	Гуна С.п.а.	Італія	Гуна С.п.а.	Італія	UA/3607/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

1625	МІКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	Miconazole	крем, 20 мг/г по 15 г або по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/1642/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1626	МІКОФІН®	Terbinafine	крем, 10 мг/г, по 15 г у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/5305/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1627	МІКОФІН®	Terbinafine	спрей нашкірний, 10 мг/г по 30 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону у картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/5305/03/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1628	МІКРОЛАКС®	Sodium lauryl sulfoacetate, incl. combinations	розчин ректальний; по 5 мл розчину ректального в тубі з універсальним наконечником; по 4 або по 12 туб з універсальними наконечниками в картонній коробці; по 5 мл розчину ректального в тубі з укороченим наконечником; по 4 або по 12 туб з укороченими наконечниками в картонній коробці	МакНіл Продактс Лімітед	Англія	ДЕЛЬФАРМ ОРЛЕАН	Франція	UA/15636/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 С у недоступному для дітей місці.
1629	МІКСТУРА ДИТЯЧА ВІД КАШЛЮ	Comb drug	порошок для оральної суспензії по 19,55 г у флаконі; по 1 флакону з порошком у пачці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/16239/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Розведений лікарський засіб зберігати протягом 10 днів при температурі від 2 до 8 °С.

1630	МІЛДРОНАТ®	Meldonium	капсули тверді по 250 мг; по 10 капсул у блістері; по 2, 4 або 6 блістерів в пачці з картону	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ "Гріндекс"	Латвія	UA/16049/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1631	МІЛЕНОН®	Azelaic acid	гель 15 %, по 30 г в алюмінієвій тубі, по 1 тубі у картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/21102/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1632	МІЛІ НОСІК	Phenylephrine, combinations	краплі оральні з фруктовим смаком по 15 мл у скляному флаконі; по 1 флакону з градуйованою піпеткою в картонній упаковці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Гракуре Фармасьютікалс ЛТД	Індія	UA/0567/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
1633	МІЛІСТАН ВІД КАШЛЮ	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Мепро Фармасьютикалс Прівat Лімітед	Індія	UA/2435/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
1634	МІЛІСТАН ГАРЯЧИЙ ЧАЙ ВІД КАШЛЮ	Comb drug	порошок для орального розчину, по 6 г у пакетику; по 10 пакетиків у картонній коробці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	ІксЕль Лабораторіес Пвт. Лтд.	Індія	UA/2433/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
1635	МІЛІСТАН ГАРЯЧИЙ ЧАЙ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 6 г у пакетику; по 10 пакетиків у картонній коробці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	ІксЕль Лабораторіес Пвт. Лтд.	Індія	UA/2368/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
1636	МІЛІСТАН МУЛЬТИСИМПТОМНИЙ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	каплети, вкриті оболонкою, по 12 каплет у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Мепро Фармасьютикалс Прівat Лімітед/ІксЕль Лабораторіес Пвт. Лтд.	Індія/Індія	UA/6458/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці.

1637	МІЛІСТАН МУЛЬТИСИМПТОМНИЙ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	суспензія оральна по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложечкою у картонній упаковці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Гракуре Фармасьютікалс ЛТД	Індія	UA/1454/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
1638	МІЛІСТАН МУЛЬТИСИМПТОМНИЙ АДВАНС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; по 25 картонних коробок у картонній коробці; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Мепро Фармасьютикалс Пріват Лімітед	Індія	UA/9028/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1639	МІЛІСТАН СИНУС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	каплети, вкриті оболонкою, по 10 каплет у блістері, по 2 блістери у пачці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Віндлас Хелскере Пріват Лімітед	Індія	UA/6459/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці.
1640	МІЛІСТАН СИРОП ВІД КАШЛЮ	Comb drug	сироп; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложечкою у картонній упаковці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Гракуре Фармасьютікалс ЛТД	Індія	UA/2435/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
1641	МІЛТ НАЗАЛЬНІ КРАПЛІ®	Comb drug	краплі назальні по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/14055/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

1642	МІЛЬГАМА®	Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12	таблетки, вкриті оболонкою, по 15 таблеток у блістері; по 2 або 4 блістери у картонній коробці	Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	Лабор фюр аналітік та фармасьютікал Хемі Др.Гранер енд Партнер ГмбХ (випробування серій для хімічних/фізичних тестів)/Мауєрманн-Арцнаймитель КГ (виробник відповідає за вторинне пакування, первинне пакування, дільниця, на якій проводяться будь-які виробничі стадії, включаючи виробництво "in bulk", включаючи відповідальність за ввезення та випуск серії, а також контроль/випробування серій)	Німеччина / Німеччина	UA/8049/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище +25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1643	МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ	Minoxidil	розчин нашкірний, 2 %; по 60 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з мірним насосом у картонній коробці	ЗАТ "Інтелі Генерикс Норд"	Литва	Індастріал Фармасеутіка Кантабріа, С.А.	Іспанія	UA/14771/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1644	МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ	Minoxidil	розчин нашкірний, 5 %; по 60 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з мірним насосом у картонній коробці	ЗАТ "Інтелі Генерикс Норд"	Литва	Індастріал Фармасеутіка Кантабріа, С.А.	Іспанія	UA/14771/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1645	МІРАМІСТИН®-ДАРНИЦЯ	Myramistin*	мазь, 5 мг/г; по 15 г або 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/1804/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1646	МОВЕКС® КОМФОРТ	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 30 таблеток у пляшці; по 1 пляшці у картонній упаковці; по 60 таблеток у пляшці; по 1 або по 2 пляшки в картонній упаковці; по 120 таблеток у пляшці; по 1 пляшці у картонній упаковці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Сава Хелскеа Лтд/Медітоп Фармасьютікал Лтд.	Індія/ Угорщина	UA/9817/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1647	МОВЕСПАЗМ	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній пачці; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Сава Хелскеа Лтд/Медітоп Фармасьютікал Лтд.	Індія/ Угорщина	UA/10010/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

1648	МОТИНОРМ	Domperidone	таблетки по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у паперовому конверті; по 10 блістерів у картонній упаковці	Медлей Фармасьютікалс Лтд.	Індія	Медлей Фармасьютікалс Лтд.	Індія	UA/3022/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25 °С, у недоступному для дітей місці.
1649	МОТОРИКС	Domperidone	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/3797/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1650	МОТОРИКС	Domperidone	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/3797/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1651	МОТОРИКУМ	Domperidone	таблетки по 10 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Медокемі ЛТД	Кіпр	Медокемі Лімітед (виробництво готового лікарського засобу, первинне пакування; виробництво за повним циклом)	Кіпр	UA/8733/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці.
1652	МУКАЛІТАН	Althaea officinalis**	таблетки по 0,05 г, по 30 таблеток у контейнерах полімерних	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/0344/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1653	МУКАЛТИН	Althaea officinalis**	таблетки по 50 мг для виробників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ`Я", та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС»: по 30 таблеток у банці або контейнері; по 1 банці або контейнеру у пачці з картону; по 10 таблеток у контурних безчарункових упаковках; по 30 таблеток у банках або контейнерах; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 3, або по 10 блістерів в пачці з картону; для виробника Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП»: по 30 таблеток у контейнерах	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод " ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії:)	Україна/ Україна/ Україна	UA/5779/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1654	МУКАЛТИН®	Althea root	сироп, по 100 мл у банці скляній або у флаконі скляному; по 1 банці або флакону з ложкою мірною в пачці; по 100 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону з ложкою мірною в пачці; по 200 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону з ложкою мірною в пачці; по 15 мл в саше; по 20 саше в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм" (усі стадії виробництва, за винятком первинного пакування в саше)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (первинне пакування в саше)	Україна/ Україна	UA/8800/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після розкриття зберігати не більше 14 діб при температурі 4–8 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Лікарський засіб не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1655	МУКАЛТИН®	Althaea officinalis**	таблетки по 50 мг по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у стрипі, по 3 стрипи в пачці; по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/1982/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1656	МУКАЛТИН®	Althaea officinalis**	таблетки по 50 мг по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у стрипі, по 3 стрипи в пачці; по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/1982/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1657	МУКАЛТИН® ФОРТЕ	Althea root	таблетки жувальні по 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 або 10 блістерів у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/1982/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1658	МУКАЛТИН® ФОРТЕ З ВІТАМІНОМ С	Comb drug	таблетки жувальні; по 10 таблеток у блістері; по 2 або 10 блістерів у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат" /ПАТ "Галичфарм"	Україна/ Україна	UA/4038/01/01	В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1659	МУКЛЕАР	Acetylcysteine	таблетки шипучі, по 600 мг, по 10 таблеток у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	Неутек Ілач Сан. Тіч. А.С.	Туреччина	UA/20091/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.
1660	МУКОЛІК	Carbocisteine	сироп 2 % по 125 мл у банці; по 1 банці з мірною ложкою у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/10556/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1661	МУКОЛІК	Carbocisteine	сироп 5 % по 125 мл у банці; по 1 банці та мірній ложці у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/15376/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1662	МУЛІМЕН	Comb drug	краплі оральні, по 50 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/3698/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця.
1663	МУЛЬТИГРИП БРОНХО	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 600 мг, по 3 г у саше; по 2, 10, 20 або 30 саше в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Білім Ілач Сан. ве Тід. А.Ш.	Туреччина	UA/18122/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1664	МУЛЬТИГРИП БРОНХО	Acetylcysteine	таблетки шипучі, 600 мг; по 10 таблеток у тубі по 1 тубі в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Алпекс Фарма СА	Швейцарія	UA/18647/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1665	МУЛЬТИГРИП НАЗАЛЬ	Xylometazoline	краплі назальні, розчин 0,05 % по 10 мл у флаконі з назальним аплікатором, по 1 флакону в картонній упаковці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Біофарм СА (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Біофарм С.А. (контроль серії (фізико-хімічний та мікробіологічний контроль))	Румунія/ Румунія	UA/15882/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Застосовувати протягом 30 днів після першого розкриття флакона.
1666	МУЛЬТИГРИП НАЗАЛЬ	Xylometazoline	краплі назальні, розчин 0,1 % по 10 мл у флаконі з назальним аплікатором, по 1 флакону в картонній упаковці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Біофарм СА (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Біофарм С.А. (контроль серії (фізико-хімічний та мікробіологічний контроль))	Румунія/ Румунія	UA/15882/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Застосовувати протягом 30 днів після першого розкриття флакона.

1667	МУЛЬТИГРИП НАЗАЛЬ	Xylometazoline	краплі назальні, розчин 0,1 % по 10 мл у флаконі з назальним аплікатором, по 1 флакону в картонній упаковці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Біофарм СА (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Біофарм С.А. (контроль серії (фізико-хімічний та мікробіологічний контроль))	Румунія/ Румунія	UA/15882/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Застосовувати протягом 30 днів після першого розкриття флакона.
1668	МУЛЬТИГРИП НАЗАЛЬ	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,05 %, по 10 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Біофарм СА (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії; контроль серії (фізико-хімічний та мікробіологічний контроль))/Біофарм С.А. (контроль серії (фізико-хімічний та мікробіологічний контроль)	Румунія/ Румунія	UA/15756/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Застосувати протягом 30 днів після першого відкриття флакона.
1669	МУЛЬТИГРИП НАЗАЛЬ	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,1 %, по 10 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Біофарм СА (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Біофарм С.А. (контроль серії (фізико-хімічний та мікробіологічний контроль))	Румунія/ Румунія	UA/15756/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Застосувати протягом 30 днів після першого відкриття флакона.

1670	МУЛЬТИГРИП НАЗАЛЬ	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,1 %, по 10 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Біофарм СА (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Біофарм С.А. (контроль серії (фізико-хімічний та мікробіологічний контроль))	Румунія/ Румунія	UA/15756/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1671	МУЛЬТИГРИП НАЗАЛЬ ФІТО	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,1 %; по 10 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Біофарм СА (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Біофарм С.А. (контроль серії (фізико-хімічний та мікробіологічний контроль))	Румунія/ Румунія	UA/15720/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона придатний протягом 30 днів.
1672	МУРАШИНИЙ СПИРТ - ВІШФА	Formic acid*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 50 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16944/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1673	МУЧНИЦІ ЛИСТЯ	Arctostaphylos uva-ursi**	листя по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2260/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений відвар або настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.
1674	МУЧНИЦІ ЛИСТЯ	Arctostaphylos uva-ursi**	листя по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/9131/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

1675	НАГІДОК КВІТКИ	Calendula officinalis**	квітки по 25 г або по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2156/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1676	НАГІДОК КВІТКИ	Calendula officinalis**	квітки по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/9006/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений настій зберігати не більше 2 діб у прохолодному місці. Зберігати у недоступному для дітей місці!
1677	НАЗАЛОНГ®	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,05 %, по 10 г у флаконі; по 1 флакону у пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/10620/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1678	НАЗАЛОНГ®	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,05 %, по 10 г у флаконі; по 1 флакону у пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	ТОВ "Мікрофарм" (виробництво, пакування, контроль якості)/ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (випуск серії)	Україна/ Україна	UA/10620/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1679	НАЗАЛОНГ® КІДС	Oxymetazoline	спрей назальний, 0,025 % по 10 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мікрофарм"	Україна	UA/19084/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1680	НАЗАЛОНГ® КІДС	Oxymetazoline	спрей назальний, 0,025 % по 10 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мікрофарм" (виробництво, пакування, контроль якості)/ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (випуск серії)	Україна/ Україна	UA/19084/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1681	НАЗИВІН®	Oxymetazoline	краплі назальні 0,01 % по 5 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Пі енд Джі Хелс Джермані ГмбХ	Німеччина	Проктер енд Гембл Мануфекчурінг ГмбХ/Софарімекс-Індустріа Кіміка е Фармацеутіка, С.А.	Німеччина / Португалія	UA/7928/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці! Після першого відкриття флакона зберігати не більше 6 місяців.
1682	НАЗИВІН®	Oxymetazoline	краплі назальні 0,025 % по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Пі енд Джі Хелс Джермані ГмбХ	Німеччина	Проктер енд Гембл Мануфекчурінг ГмбХ/Софарімекс-Індустріа Кіміка е Фармацеутіка, С.А.	Німеччина / Португалія	UA/7928/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці! Після першого відкриття флакона зберігати не більше 6 місяців.
1683	НАЗИВІН®	Oxymetazoline	краплі назальні 0,05 % по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Пі енд Джі Хелс Джермані ГмбХ	Німеччина	Проктер енд Гембл Мануфекчурінг ГмбХ/Софарімекс-Індустріа Кіміка е Фармацеутіка, С.А.	Німеччина / Португалія	UA/7928/01/03	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці! Після першого відкриття флакона зберігати не більше 6 місяців.
1684	НАЗИВІН®	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,05 %, по 10 мл у флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній коробці; флакон містить не менше 143 впорскувань	Пі енд Джі Хелс Джермані ГмбХ	Німеччина	Софарімекс - Індустріа Кіміка е Фармацеутіка, С.А./Проктер енд Гембл Мануфекчурінг ГмбХ	Португалія/ Німеччина	UA/18086/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1685	НАЗІРУС СИНУС РЕСПІРАЛ	Eucalypti aetheroleum	капсули м'які кишковорозчинні по 200 мг, по 15 капсул у блістері, по 1 блістеру або по 2 блістери у картонній коробці	Фітофарм Кленка С.А.	Польща	Каталент Джермані Ебербах ГмбХ (виробництво капсул, первинне та вторинне пакування, випробування вмісту залишкових розчинників (етанол, ацетон))/ТОВ Біофарм (випробування капсули на розпадання)/Фітофарм Кленка С.А. (випробування готового продукту, випуск серії)	Німеччина / Польща/ Польща	UA/20975/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

1686	НАЗО-СПРЕЙ	Oxymetazoline	спрей назальний, 0,5 мг/мл, по 15 мл у контейнері з розпилювачем; по 1 контейнеру з розпилювачем в пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна/ Україна	UA/9393/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1687	НАЗО-СПРЕЙ БЕБІ	Oxymetazoline	спрей назальний, розчин 0,25 мг/мл по 15 мл у флаконі зі скла з клапаном-насосом, назальною насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону в коробці; по 20 мл у флаконі полімерному з клапаном-насосом, назальною насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна	UA/13145/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1688	НАЗО-СПРЕЙ З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ	Oxymetazoline	спрей назальний, 0,5 мг/мл по 15 мл у флаконі зі скла з клапаном-насосом, назальною насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці; по 20 мл у флаконі полімерному з клапаном-насосом, назальною насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна	UA/12989/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1689	НАЗО КРАПЛІ	Oxymetazoline	краплі назальні, розчин, 0,25 мг/мл по 8 мл розчину у флаконі, закупореному кришкою-крапельницею зі скляною піпеткою; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/17338/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1690	НАЗО КРАПЛІ	Oxymetazoline	краплі назальні, розчин, 0,5 мг/мл по 8 мл розчину у флаконі, закупореному кришкою-крапельницею зі скляною піпеткою; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/17338/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1691	НАЗО КРАПЛІ МАЛЮК	Oxymetazoline	краплі назальні, розчин, 0,1 мг/мл, по 8 мл у флаконі, укупореному кришкою-крапельницею зі скляною піпеткою; по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/15808/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності препарату після розкриття флакона не більше 6 місяців.
1692	НАЗОКСИЛ	Xylometazoline	спрей назальний, розчин дозований, 1 мг/мл; по 10 мл у полімерному флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/19920/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1693	НАЗОЛ® КІДС	Phenylephrine	спрей назальний 0,25 %, по 10 мл у флаконі з розприскувачем, по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Істітуто Де Анжелі С.р.л.	Італія	UA/9482/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона термін придатності – 12 місяців.
1694	НАЗОНОЛ	Xylometazoline	спрей назальний, розчин дозований, 1 мг/мл по 10 мл розчину у полімерному флаконі з розпилювачем; по 1 флакону у пачці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/18788/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1695	НАТУБІОТИН	Biotin	таблетки по 10 мг по 30 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/15961/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1696	НАТУБІОТИН	Biotin	таблетки по 5 мг по 30 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/15961/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1697	НАФТИЗИН®	Naphazoline	краплі назальні 0,05 %; по 10 мл у флаконі поліетиленовому; по 1 флакону в пачці з картону; по 10 мл у флаконі поліетиленовому з дозатором або у флаконі поліетиленовому з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/0704/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона термін придатності препарату – 28 діб. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

1698	НАФТИЗИН®	Naphazoline	краплі назальні 0,05 %; по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/3332/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона термін придатності препарату – 28 діб. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
1699	НАФТИЗИН®	Naphazoline	краплі назальні 0,1 %; по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/3332/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона термін придатності препарату – 28 діб. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
1700	НАФТИЗИН®	Naphazoline	краплі назальні 0,1%; по 10 мл у флаконі поліетиленовому; по 1 флакону в пачці з картону; по 10 мл у флаконі поліетиленовому з дозатором або у флаконі поліетиленовому з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/0704/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона термін придатності препарату – 28 діб. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

1701	НАФТИФІН	Naftifine	крем, 10 мг/г, по 15 г у тубі; по 1 тубі в коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/16051/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1702	НАФТИФІН	Naftifine	крем, 10 мг/г, по 15 г у тубі; по 1 тубі в коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я", Україна)	Україна	UA/16051/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1703	НАФТИФІН	Naftifine	розчин нашкірний, 10 мг/мл по 20 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою, по 1 флакону в коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/16051/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1704	НАФТИФІН	Naftifine	розчин нашкірний, 10 мг/мл по 20 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою, по 1 флакону в коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я", Україна)	Україна	UA/16051/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1705	НАФТИФІН	Naftifine	спрей нашкірний, розчин, 10 мг/мл, по 8 мл або по 15 мл у флаконі, забезпеченому насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону в коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/16051/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1706	НАШАТИРНО-АНІСОВІ КРАПЛІ	Comb drug	краплі оральні, розчин по 25 мл у флаконах або у флаконах-крапельницях ; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8828/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1707	НЕЙРОБІОН® АДВАНС	Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці; по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Пі енд Джі Хелс Джермані ГмбХ	Німеччина	Пі енд Джі Хелс Острія ГмбХ енд Ко. ОГ	Австрія	UA/20293/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1708	НЕЙРОВІТАН®	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці	Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.	Йорданія	Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.	Йорданія	UA/7433/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С.
1709	НЕЙРОМАКС	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/14386/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1710	НЕЙРОМУЛЬТИВІТ	Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці з картону	ТОВ "БАУШ ХЕЛС УКРАЇНА"	Україна	Г.Л. Фарма ГмбХ	Австрія	UA/5926/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1711	НЕЙРОПЛАНТ	Hypericі herba	таблетки, вкриті оболонкою по 15 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/0414/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1712	НЕЙРОРУБІН™-ФОРТЕ ЛАКТАБ	Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Ацино Фарма АГ (Виробництво нерозфасованого продукту, контроль якості, дозвіл на випуск серії, первинна та вторинна упаковка)/Унтерзухунгсінститут Хеппелер ГмбХ (додаткова лабораторія, що приймає участь в контролі якості)/ННАС Лабор Д-р Хойслер ГмбХ (Контроль якості)	Швейцарія/ Німеччина / Німеччина	UA/1950/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1713	НЕО-АНГІН®	Comb drug	льодяники по 12 льодяників у блістері; по 2 або по 4 блістери в картонній коробці	Дивафарма ГмбХ	Німеччина	Дивафарма ГмбХ (випуск серії)/Клостерфрау Берлін ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості)	Німеччина / Німеччина	UA/7674/01/01	Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1714	НЕО-АНГІН® БЕЗ ЦУКРУ	Comb drug	льодяники, по 8 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці; по 12 льодяників у блістері; по 2 або по 4 блістери в картонній коробці	Дивафарма ГмбХ	Німеччина	Дивафарма ГмбХ (випуск серії)/Клостерфрау Берлін ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості)	Німеччина / Німеччина	UA/7673/01/01	Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1715	НЕО-АНГІН® ВИШНЯ	Comb drug	льодяники по 12 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Дивафарма ГмбХ	Німеччина	Дивафарма ГмбХ (відповідає за випуск серії)/Клостерфрау Берлін ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції)	Німеччина / Німеччина	UA/10762/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1716	НЕО-АНГІН® ШАВЛІЯ	Comb drug	льодяники; по 12 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Дивафарма ГмбХ	Німеччина	Дивафарма ГмбХ (відповідає за випуск серії)/Клостерфрау Берлін ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції)	Німеччина / Німеччина	UA/10972/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1717	НЕОВІТАМ	Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/11551/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1718	НЕОКАРДИЛ	Comb drug	капсули; по 10 капсул у блістері; 3 блістери в упаковці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	UA/11357/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1719	НЕОМІЦИН ПЛЮС	Comb drug	мазь по 10 г або 20 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/17830/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1720	НЕОМІЦИН ПЛЮС	Comb drug	порошок нашкірний; по 10 г у контейнері або у флаконі; по 1 контейнеру або флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/17830/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1721	НЕОСИНУС®	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований, 0,05 %, по 10 г у флаконі з розпилювачем, по 1 флакону у пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мікрофарм" (виробництво, пакування, контроль якості)/ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (випуск серії)	Україна/ Україна	UA/19722/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1722	НЕОФЕН БЕЛУПО ПЛЮС	Ibuprofen	гель, 50 мг/г по 15 г або 50 г, або 100 г у тубі; по 1 тубі в картонній пачці	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	UA/14739/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1723	НЕОФЕН БЕЛУПО ФОРТЕ	Ibuprofen	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній пачці	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	UA/14740/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1724	НЕУРОБЕКС-ТЕВА	Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 60, або по 90, або по 150 таблеток у банці; по 1 банці в картонній пачці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Дупниця АТ/Балканфарма-Разград АТ	Болгарія/ Болгарія	UA/7313/01/02	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1725	НЕФРОДОЛ®	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці із картону	ТОВ "ФК "САЛЮТАРІС"	Україна	ПрАТ "Технолог" (відповідальний за виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль та випробування серії, не включаючи випуск серії)/ТОВ "ФК "САЛЮТАРІС" (відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)	Україна/ Україна	UA/15033/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С.
1726	НЕФРОФІТ	Comb drug	збір по 50 г або по 100 г у пакеті, вкладеному в пачку; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	UA/3551/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1727	НИМАКОЛД	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 10 пакетиків у картонній коробці	ВІВ ЛАЙФ ЛЛП	Індія	Вівімед Лабс Лтд	Індія	UA/20885/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1728	НИМАФЛЮ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 10 пакетиків у картонній коробці	ВІВ ЛАЙФ ЛЛП	Індія	Вівімед Лабс Лтд	Індія	UA/20926/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1729	НІЗОРАЛ®	Ketoconazole	шампунь, 20 мг/г; по 25 мл або по 60 мл у пляшці; по 1 пляшці в картонній коробці; по 7,5 мл у саше, по 8 саше в картонній коробці	СТАДА Арцнаймітель АГ	Німеччина	Янссен Фармацевтика НВ (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості лікарського засобу, випуск серії)/СТАДА Арцнаймітель АГ (вторинне пакування, контроль якості лікарського засобу, випуск сері)/"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування)/СТАДА Хемофарм СРЛ (контроль серій)	Бельгія/ Німеччина / Республіка Сербія/Румунія	UA/2753/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1730	НІКОРЕТТЕ® ЗИМОВА М'ЯТА	Nicotine	гумка жувальна лікувальна по 2 мг, по 15 гумок жувальних у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці	МакНіл АБ	Швеція	МакНіл АБ	Швеція	UA/10734/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1731	НІКОРЕТТЕ® ЗИМОВА М'ЯТА	Nicotine	гумка жувальна лікувальна по 4 мг, по 15 гумок жувальних у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці	МакНіл АБ	Швеція	МакНіл АБ	Швеція	UA/10734/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1732	НІКОРЕТТЕ® ЗІ СМАКОМ СВІЖИХ ФРУКТІВ	Nicotine	гумка жувальна лікувальна по 2 мг, по 15 гумок жувальних у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці	МакНіл АБ	Швеція	МакНіл АБ	Швеція	UA/8921/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 *С у недоступному для дітей місці.
1733	НІКОРЕТТЕ® ЗІ СМАКОМ СВІЖИХ ФРУКТІВ	Nicotine	гумка жувальна лікувальна по 4 мг, по 15 гумок жувальних у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці	МакНіл АБ	Швеція	МакНіл АБ	Швеція	UA/8921/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 *С у недоступному для дітей місці.
1734	НІКОРЕТТЕ® ЗІ СМАКОМ СВІЖОЇ М'ЯТИ	Nicotine	гумка жувальна лікувальна по 2 мг, по 15 гумок жувальних у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці	МакНіл АБ	Швеція	МакНіл АБ	Швеція	UA/8878/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 *С у недоступному для дітей місці.
1735	НІКОРЕТТЕ® ЗІ СМАКОМ СВІЖОЇ М'ЯТИ	Nicotine	гумка жувальна лікувальна по 4 мг, по 15 гумок жувальних у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці	МакНіл АБ	Швеція	МакНіл АБ	Швеція	UA/8878/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 *С у недоступному для дітей місці.

1736	НІКОРЕТТЕ® КРИЖАНА М'ЯТА	Nicotine	льодяники пресовані по 2 мг; по 20 льодяників у фліп-упаковці; по 40 льодяників у багатодозовій картонній коробці, по 1 багатодозовій картонній коробці у картонній коробці	МакНіл АБ	Швеція	МакНіл АБ	Швеція	UA/14535/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1737	НІКОРЕТТЕ® КРИЖАНА М'ЯТА	Nicotine	льодяники пресовані по 4 мг; по 20 льодяників у фліп-упаковці; по 40 льодяників у багатодозовій картонній коробці, по 1 багатодозовій картонній коробці у картонній коробці	МакНіл АБ	Швеція	МакНіл АБ	Швеція	UA/14535/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1738	НІКОРЕТТЕ® СВІЖА М`ЯТА	Nicotine	спрей для ротової порожнини, дозований, 1 мг/доза, по 150 доз спрею у ПЕТ- флаконі ємністю 15 мл, ПЕТ- флакон з механічним розпилювачем і захисним клапаном поміщують у пластиковий футляр із поліпропілену, по 1 або 2 пластикових футляри у пластиковому контурному контейнері із картонною основою	МакНіл АБ	Швеція	МакНіл АБ	Швеція	UA/16866/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1739	НІКОРЕТТЕ® ФРУКТОВО-М'ЯТНИЙ	Nicotine	спрей для ротової порожнини, дозований, 1 мг/доза; по 150 доз спрею у ПЕТ- флаконі ємністю 15 мл. ПЕТ- флакон з механічним розпилювачем і захисним клапаном поміщують у пластиковий футляр із поліпропілену. По 1 або 2 пластикових футляри у пластиковому контурному контейнері із картонною основою	МакНіл АБ	Швеція	МакНіл АБ (виробництво готового продукту (включаючи комплектацію, контроль якості, випуск серії)	Швеція	UA/18446/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці
1740	НІМЕДАР	Nimesulide	гель, 10 мг/г по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/15433/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1741	НІМЕСУЛІД	Nimesulide	гель 10 мг/г; по 30 г, 40 г або 100 г у тубах; по 30 г, 40 г або 100 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5536/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1742	НІМЕСУЛІД	Nimesulide	гель 10 мг/г; по 30 г, 40 г або 100 г у тубах; по 30 г, 40 г або 100 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5536/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1743	НІМЕСУЛІД	Nimesulide	гель, 10 мг/г; по 50 г або по 100 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/21221/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати

1744	НІМІД АРТРОГЕЛЬ	Nimesulide	гель для зовнішнього застосування, 10 мг/г; по 30 г або по 100 г в алюмінієвій або ламінованій тубі; по 1 тубі у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)	Індія/ Україна	UA/7649/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1745	НІМІД®	Nimesulide	гель для зовнішнього застосування, 10 мг/г; по 30 г або по 100 г в алюмінієвій або ламінованій тубі; по 1 тубі у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)	Індія/ Україна	UA/7649/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1746	НІТРОГЛІЦЕРИН	Glyceryl trinitrate	таблетки сублінгвальні по 0,5 мг, по 20 або по 40 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/6393/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1747	НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я	Glyceryl trinitrate	таблетки сублінгвальні по 0,5 мг по 40 таблеток у банці; по 1 банці у картонній коробці; по 40 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/0052/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1748	НІТРОФУНГІН	Chlornitrophenol*	розчин для зовнішнього застосування, 10 мг/мл по 25 мл у флаконі, по 1 флакону в коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о.	Чеська Республіка	UA/10177/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від світла та недоступному для дітей місці.
1749	НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ	Sodium chloride	краплі назальні 0,65 % по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці із картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/1877/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1750	НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ	Sodium chloride	спрей назальний 0,65 %, по 10 мл у флаконі скляному; по 1 флакону у пачці з картону; по 15 мл у флаконі поліетиленовому; по 1 флакону з дозатором у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/1877/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1751	НО-Х-ША®	Drotaverine	супозиторії ректальні по 0,04 г, по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/3611/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1752	НО-Х-ША®	Drotaverine	таблетки по 0,04 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або 3 блістери у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"/ПрАТ "Технолог"	Україна/ Україна	UA/3611/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1753	НО-Х-ША® ФОРТЕ	Drotaverine	таблетки по 0,08 г, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/3611/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1754	НО-ШПА® ФОРТЕ	Drotaverine	таблетки по 80 мг, № 10: по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; № 24: по 24 таблетки у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Опелла Хелскеа Хангері Кфт. (виробництво, контроль якості, пакування, маркування, випуск серії)/Опелла Хелскеа Поланд Сп. з о.о. (виробництво, контроль якості, пакування, маркування, випуск серії)/ЄУРОАПІ Хангері Лтд. (мікробіологічний контроль ГЛЗ)/ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Підприємство №3 (Підприємство в Чаніквельдь) (мікробіологічний контроль ГЛЗ)	Угорщина / Польща/ Угорщина / Угорщина	UA/8879/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1755	НОВІГАН®	Ibuprofen, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд	Індія	Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед	Індія	UA/5127/01/01	Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

1756	НОВІРИН	Inosine pranobex	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/12436/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1757	НОВО-ПАСИТ	Comb drug	розчин оральний по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним ковпачком в коробці; по 5 мл у саше; по 30 саше у коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о.	Чеська Республіка	UA/9976/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Після першого відкриття 28 діб.
1758	НОВО-ПАСИТ	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери в коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о.	Чеська Республіка	UA/1830/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
1759	НОКСОН	Valerianae radix	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 450 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/15232/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1760	НОКСПРЕЙ МАЛЮК	Oxymetazoline	краплі назальні 0,01 % по 5 мл у скляному контейнері з кришкою-піпеткою; по 1 контейнеру в картонній пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/12781/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1761	НОКСПРЕЙ МАЛЮК	Oxymetazoline	краплі назальні 0,01 % по 5 мл у скляному контейнері з кришкою-піпеткою; по 1 контейнеру в картонній пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/12781/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1762	НОРМАГУТ	Saccharomyces boulardii	капсули по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній упаковці	Мега Лайфсайенсіз (Австралія) Пті Лтд	Австралія	Ардейфарм ГмбХ	Німеччина	UA/9221/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

1763	НОРМОВЕН	Diosmin, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у пачці; по 12 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/4475/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1764	НОРМОВЕН 1000	Diosmin, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 1000 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 або 6 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/19787/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1765	НОРМОЛАКТ	Lactulose	сироп, 670 мг/мл, по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці разом із дозувальною ложкою в пачці; по 200 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону разом із дозувальною ложкою в пачці; по 500 мл у флаконі полімерному, по 1 флакону разом із дозувальною ложкою в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/18509/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Після розкриття флакону термін придатності препарату 120 діб при температурі не вище 25° С.

1766	НОРМОЛАКТ ФОРТЕ	Lactulose	сироп, 670 мг/мл по 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону у коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (виробництво з продукції in bulk фірми Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія)	Україна	UA/16319/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Застосовувати за призначенням лікаря.
1767	НОРМОЛАКТ ФРУТ	Lactulose	сироп, 667 мг/мл, по 100 мл у банці полімерній та пачці разом із ложкою дозувальною; по 100 мл або по 200 мл, або по 240 мл у полімерному флаконі та пачці разом з ложкою дозувальною; по 500 мл у флаконі полімерному, по 1 флакону разом із ложкою дозувальною в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/18985/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона термін придатності препарату 120 діб при температурі не вище 25 °С. Не слід застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1768	НОСОЛІН® ПЛЮС	Comb drug	спрей назальний по 30 г у балоні; по 1 балону у пачці з картону	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/8171/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1769	НОТАКЕЛЬ D5	Mono	краплі для перорального та місцевого застосування по 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в картонній пачці	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/11521/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.
1770	НУКЛЕКС	Ribonucleinic acid*	капсули по 250 мг; по 10 капсул у блістері; 2 або 4 блістери у пачці з картону	Дочірнє підприємство "БіоСел" корпорації "Баіесел Лебореторіз Корпорейшн"	Україна	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	UA/5066/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1771	НУРОФЄН®	Ibuprofen	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 8 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 12 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/6313/02/02	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1772	НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ	Ibuprofen	супозиторії по 60 мг; по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Фамар А.В.Е. Завод Авлон	Греція	UA/6642/02/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

1773	НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ	Ibuprofen	суспензія оральна з апельсиновим смаком, 100 мг/5 мл; по 100 мл або 200 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті зі шприцом-дозатором у картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед (виробництво in bulk, пакування, контроль якості, випуск серії)	Велика Британія	UA/8233/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1774	НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ	Ibuprofen	суспензія оральна з полуничним смаком, 100 мг/5 мл; по 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті зі шприцом-дозатором у картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер (Юкей) Лімітед (виробництво in bulk, пакування (первинне та вторинне), контроль якості, випуск серії)	Велика Британія	UA/7914/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

1775	НУРОФЄН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП	Ibuprofen	капсули м'які по 200 мг; по 4 або 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 8 капсул у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед (відповідальний за первинне, вторинне пакування, контроль якості готового продукту та випуск серії)/Патеон Софтжелс Б.В. (відповідальний за виробництво in bulk, включаючи проведення контролю якості)/РБ Хелс Мануфектуринг (ЮС) ЛЛС (відповідальний за виробництво in bulk, первинне, вторинне пакування, контроль якості готового продукту)	Велика Британія/ Нідерланди/США	UA/13599/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

1776	НУРОФЄН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ	Ibuprofen	капсули м'які по 400 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед (відповідальний за пакування та випуск серії)/Патеон Софтжелс Б.В. (відповідальний за виробництво in bulk)	Велика Британія/ Нідерланди	UA/14179/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1777	НУРОФЄН® ІНТЕНСИВ	Ibuprofen, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 6 або 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/14588/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1778	НУРОФЄН® КОЛД& ФЛЮ	Ibuprofen, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг/5 мг; по 6, 12 таблеток в блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/17937/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1779	НУРОФЄН® ФОРТЕ	Ibuprofen	таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг по 12 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/6313/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1780	ОБЛІПИХИ ОЛІЯ	Hippophae rhamnoides**	олія, по 50 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/2685/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1781	ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ	Hippophae rhamnoides**	супозиторії по 0,35 г; по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/3612/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1782	ОВЕСТИН®	Estriol	крем вагінальний, 1 мг/г; по 15 г у тубі; по 1 тубі у комплекті з аплікатором в пачці	Аспен Фарма Трейдінг Лімітед	Ірландія	Аспен Бад-Ольдесло ГмбХ. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)	Німеччина	UA/2281/03/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
1783	ОКСИНЕКС	Oxymetazoline	спрей назальний, розчин дозований 0,5 мг/мл, по 10 мл розчину у флаконі полімерному з назальним розпилювачем, по 1 флакону в коробці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/20442/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона зберігати не більше 6 місяців.
1784	ОКСИРІФ	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,05 %; по 10 мл у флаконах полімерних з розпилювачем назальним, № 1 у пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОЦЕВТИКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/20664/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття — 6 місяців. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

1785	ОКТЕНІСЕПТ	Octenidine, combinations	розчин; по 50 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці; по 50 мл у флаконі з вагінальним аплікатором; по 1 флакону в картонній коробці; по 250 мл або 1000 мл у флаконах; по 250 мл у флаконі з розпилювачем	Шюльке і Майр ГмбХ	Німеччина	Шюльке і Майр ГмбХ	Німеччина	UA/4056/01/01	У недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Після розкриття флакона розчин стабільний протягом 3 років.
1786	ОКТІНІЯ	Octenidine, combinations	розчин, по 30 мл, 50 мл, 200 мл, 300 мл або 500 мл у флаконі, по 1 флакону в пачку; або по 200 мл або 300 мл у флаконі без вкладання в пачку	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/21104/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Для дозувань 200 мл, 300 мл, 500 мл застосовано обмеження не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1787	ОКУЛОХЕЕЛЬ	Comb drug	краплі очні, по 0,45 мл розчину у поліетиленовій капсулі; по 5 поліетиленових капсул у пакеті з алюмінієвої фольги; по 3 пакетика у картонній коробці	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ (Виробник, що відповідає за випуск серії)/Роммелаг ЦДМО ГмбХ (Виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування)/Фарма Штульн ГмбХ (Виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування)	Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/8258/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Відкритий пакет з алюмінієвої фольги зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
1788	ОЛІЯ НАСІННЯ ГАРБУЗА	Cucurbita pero**	олія по 50 мл або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/7818/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1789	ОЛФЕН®	Diclofenac	пластир лікувальний по 140 мг/12 годин на 140 см2 № 2: по 2 пластирі у пакеті з паперово-алюмінієво-поліетиленової плівки; по 1 пакету в картонній коробці; № 5: по 5 пластирів у пакеті з паперово-алюмінієво-поліетиленової плівки; по 1 пакету в картонній коробці; № 10: по 5 пластирів у пакеті з паперово-алюмінієво-поліетиленової плівки; по 2 пакети в картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд. (виробник, який відповідає за виробництво нерозфасованого продукту; первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/Меркле ГмбХ (виробник, який відповідає за контроль серії; виробник, який відповідає за випуск серії)	Японія/ Німеччина	UA/5930/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття упаковки 4 місяці при температурі не вище 25 °С; 6 місяців при температурі 2-8 °С (у холодильнику).
1790	ОЛФЕН® ГІДРОГЕЛЬ	Diclofenac	гель 1 %, по 20 г або 50 г, або 100 г гелю в тубі; по 1 тубі в коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (виробник, який відповідає за виробництво продукту in bulk, первинне пакування, вторинне пакування, контроль серії; виробник, який відповідає за випуск серії)	Німеччина	UA/0646/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1791	ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ	Inula helenium**	кореневища з коренями по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 4 г у фільтр-пакеті; по 12 або по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2262/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений відвар (настій) – у прохолодному (8-15°С) місці не більше 2 діб.
1792	ОМЕЗ®	Omeprazole	капсули по 10 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 3 блістери в картонній коробці	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд	Індія	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, ФТО – 3	Індія	UA/0235/02/02	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1793	ОМЕЗ®	Omeprazole	капсули по 10 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 3 блістери в картонній коробці	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд	Індія	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, ФТО – 3	Індія	UA/0235/02/02	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1794	ОНАБЕТ	Sertaconazole	крем 20 мг/ г, по 20 г у тубі, по 1 тубі в картонній упаковці	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Індія	UA/10907/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати
1795	ОПСОНАТ СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні по 30 мл, 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/16022/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1796	ОПТИКС	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 3 або по 6 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/6929/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1797	ОПТІН	Tetryzoline	очні краплі, розчин 0,5 мг/мл, по 10 мл у флаконі з дозуючим пристроєм, по 1 флакону в картонній коробці	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	UA/18293/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття упаковки не більше 180 діб.

1798	ОПТІН	Tetryzoline	очні краплі, розчин 0,5 мг/мл, по 10 мл у флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній коробці	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	UA/18293/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття упаковки не більше 180 діб.
1799	ОРАЛОР	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 120 мл у флаконі скляному в картонній пачці з мірним стаканчиком; по 120 мл у флаконі полімерному в картонній пачці з мірним стаканчиком; по 200 мл у флаконі скляному в картонній пачці з мірним стаканчиком; по 200 мл у флаконі полімерному в картонній пачці з мірним стаканчиком	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/20404/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1800	ОРАЛОР	Comb drug	спрей для ротової порожнини по 50 мл у флаконі скляному або полімерному, укупореному пульверизатором, по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконі скляному або полімерному, укупореному кришкою, по 1 флакону разом з пульверизатором в пачці	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/20404/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1801	ОРАЛОР	Comb drug	спрей для ротової порожнини по 50 мл у флаконі скляному, по 1 флакону разом з пульверизатором у пачці	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/20404/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1802	ОРАСЕПТ®	Phenol	спрей оральний 1,4 %, по 177 мл спрею у пластикових флаконах	ДП "СТАДА-УКРАЇНА"	Україна	Фамар А.В.Е. Авлон Плант	Греція	UA/7397/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.
1803	ОРАФЕН	Ibuprofen	суспензія оральна з апельсиновим смаком, 100 мг/5 мл по 200 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті зі шприцем-дозатором у картонній коробці	ЗАТ "ІНТЕЛІ ГЕНЕРИКС НОРД"	Литва	ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л.	Іспанія	UA/12520/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1804	ОРВІЛОР	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 120 мл у флаконі скляному в пачці з мірним стаканчиком; по 120 мл у флаконі полімерному в пачці з мірним стаканчиком; по 200 мл у флаконі скляному в пачці з мірним стаканчиком; по 200 мл у флаконі полімерному в пачці з мірним стаканчиком	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/20443/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1805	ОРВІЛОР	Comb drug	спрей для ротової порожнини, по 50 мл у флаконі скляному, по 1 флакону разом з пульверизатором у пачці	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/20443/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1806	ОРГАНОРІК®	Racecadotril	гранули для оральної суспензії, по 10 мг; по 16 саше в картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Атена Драг Делівері Солюшнз ПВТ. ЛТД.	Індія	UA/20255/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1807	ОРГАНОРІК®	Racecadotril	гранули для оральної суспензії, по 30 мг; по 16 саше в картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Атена Драг Делівері Солюшнз ПВТ. ЛТД.	Індія	UA/20255/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1808	ОСТЕОБІОС	Comb drug	краплі для перорального застосування по 30 мл крапель у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці	Гуна С.п.а.	Італія	Гуна С.п.а.	Італія	UA/2649/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1809	ОТИКАЇН-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	краплі вушні, розчин по 8 г або по 16 г у флаконі зі скла; по 1 флакону разом з кришкою-крапельницею зі скляною піпеткою у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна	UA/13172/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Термін придатності препарату після розкриття флакона не більше 4 тижнів. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1810	ОТИКС	Comb drug	краплі вушні, розчин по 15 г у флаконі; по 1 флакону в картонній пачці	ПП "ГЛЕДЕКС"	Україна	ТОВ "Арпімед"	Республіка Вірменія	UA/14609/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Термін придатності після першого відкриття флакона – 6 місяців.
1811	ОТИНУМ	Choline salicylate	краплі вушні, 0,2 г/г; по 10 г у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Віатріс Хелскеа ГмбХ	Німеччина	Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ	Польща	UA/1364/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1812	ОТИНУМ	Choline salicylate	краплі вушні, 0,2 г/г; по 10 г у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Віатріс Хелскеа ГмбХ	Німеччина	Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ	Польща	UA/1364/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1813	ОТОТОН®	Comb drug	краплі вушні, по 16 г у флаконі; по 1 флакону разом з крапельницею у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/13775/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після розкриття флакона – 1 місяць.
1814	ОТРИВІН ЕКСТРА	Comb drug	спрей назальний, дозований; по 10 мл у флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній пачці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Халеон КХ С.а.р.л.	Швейцарія	UA/13560/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
1815	ОТРИВІН З МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛІПТОМ	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 0,1 % по 10 мл у полімерному флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Халеон КХ С.а.р.л.	Швейцарія	UA/5416/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

1816	ОФТАГЕЛЬ®	Carbomer*	гель очний, 2,5 мг/г; по 10 г у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці	Сантен АТ	Фінляндія	УРСАФАРМ Арцнаймітель ГмбХ (виробник, відповідальний за виробництво in-bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Сантен АТ (виробник, відповідальний за випуск)	Німеччина / Фінляндія	UA/6605/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Між закапуваннями флакон слід зберігати у картонній коробці у перевернутому положенні для полегшення надходження гелю. Термін зберігання після першого відкриття флакона становить 1 місяць.
1817	ОФТАЛЬ	Tetryzoline	краплі очні, розчин 0,5 мг/мл по 5 мл або по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з кришкою-крапельницею в пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТТовариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/13675/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1818	ОФТОЛІК	Comb drug	краплі очні по 10 мл у пластиковому флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у картонній пачці	СЕНТІСС ФАРМА ПВТ. ЛТД.	Індія	СЕНТІСС ФАРМА ПВТ. ЛТД.	Індія	UA/5782/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Тримати флакон у пачці. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після розкриття флакона – 45 діб.

1819	ПАНАДОЛ	Paracetamol	таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	Халеон Айрленд Дангарван Лімітед (виробництво лікарського засобу, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)	Ірландія	UA/2562/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.
1820	ПАНАДОЛ	Paracetamol	таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 8 таблеток у блістері; по 8 або 12 блістерів у картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед (виробництво лікарського засобу, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)	Ірландія	UA/2562/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.
1821	ПАНАДОЛ ЕКСТРА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки шипучі; по 2 таблетки у багатошаровому стрипі; по 6 стрипів у картонній коробці; по 4 таблетки у багатошаровому стрипі; по 3 стрипа у картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	Фамар А.В.Е. Антоса плант/ГлаксоСміт Клайн Дангарван Лімітед	Греція/ Ірландія	UA/2691/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.
1822	ПАНАДОЛ ЕКСТРА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки шипучі; по 2 таблетки у багатошаровому стрипі; по 6 стрипів у картонній коробці; по 4 таблетки у багатошаровому стрипі; по 3 стрипа у картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	Халеон Айрленд Дангарван Лімітед	Ірландія	UA/2691/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.

1823	ПАНАДОЛ ЕКСТРА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, вкриті оболонкою, по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед	Ірландія	UA/2691/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їх зору.
1824	ПАНАДОЛ ЕКСТРА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, вкриті оболонкою, по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	Халеон Айрленд Дангарван Лімітед	Ірландія	UA/2691/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їх зору.
1825	ПАНАДОЛ ЕКСТРА ЕДВАНС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед	Ірландія	UA/13747/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їх зору.
1826	ПАНАНГІН	Magnesium (different salts in combination)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 50 таблеток у поліпропіленовому флаконі з контролем першого розкриття; по 1 флакону в картонній упаковці; по 20 таблеток у блістері; по 3 (20х3) або по 5 (20х5) блістерів в картонній упаковці	ВАТ "Гедеон Ріхтер"	Угорщина	ВАТ "Гедеон Ріхтер"	Угорщина	UA/7315/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Препарат зберігати у недоступному для дітей місці.

1827	ПАНАНГІН ФОРТЕ	Magnesium (different salts in combination)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 280 мг/316 мг; по 15 таблеток у блістері, по 2, 4 або по 6 блістерів у картонній упаковці	ВАТ "Гедеон Ріхтер"	Угорщина	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, випуск серії)	Угорщина /Польща	UA/18351/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1828	ПАНАНГІН ФОРТЕ	Magnesium (different salts in combination)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 280 мг/316 мг; по 15 таблеток у блістері, по 2, 4 або по 6 блістерів у картонній упаковці	ВАТ "Гедеон Ріхтер"	Угорщина	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (виробництво нерозфасованого продукту, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль якості, випуск серії)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща" (контроль якості, випуск серії)	Угорщина /Польща	UA/18351/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1829	ПАНЗИНОРМ® 10000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули по 7 капсул у блістері; по 3 або по 8, або по 12 блістерів у коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	UA/9007/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °Св оригінальній упаковці для захисту від дії вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1830	ПАНКАЛОР®	Acetylcysteine	гранули для орального розчину по 200 мг; по 1 г гранул у саше, по 10 або по 30 саше у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20432/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1831	ПАНКАЛОР®	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 200 мг; по 2 таблетки у блістері, по 10 блістерів у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20432/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1832	ПАНКАЛОР® ФОРТЕ	Acetylcysteine	гранули для орального розчину по 600 мг, по 3 г гранул у саше, по 10 або по 30 саше у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20433/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1833	ПАНКАЛОР® ФОРТЕ	Acetylcysteine	таблетки шипучі, по 600 мг, по 2 таблетки у блістері, по 10 блістерів у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20433/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1834	ПАНКРЕАЗИМ 10000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки гастрорезистентні по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 2 або по 5 блістерів у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/16722/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1835	ПАНКРЕАТИН	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 250 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 , або по 2, або по 5, або по 6 блістерів у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/0337/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1836	ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 5 блістерів у картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/7381/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1837	ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ 14000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 5 блістерів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва. контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/7381/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1838	ПАНКРЕАТИН 8000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки гастрорезистентні, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 5 блістерів у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 90 блістерів у коробці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/4577/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1839	ПАНКРЕАТИН 8000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 0,24 г, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 5 блістерів в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/7539/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці!
1840	ПАНКРЕАТИН 8000 GR	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки кишковорозчинні, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 5 блістерів у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/8550/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1841	ПАНКРЕАТИН ДЛЯ ДІТЕЙ	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 6 блістерів у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/8983/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. У недоступному для дітей місці.
1842	ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні; по 10 таблеток у блістері; по 2, 4, 5 або по 6 блістерів у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/0337/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1843	ПАНТЕВЕНОЛ	Rutoside, combinations	гель по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/1282/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1844	ПАНТЕКРЕМ®	Dexpanthenol	крем 5 % по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/10978/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

1845	ПАНТЕКРЕМ®	Dexpanthenol	крем 5 % по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/10978/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
1846	ПАНТЕКСОЛ ЯДРАН	Dexpanthenol	крем 5 %, по 25 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	UA/5876/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1847	ПАНТЕНОЛ	Dexpanthenol	мазь, 50 мг/г по 30 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці	"Хемофарм" АД	Республіка Сербія	"Хемофарм" АД (виробник, відповідальний за випуск серії)/"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробник готового лікарського засобу, первинне, вторинне пакування, контроль серії)	Республіка Сербія/Республіка Сербія	UA/7848/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття лікарський засіб зберігати у закритій тубі при температурі не вище 25 °С та використати протягом 3 місяців.

1848	ПАНТЕНОЛ	Dexpanthenol	піна нашкірна, 50 мг/г по 58 г або 116 г у контейнерах (балонах) алюмінієвих; по 1 контейнеру (балону) у пачці з картону	ТОВ "Мультіспрей"	Україна	ТОВ "Мультіспрей"	Україна	UA/15317/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1849	ПАНТЕНОЛ	Dexpanthenol	таблетки по 100 мг; по 20 або 50, або 100 таблеток у скляному флаконі; по 1 флакону в картонній пачці	ТОВ "МІБЕ УКРАЇНА"	Україна	мібе ГмбХ Арцнаймітель	Німеччина	UA/11523/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
1850	ПАНТЕНОЛ-ЗДОРОВ'Я	Dexpanthenol	крем для зовнішнього застосування, 5 % по 15 г або по 30 г, або по 100 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/19009/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1851	ПАНТЕНОЛ-ЗДОРОВ'Я	Dexpanthenol	крем для зовнішнього застосування, 5 % по 15 г або по 30 г, або по 100 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/19009/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1852	ПАНТЕНОЛ-ЗДОРОВ'Я АЕРОЗОЛЬ	Dexpanthenol	піна нашкірна, 50 мг/г, по 58,5 г або по 117,0 г у балоні з клапаном-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 балону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/19009/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1853	ПАНТЕНОЛ-ЗДОРОВ'Я ПЛЮС	Chlorhexidine, combinations	крем по 20 г, або по 40 г, або по 100 г у тубі, по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/19323/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1854	ПАНТЕНОЛ-ЗДОРОВ'Я ПЛЮС	Chlorhexidine, combinations	крем; по 40 г або по 100 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/19323/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1855	ПАНТЕНОЛ-ТЕВА	Dexpanthenol	мазь 5 % по 35 г мазі у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (випуск серії; виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості)	Німеччина	UA/7142/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття – 12 місяців.
1856	ПАНТЕНОЛ АЕРОЗОЛЬ	Dexpanthenol	піна нашкірна, 50 мг/г; по 58 г або 116 г в контейнері; по 1 контейнеру у пачці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/8333/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1857	ПАНТЕНОЛ ПЛЮС	Chlorhexidine, combinations	крем, по 30 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/16958/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1858	ПАНТЕНОЛ ПЛЮС	Chlorhexidine, combinations	спрей нашкірний, розчин по 30 мл у флаконі, по 1 флакону у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/17308/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1859	ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ	Dexpanthenol	піна нашкірна, 4,63 г/100 г; по 130 г у контейнері під тиском; по 1 контейнеру в картонній коробці	ТОВ "БАУШ ХЕЛС"	Україна	Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ (Відповідальний за випуск серій)/АСМ Аеросол-Сервіс АГ (Виробництво bulk, пакування, контроль якості)/Бауш + Ломб Ірланд Лімітед (Відповідальний за випуск серій)	Німеччина/ Швейцарія/Ірландія	UA/4438/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С.
1860	ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ	Dexpanthenol	піна нашкірна, 4,63 г/100 г; по 130 г у контейнері під тиском; по 1 контейнеру в картонній коробці	ТОВ "БАУШ ХЕЛС"	Україна	Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ (Відповідальний за випуск серій)/АСМ Аеросол-Сервіс АГ (Виробництво bulk, пакування, контроль якості)/Бауш + Ломб Ірланд Лімітед (Відповідальний за випуск серій)	Німеччина/ Швейцарія/Ірландія	UA/4438/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С.
1861	ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ®	Comb drug	гель по 15 г або 30 г у тубі, по 1 тубі в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/1602/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1862	ПАНТОГАР	Comb drug	капсули, по 15 капсул у блістері; по 6 блістерів у картонній коробці	Мерц Фармасьютікалс ГмбХ	Німеччина	Асіно Фарма АГ (первинне та вторинне пакування; виробництво in bulk; випробування контролю якості та випуск серії)/Єврофінс БіоФарма Продакт Тестінг Світзерленд АГ (випробування контролю якості)/Інститут Кульман ГмбХ (випробування контролю якості)	Швейцарія/ Швейцарія/ Німеччина	UA/10445/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1863	ПАНТОКРИН	Comb drug	екстракт рідкий, спиртовий, по 50 мл у флаконі скляному або полімерному з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/3237/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1864	ПАПАВЕРИН	Papaverine	супозиторії по 20 мг, по 5 супозиторіїв у блістері, по 2 блістери у картонній упаковці	Фарміна Лтд	Польща	Фарміна Лтд	Польща	UA/17524/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1865	ПАПАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	Comb drug	таблетки по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/6207/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

1866	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	капсули по 325 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/11685/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1867	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	капсули по 500 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2 блістери у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/11685/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1868	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	сироп, 120 мг/5 мл; по 90 мл у банці; по 1 банці разом з дозуючою скляночкою в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/11525/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого розкриття упаковки препарат придатний протягом 3 місяців. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1869	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	супозиторії ректальні по 0,08 г; по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/5984/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1870	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	супозиторії ректальні по 0,17 г; по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/5984/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1871	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	супозиторії ректальні по 0,33 г; по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/5984/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1872	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	супозиторії ректальні по 150 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/13185/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1873	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	супозиторії ректальні по 80 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/13185/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

1874	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	таблетки по 200 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна/ Україна	UA/8334/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1875	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	таблетки по 200 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5877/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1876	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	таблетки по 325 мг; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 5 або 10 блістерів у пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/17677/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1877	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг, по 2 таблетки у блістері; по 70 блістерів у коробці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 5 блістерів у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/20020/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1878	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 500 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону; по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/20774/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1879	ПАРАЦЕТАМОЛ	Paracetamol	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 500 мг; по 10 таблеток у блістері, по 1, 2, 5 або 10 блістерів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/20774/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1880	ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ	Paracetamol	таблетки по 200 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 або по 10 контурних чарункових упаковок у пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/4369/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1881	ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ	Paracetamol	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/4369/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1882	ПАРАЦЕТАМОЛ БЕБІ	Paracetamol	суспензія оральна 120 мг/5 мл; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з дозуючим пристроєм у картонній коробці; по 5 мл у саше; по 20 саше у картонній коробці; по 10 мл у саше; по 20 саше у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/11577/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1883	ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ ДІТЕЙ	Paracetamol	сироп, 120 мг/5 мл по 50 мл у флаконі скляному або полімерному, по 1 флакону разом з дозувальною ложкою в пачці; по 100 мл у флаконі скляному або у банці полімерній, по 1 флакону або банці разом з дозувальною ложкою в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/2514/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після розкриття флакону термін придатності препарату 30 діб при температурі 20-25 оС.
1884	ПАРАЦЕТАМОЛ ЕКСТРА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки шипучі; по 2 таблетки у стрипі; по 6 стрипів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/17041/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1885	ПАРАЦЕТАМОЛ СОЛЮБЛ	Paracetamol	таблетки шипучі, 500 мг по 2 таблетки у стрипі; по 6 стрипів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/17144/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1886	ПАРАЦИТРОН	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 13,60 г в саше; по 10 саше в пачці	ТОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/20333/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1887	ПАРАЦИТРОН	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 13,60 г в саше; по 10 саше в пачці	ТОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/20333/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1888	ПАСТА РОЗЕНТАЛЯ	Comb drug	суміш по 50 г у флаконах	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/0701/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1889	ПЕКТОЛВАН® А ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ЯГІД	Ambroxol	сироп 15 мг/5 мл, по 100 мл у скляному флаконі; по 1 флакону з дозуючим шприцом в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/17729/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Термін придатності лікарського засобу після першого відкриття первинної упаковки – 180 днів. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1890	ПЕКТОЛВАН® А ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ	Ambroxol	сироп 30 мг/5 мл, по 100 мл у скляному флаконі; по 1 флакону з дозувальною ложкою в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/17730/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності препарату після першого відкриття первинної упаковки — 180 днів. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1891	ПЕКТОЛВАН® ПЛЮЩ	Hederae helicis folium	капсули по 52,5 мг; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/15403/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1892	ПЕКТОЛВАН® ПЛЮЩ	Hederae helicis folium	сироп, по 100 мл у флаконі скляному брунатного кольору; по 1 флакону разом з ложкою дозувальною/дозуючою у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/9396/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття флакону 90 діб.
1893	ПЕКТОЛВАН® СТОП	Cough suppressants and expectorants	краплі оральні по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/10685/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1894	ПЕКТОЛВАН® ФІТО ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ	Comb drug	екстракт рідкий по 25 мл або по 50 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак" (фасування, пакування і маркування із "in bulk" фірми-виробника "Phytopharm Klenka S.A.", Польща)	Україна	UA/8259/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1895	ПЕКТОЛВАН® Ц	Comb drug	сироп по 100 мл у флаконі скляному брунатного кольору; по 1 флакону разом з ложкою дозувальною/дозуючою у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/10675/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не охолоджувати. Термін придатності після розкриття флакона 60 діб при температурі не вище 25 °С. Не охолоджувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1896	ПЕЛОРСІН	Pelargonii radix**	розчин оральний, 800 мг/1 г розчину, по 20 мл або 25 мл або 50 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16343/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
1897	ПЕНЦИКЛОВІР-ЗДОРОВ'Я	Penciclovir	крем, 10 мг/ г по 5 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/17778/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1898	ПЕНЦИКЛОВІР-ФІТОФАРМ	Penciclovir	крем 1 %, по 5 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/ випробування серії)	Україна	UA/14731/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1899	ПЕРЕКИС - ВІШФА	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування 3 %; по 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл або по 200 мл у флаконах полімерних	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16887/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 С у захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.
1900	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування 3 % по 40 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконах полімерних, по 40 мл у флаконі скляному або по 100 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону в коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/11686/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1901	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування 3 % по 40 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 40 мл у флаконах; по 100 мл у флаконах	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/0587/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1902	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування 3 %, по 40 мл, або по 100 мл, або по 200 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/2695/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС у захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1903	ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 %	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування 3 % по 50 мл у флаконах скляних, по 100 мл у банках полімерних або флаконах полімерних, по 200 мл у флаконах полімерних	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/6318/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1904	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування 3 % по 25 мл, 40 мл, 100 мл, 200 мл у флаконах скляних; по 40 мл, 100 мл, 200 мл у флаконах полімерних; по 30 мл, 50 мл у флаконах полімерних з розпилювачем; по 30 мл, 50 мл у флаконах полімерних з розпилювачем; по 1 флакону в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)/ТОВ "Фарма Черкас" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8214/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1905	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування, водний 3 % по 100 мл, 110 мл, 120 мл, 200 мл у флаконах скляних або полімерних; по 50 мл, 100 мл у флаконах полімерних з розпилювачем	ТОВ "Славія 2000"	Україна	ТОВ "Славія 2000"	Україна	UA/7039/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1906	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування, водний 3 % по 40 мл, або 100 мл, або по 200 мл у флаконах скляних або полімерних; або 100 мл або по 200 мл у флаконах полімерних, укупорені кришками з насадкою; по 100 мл у флаконі полімерному, укупореному кришкою з насадкою; по 1 флакону в пачці; по 40 мл або 100 мл у флаконах скляних або полімерних; по 1 флакону в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7655/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1907	ПЕРМЕТРИН	Permethrin	розчин нашкірний 0,5 % по 50 г у флаконі; по 1 флакону в пачці	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/3417/02/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.

1908	ПЕРМЕТРИН	Permethrin	спрей 0,5 % по 50 г у балоні з клапаном насосного типу та розпилювачем; по 1 балону в пачці	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/3417/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.
1909	ПЕРМЕТРИНОВА МАЗЬ 4 %	Permethrin	мазь 4 %; по 40 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	ТОВ "ЛМП"	Латвія	ТОВ "ЛМП"	Латвія	UA/3181/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у щільно закупореній упаковці. Лікарський засіб шкідливий для всіх видів комах, а також для водної флори і фауни (риба, водорості, дафнії). Не допускати потрапляння в акваріум. Не викидайте лікарський засіб у стічні води або побутові відходи. Запитайте фармацевта, як викидати лікарський засіб, який ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть захистити довкілля.
1910	ПЕРСЕН®	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери у картонній коробці	Зентіва, к.с.	Чеська Республіка	СОФАРМА АД	Болгарія	UA/9536/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1911	ПЕРСЕН® ФОРТЕ	Comb drug	капсули тверді по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Зентіва, к.с.	Чеська Республіка	Адіфарм ЕАД	Болгарія	UA/2838/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1912	ПЕРТУСИН	Comb drug	сироп по 100 г у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону; по 100 г у флаконах; по 200 г у флаконах з насадкою або без насадки; по 1 флакону у пачці з картону; по 200 г у флаконах з насадкою або без насадки	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7656/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

1913	ПЕРТУСИН	Comb drug	сироп, по 100 г у флаконах або банках; по 100 г у флаконі або банці; по 1 флакону або банці у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/0749/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1914	ПЕРТУСИН	Comb drug	сироп, по 100 г у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками, по 1 флакону у пачці з картону; по 100 г у флаконах полімерних в комплекті з кришками, по 1 флакону у пачці з картону; по 100 г у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками; по 100 г у флаконах полімерних в комплекті з кришками; по 200 г у флаконах полімерних в комплекті з кришками з насадкою або без насадки, по 1 флакону у пачці з картону; по 200 г у флаконах полімерних в комплекті з кришками з насадкою або без насадки	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7656/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

1915	ПЕРТУСИН	Comb drug	сироп, по 50 г або по 100 г у флаконах; по 100 г або по 200 г у флаконах з контролем першого відкриття; по 200 г у флаконах з контролем першого відкриття; по 1 флакону в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/0887/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!
1916	ПЕРТУСИН	Comb drug	сироп, по 50 г або по 100 г у флаконах; по 100 г або по 200 г у флаконах з контролем першого відкриття; по 200 г у флаконах з контролем першого відкриття; по 1 флакону в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/0887/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!
1917	ПЕРТУСИН	Comb drug	сироп, по 50 г або по 100 г у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці з картону; по 100 г або по 200 г у флаконі полімерному; по 1 флакону полімерному в пачці з картону; по 50 г або по 100 г у флаконах скляних	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8883/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!
1918	ПЕРЦЮ ВОДЯНОГО ЕКСТРАКТ	Polygonum hydropiper**	екстракт рідкий для перорального застосування, спиртовий, по 25 мл у флаконах-крапельницях у пачці або без пачки	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/4341/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1919	ПЕРЦЮ ВОДЯНОГО ЕКСТРАКТ	Polygonum hydropiper**	екстракт рідкий по 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 25 мл або по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 мл або по 50 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями та кришками; по 25 мл або по 50 млу флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками; по 25 мл або по 50 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0365/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1920	ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА	Capsicum annuum**	настойка по 20 мл або 25 мл, або по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками і кришками; по 20 мл або 25 мл, або по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками-крапельницями і кришками; по 50 мл у флаконах полімерних, укупорених кришками; по 20 мл або 25 мл, або по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками-крапельницями та кришками, по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробкою та кришкою, по 1 флакону в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7959/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1921	ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА	Capsicum annuum**	настойка по 20 мл або по 25 мл або по 50 мл у флаконах; по 50 мл у флаконі по 1 флакону в пачці з картону; по 20 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 20 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці; по 25 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 25 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7959/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1922	ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА	Capsicum annuum**	настойка по 50 мл у флаконах скляних або полімерних	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8260/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1923	ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА	Capsicum annuum**	настойка по 50 мл у флаконах скляних або полімерних	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8260/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1924	ПЕФРАКЕЛЬ D5	Mono	краплі для перорального та місцевого застосування по 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в картонній пачці	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/11526/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці.
1925	ПІАРОН	Paracetamol	суспензія оральна, 120 мг/5 мл; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною скляночкою у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/9270/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1926	ПІАРОН	Paracetamol	таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ" (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або вторинне пакування, контроль якості, випуск серії продукції із in bulk)/КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або вторинне пакування,	Україна/ Індія/ Україна	UA/9270/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1927	ПІАРОН РАПІД	Paracetamol	таблетки шипучі по 500 мг, по 4 таблетки у багатошаровому стрипі, по 4 стрипи в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20762/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1928	ПІАРОН ФОРТЕ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки шипучі по 500 мг/65 мг по 4 таблетки у стрипі; по 3 стрипи у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20607/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1929	ПІАСКЛЕДИН® 300	Avocado and soyabean oil, unsaponifiables	капсули; по 15 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери в коробці з картону	Лабораторуар Експансьєнс	Франція	Лабораторуар Експансьєнс	Франція	UA/13173/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1930	ПІВОНІЇ НАСТОЙКА	Paeonia**	настойка по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці з картону; по 100 мл у банці; по 1 банці в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/9246/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1931	ПІВОНІЇ НАСТОЙКА	Paeonia**	настойка по 50 мл у флаконах скляних або полімерних	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/3110/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1932	ПІВОНІЇ НАСТОЙКА	Paeonia**	настойка, по 100 мл у флаконах або банках	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/1517/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1933	ПІВОНІЇ НАСТОЙКА	Paeonia**	настойка, по 50 мл або 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 50 або по 100 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8490/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1934	ПІВОНІЇ НАСТОЙКА	Paeonia**	настойка; по 50 мл, 100 мл або 110 мл у флаконах	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/19130/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

1935	ПІКЛОПТИК	Picloxydine	краплі очні, розчин, 0,5 мг/мл, по 10 мл у флаконі з пробкою-крапельницею та картонній пачці	ЕлЕлСі Ромфарм Компані Джорджия	Грузія	К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ С.Р.Л. (Виробництво, первинне пакування, контроль фізико-хімічних показників лікарського засобу та випуск серії; вторинне пакування та контроль мікробіологічних показників лікарського засобу)	Румунія	UA/20378/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
1936	ПІКОВІТ®	Comb drug	сироп по 150 мл сиропу у флаконі, по 1 флакону разом з мірною ложкою у картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії) / КРКА, д.д., Ново место (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здрав’є, околє ін храно) (контроль серії)	Словенія/ Словенія/ Словенія	UA/8268/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії світла. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1937	ПІКОВІТ®	Multivitamins and other minerals, incl. combinations	таблетки, вкриті оболонкою, по 15 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку; відповідальний за контроль серії) / КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за контроль серії) / КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за контроль та випуск серії)/НЛЗОХ (Національні лабораторія за здрав'є, околє ін храно) (відповідальний за контроль серії)	Словенія/ Словенія/ Словенія/ Словенія	UA/8268/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії світла та вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1938	ПІКОВІТ® ФОРТЕ	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку) / КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за контроль серій) / КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за контроль та випуск серій)/Нешінал Лабораторі оф Хелс, Інваромент Енд Фуд (відповідальний за контроль та випуск серій)	Словенія/ Словенія/ Словенія/ Словенія	UA/8268/02/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії світла та вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1939	ПІКОЛАКС®	Sodium picosulfate	краплі оральні 0,75 % по 15 мл або 30 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/1522/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1940	ПІКОЛАКС®	Sodium picosulfate	таблетки по 5 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/11778/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1941	ПІКОЛАКС®	Sodium picosulfate	таблетки по 7,5 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 3 блістери в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/11778/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1942	ПІКОМАГ®	Sodium picosulfate	капсули м’які по 7,5 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/21307/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1943	ПІКОНОРМ®	Sodium picosulfate	краплі оральні, розчин по 7,5 мг/мл по 10 мл або по 15 мл, або по 30 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону з крапельницею в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/12904/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Термін придатності після відкриття флакона – 28 днів.
1944	ПІКОСЕН®	Comb drug	капсули, по 10 капсул у блістері, по 1 або 3 блістери у пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18541/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1945	ПІКОСЕН®	Sodium picosulfate, combinations	капсули, по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18541/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1946	ПІКОСЕН®	Comb drug	краплі оральні по 15 мл або по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/11154/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1947	ПІКОСЕН® МІКРА	Docusate sodium	гель ректальний 0,12 г/10 г по 10 г у тубі-канюлі по 6 туб-канюль у пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18619/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1948	ПІЛОЗЕЛЛА КОМПОЗИТУМ	Comb drug	краплі оральні по 30 мл у флаконі-крапельниці по 1 флакону в картонній коробці	Гуна С.п.а.	Італія	Гуна С.п.а.	Італія	UA/4540/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 оС.

1949	ПІМАФУЦИН®	Natamycin	крем, 20 мг/г по 30 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці	ЧЕПЛАФАРМ Арцнаймітель ГмбХ	Німеччина	Теммлер Італіа С.р.л.	Італія	UA/4370/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не зберігати у холодильнику чи морозильнику. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1950	ПІМАФУЦИН®	Natamycin	супозиторії вагінальні по 100 мг; по 3 супозиторії у стрипі; по 1 або по 2 стрипи у картонній пачці	ЧЕПЛАФАРМ Арцнаймітель ГмбХ	Німеччина	Теммлер Італіа С.р.л.	Італія	UA/4370/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1951	ПІНОВІТ®	Comb drug	краплі назальні; по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/6606/02/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1952	ПІРАНТЕЛ	Pyrantel	суспензія оральна, 250 мг/5 мл по 15 мл препарату у флаконі або банці; по 1 флакону або банці з мірною ложкою у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна/ Україна	UA/6151/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1953	ПІРАНТЕЛ	Pyrantel	таблетки по 250 мг, по 3 таблетки у блістері; по 1 блістеру у картонній упаковці; по 3 таблетки у блістері; по 1 блістеру у картонній упаковці; по 10 упаковок у картонній коробці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	Кусум Хелтхкер Пвт Лтд (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (вторинне пакування, контроль якості випуск серії з продукції in bulk)	Індія/ Україна	UA/6151/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1954	ПІРАНТЕЛ ПОЛЬФАРМА	Pyrantel	суспензія оральна, 250 мг/5 мл; по 15 мл у флаконі; по 1 флакону і міркою з поділками в картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. (Виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль серії; випуск серії)	Польща	UA/9225/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Після відкриття флакона зберігати зі щільно закритою кришкою протягом 21 доби. Лікарський засіб не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

1955	ПЛАНТАГЛЮЦИД-ЗДОРОВ'Я	Plantago**	гранули для орального розчину, 1 г/2 г; № 20: по 2 г у спареному пакеті з паперу з поліетиленовим покриттям або з алюмокомплексу; по 10 спарених пакетів у картонній коробці; № 25: по 2 г у спареному пакеті з паперу з поліетиленовим покриттям або з алюмокомплексу; по 12 спарених пакетів + 1 пакет (з 2 г гранул) у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/4695/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1956	ПЛЮЩА СИРОП	Hederae helicis folium	сироп по 100 мл або по 200 мл у флаконах скляних або полімерних; по 1 флакону у пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/16241/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1957	ПОВИДИН	Povidone-iodine	супозиторії вагінальні по 0,3 г; по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону; по 7 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/3798/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1958	ПОВІДОН-ЙОД	Povidone-iodine	лінімент 10 % по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/7317/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1959	ПОВІДОН-ЙОД ВАЮМ	Povidone-iodine	розчин нашкірний 100 мг/мл, по 30 мл, 50 мл, 100 мл у флаконі; по 50 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в пачці; 500 мл у флаконі	ТОВ "ВАЮМ-ФАРМ"	Україна	ТзОВ "ЄЛАДУМ ФАРМА"	Республіка Молдова	UA/19240/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1960	ПОДОРОЖНИКА ВЕЛИКОГО ЛИСТЯ	Plantago**	листя по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2263/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.
1961	ПОДОРОЖНИКА СИРОП	Plantago**	сироп; по 100 мл або по 200 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону з мірним стаканчиком або без стаканчика в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/16152/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття флакона – 3 місяці.
1962	ПОДОРОЖНИКА СІК	Plantago**	рідина оральна, по 100 мл у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/4624/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1963	ПОЛИНУ ГІРКОГО ТРАВА	Artemisia absinthium**	трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2264/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.
1964	ПОЛИНУ ГІРКОГО ТРАВА	Artemisia absinthium**	трава, по 50 г або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/5879/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
1965	ПОЛИНУ НАСТОЙКА	Artemisia absinthium**	настойка по 25 мл у флаконах-крапельницях; по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8647/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1966	ПОЛИНУ НАСТОЙКА	Artemisia absinthium**	настойка, по 25 мл у флаконах скляних, укупорених пробками або пробками-крапельницями і кришками; по 25 мл у флаконі скляному, укупореному пробками або пробками-крапельницями і кришками, по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками-крапельницями і кришками; по 50 мл у флаконі скляному, укупореному пробками-крапельницями і кришками, по 1 флакону в пачці; по 25 мл або по 50 мл у флакони полімерні, укупорені пробками-крапельницями та кришками; по 25 мл або по 50 мл у флакони полімерні, укупорені пробками-крапельницями та кришками в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2264/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається утворення осаду.
1967	ПОЛІФІТОЛ-1	Comb drug	настойка для перорального застосування по 100 мл у банці; по 1 банці в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8925/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1968	ПОРТАЛАК	Lactulose	сироп, 667 мг/мл; по 250 мл або по 500 мл у флаконі з кришкою та з мірним стаканчиком; по 1 флакону в картонній пачці	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	Белупо, ліки та косметика, д.д.	Хорватія	UA/14086/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не заморожувати в зв’язку зі здатністю лактулози до кристалізації.
1969	ПОСТЕРИЗАН	Mono	мазь; по 25 г у тубі алюмінієвій з аплікатором; по 1 тубі в картонній пачці	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	UA/4864/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.
1970	ПОСТЕРИЗАН	Mono	супозиторії; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в картонній пачці	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	UA/4864/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.
1971	ПОСТЕРИЗАН ФОРТЕ	Comb drug	мазь; по 25 г у тубі алюмінієвій з аплікатором; по 1 тубі в картонній пачці	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	UA/4864/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.
1972	ПОСТЕРИЗАН ФОРТЕ	Comb drug	супозиторії; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в картонній пачці	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	UA/4864/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.
1973	ПОСТИНОР	Levonorgestrel	таблетки по 0,75 мг, по 2 таблетки в блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці	ВАТ "Гедеон Ріхтер"	Угорщина	ВАТ "Гедеон Ріхтер"	Угорщина	UA/6112/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Препарат зберігати у недоступному для дітей місці!

1974	ПРЕФЕМІН	Agni casti fructus	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг; по 30 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери в картонній коробці	Амакса Лтд	Велика Британія	Макс Целлєр Зьоне АГ (виробництво, пакування, контроль якості та випуск серій)/Лабор Цоллінгер АГ (контроль якості)/Інтерлабор Белп АГ (контроль серій)	Швейцарія/ Швейцарія/ Швейцарія	UA/14671/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1975	ПРЕФЕМІН	Agni casti fructus	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг; по 30 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери в картонній коробці	Амакса Лтд	Велика Британія	Макс Целлєр Зьоне АГ (виробництво, пакування, контроль якості та випуск серій)/Лабор Цоллінгер АГ (контроль якості)/Інтерлабор Белп АГ (контроль серій)	Швейцарія/ Швейцарія/ Швейцарія	UA/14671/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1976	ПРИОРА	Docosanol	крем, 100 мг/1 г по 2 г або 5 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Дендрон Брендс Лімітед	Велика Британія	UA/9636/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці! Після першого відкриття туби, термін придатності: 6 місяців.
1977	ПРИСИПКА ДИТЯЧА	Zinc oxide*	порошок нашкірний, 0,1 г/г по 40 г або 50 г у банках	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/3599/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
1978	ПРИСИПКА ДИТЯЧА	Zinc oxide*	порошок по 50 г у банці пластмасовій; по 1 банці в пачці з картону; по 50 г у контейнерах полімерних	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/4889/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1979	ПРИЧЕПИ ТРАВА	Bidens tripartia**	трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2265/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.
1980	ПРИЧЕПИ ТРАВА	Bidens tripartia**	трава по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/9087/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 оС до 15 оС не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці!
1981	ПРИЧЕПИ ТРАВА	Bidens tripartia**	трава, по 40 г або 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8286/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1982	ПРОАЛОР	Comb drug	таблетки; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці; по 24 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 10 таблеток у блістерах	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/7974/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1983	ПРОКТАН®	Comb drug	мазь по 30 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "ФАРМА ЛАЙФ"	Україна	ПАТ "ХФЗ "Червона зірка" (виробництво і первинне пакування, включаючи контроль якості)/ТОВ "ФАРМА ЛАЙФ" (вторинне пакування і відповідальний за випуск серії)	Україна/ Україна	UA/12464/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС в оригінальній упаковці, в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
1984	ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ	Other preparations, combinations	крем ректальний по 30 г крему у тубі; по 1 тубі у комплекті з насадкою у картонній пачці	Рекордаті Аіленд Лтд	Ірландія	Рекордаті Індастріа Хіміка е Фармасевтіка С.п.А./ВАМФАРМА С.Р.Л.	Італія/ Італія	UA/4678/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С.
1985	ПРОКТОЗАН®НЕО	Comb drug	мазь ректальна; по 20 г мазі у тубі; по 1 тубі з аплікатором у картонній коробці	"Хемофарм" АД	Республіка Сербія	"Хемофарм" АД (контроль серії, дозвіл на випуск серії)/"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії)	Республіка Сербія/Республіка Сербія	UA/4645/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

1986	ПРОКТОЗАН®НЕО	Comb drug	супозиторії ректальні по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістера у картонній коробці	"Хемофарм" АД	Республіка Сербія	"Хемофарм" АД (контроль серії, дозвіл на випуск серії)/"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії)/ТОВ "ФЗ "СТАДА" (виробництво за повним циклом)	Республіка Сербія/Республіка Сербія/Україна	UA/4645/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці (для захисту від світла та вологи). Зберігати у недоступному для дітей місці.
1987	ПРОПОЛІС	Propolis*	супозиторії по 0,1 г, по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/7793/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1988	ПРОПОЛІСУ НАСТОЙКА	Propolis*	настойка по 25 мл або по 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконах полімерних; по 100 мл у флаконі скляному або полімерному, по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/19030/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1989	ПРОПОЛІСУ НАСТОЙКА	Propolis*	настойка по 25 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону; по 25 мл у флаконі	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/5422/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

1990	ПРОПОЛІСУ НАСТОЙКА	Propolis*	настойка, по 25 мл у флаконах-крапельницях; по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/0627/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1991	ПРОПОСОЛ	Propolis*	аерозоль по 50 г у балоні аерозольному алюмінієвому, по 1 балону з розпилювачем в пачці з картону	АТ "Стома"	Україна	АТ "Стома"	Україна	UA/1261/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.
1992	ПРОПОСОЛ-ЗДОРОВ'Я	Propolis*	спрей для ротової порожнини по 25 г у балоні; по 1 балону з насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком у коробці з картону; по 50 г у флаконі; по 1 флакону з оральним розпилювальним пристроєм та захисним ковпачком у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/8215/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1993	ПРОПОСОЛ-КМ	Propolis*	спрей для ротової порожнини, по 25 г у балоні; по 1 балону з розпилювачем та захисним ковпачком у пачці з картону	АТ "СТОМА"	Україна	АТ "СТОМА"	Україна	UA/1261/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

1994	ПРОПОСОЛ-Н	Propolis*	спрей для ротової порожнини, по 20 г або по 60 г у контейнері з механічним насосом; по 1 контейнеру разом з розпилювачем та захисним ковпачком у пачці з картону	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/7820/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Запобігати дії прямих сонячних променів. Не розпилювати біля вогню.
1995	ПРОПРОТЕН-100	Mono	таблетки по 20 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/3646/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1996	ПРОСПАН® КРАПЛІ ВІД КАШЛЮ	Hederae helicis folium	краплі, 20 мг/мл по 20 або по 50, або по 100 мл у флаконі з пробкою крапельницею; по 1 флакону в картонній коробці	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/0672/04/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття флакона – 6 місяців. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
1997	ПРОСПАН® ПАСТИЛКИ ДЛЯ РОЗСМОКТУВАННЯ ВІД КАШЛЮ	Hederae helicis folium	пастилки для розсмоктування по 26 мг; по 10 пастилок у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ (первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Болдер Арцнаймітель ГмбХ і Ко. КГ (виробник in bulk)	Німеччина / Німеччина	UA/0672/05/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в захищеному від вологи місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
1998	ПРОСПАН® РОЗЧИН ВІД КАШЛЮ	Hederae helicis folium	розчин оральний, 35 мг/5 мл по 5 мл розчину орального у стику; по 21 або 30 стиків у картонній коробці	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/0672/03/01	Зберігати при температурі не вище 25 С у недоступному для дітей місці.

1999	ПРОСПАН® СИРОП ВІД КАШЛЮ	Hederae helicis folium	сироп, по 100 мл, 200 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті з мірною чашкою в картонній коробці	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко.КГ	Німеччина	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ (Виробництво, пакування, контроль якості, випуск серії)/Ліхтенхельдт ГмбХ Фармацевтична фабрика (Первинне пакування, вторинне пакування)	Німеччина / Німеччина	UA/0672/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. У процесі зберігання можливе легке помутніння та незначна зміна присмаку сиропу, що не впливає на терапевтичні властивості препарату. Після розкриття упаковки препарат можна застосовувати протягом 6 місяців.
2000	ПРОСПАН® ФОРТЕ ТАБЛЕТКИ ШИПУЧІ ВІД КАШЛЮ	Hederae helicis folium	таблетки шипучі по 65 мг по 1 таблетці у саше; по 2 саше сполучені в перфорований стрип; по 5 або 10 стрипів у картонній коробці	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Енгельгард Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ (виробник відповідальний за випуск серії)/ГЕРМЕС ФАРМА ГмбХ (виробник in bulk, первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Німеччина	UA/12942/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2001	ПРОСТАЛАД	Comb drug	настойка для перорального застосування по 100 мл у флаконі або у банці із скломаси; по 1 флакону або банці в пачці з картону ; по 100 мл у флаконі або у банці полімерній; по 1 флакону або банці в пачці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/1194/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2002	ПРОСТАМЕД	Comb drug	таблетки, по 60, або 120, або 200 таблеток у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/6931/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Зауваження. Побіління або поява нальоту на поверхні таблеток не свідчить про зниження якості препарату. Це спричинено ліпідним окисленням, зумовленим наявністю какао у препараті Простамед. Побіління і наліт зникають при легкому нагріванні таблеток і стосуються тільки зовнішнього вигляду препарату.
2003	ПРОСТАПЛАНТ	Sabalis serrulatae fructus	капсули по 320 мг, по 10 капсул у блістері; 3 блістери в картонній коробці або 20 капсул у блістері; 2 блістери в картонній коробці	Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/4372/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.
2004	ПРОСТАТИЛЕН-ЦИНК	Comb drug	супозиторії ректальні по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/7223/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2005	ПРОСТАТИЛЕН ®	Mono	супозиторії ректальні по 0,03 г по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/0800/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

2006	ПРОСТАТОН	Comb drug	гранули по 10 г гранул у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/3827/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
2007	ПРОСТАТОФІТ	Comb drug	настойка складна по 100 мл у банці скляній; по 1 банці в пачці; по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці в пачці; по 100 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону в пачці	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ"	Україна	UA/4204/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2008	ПРОТАРГОЛ	Protargol*	краплі назальні/вушні, розчин 0,5 %; по 10 мл у скляному флаконі з кришкою-піпеткою; по 1 флакону в картонній упаковці	Хімічно-Фармацевтична лабораторія А. СЕЛЛА С.Р.Л., Італія	Італія	ХІМІЧНО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "А. СЕЛЛА" С.Р.Л.	Італія	UA/15220/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін зберігання після розкриття упаковки становить 15 днів.
2009	ПРОТАРГОЛ	Protargol*	краплі назальні/вушні, розчин 1 %; по 10 мл у скляному флаконі з кришкою-піпеткою; по 1 флакону в картонній упаковці	Хімічно-Фармацевтична лабораторія А. СЕЛЛА С.Р.Л., Італія	Італія	ХІМІЧНО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "А. СЕЛЛА" С.Р.Л.	Італія	UA/15220/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін зберігання після розкриття упаковки становить 15 днів.

2010	ПРОТАРГОЛ	Protargol*	краплі назальні/вушні, розчин 2 %; по 10 мл у скляному флаконі з кришкою-піпеткою; по 1 флакону в картонній упаковці	Хімічно-фармацевтична лабораторія "А. Селла" с.р.л.	Італія	Хімічно-фармацевтична лабораторія "А. Селла" с.р.л.	Італія	UA/15220/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін зберігання після розкриття упаковки становить 15 днів.
2011	ПРОТАРГОЛ БЕБІ®	Protargol*	порошок для розчину для інтраназального застосування по 0,1 г 1 флакон з порошком у комплекті з розчинником по 10 мл (вода для ін'єкцій) в однодозовому контейнері з кришкою-крапельницею у коробці з картону; 1 флакон з порошком у комплекті з мірним пристроєм (мірна пробірка або мірний стакан) і кришкою-крапельницею у коробці з картону	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	ТОВ "Исток-Плюс" (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, відповідальний за випуск серії)/ТОВ "Юрія-Фарм" (виробник розчинника: виробництво, первинне пакування, маркування, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/15042/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Приготовлений розчин зберігати у холодильнику не більше 30 діб (при температурі від 2 до 8 °С).

2012	ПРОТАРГОЛ®	Protargol*	порошок для розчину для інтраназального застосування по 0,2 г, 1 флакон з порошком у комплекті з розчинником по 10 мл (вода для ін'єкцій) в однодозовому контейнері з кришкою-крапельницею у коробці з картону; 1 флакон з порошком у комплекті з розчинником по 10 мл (вода для ін'єкцій) в однодозовому контейнері з назальним розпилювачем у коробці з картону; 1 флакон з порошком у комплекті з мірним пристроєм (мірна пробірка або мірний стакан) і кришкою-крапельницею у коробці з картону; 1 флакон з порошком у комплекті з мірним пристроєм (мірна пробірка або мірний стакан) і назальним розпилювачем у коробці з картону	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	ТОВ "Исток-Плюс" (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, відповідальний за випуск серії)/ТОВ "Юрія-Фарм" (виробник розчинника: виробництво, первинне пакування, маркування, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/15042/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Приготовлений розчин зберігати у холодильнику не більше 30 діб (при температурі від 2 до 8 °С).

2013	ПРОТЕКОН®	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону; по 3 пачки у пачці з картону; по 30, 60 або 120 таблеток у контейнерах; по 1 контейнеру в пачці з картону	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед/Сага Лайфсаєнсиз Лімітед	Індія/Індія	UA/3347/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2014	ПСИЛО-БАЛЬЗАМ®	Diphenhydramine	гель 1 %, по 20 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	СТАДА Арцнаймітель АГ	Німеччина	СТАДА Арцнаймітель АГ	Німеччина	UA/6474/01/01	Зберігати при температурі не вище +25 °С у недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття: 12 місяців.
2015	ПСІ-СТАБІЛ СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні по 30 мл, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА Натурхайльміттель ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/13595/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2016	ПСІ-СТАБІЛ СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні по 30 мл, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА Натурхайльміттель ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/13595/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2017	ПСОРИНОХЕЛЬН	Comb drug	краплі оральні по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/6678/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

2018	ПСОРІАТЕН	Mono	мазь по 50 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	В. Шпітцнер Арцнаймittельфабрик ГмбХ (Виробник дозованої форми, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ (Виробник, відповідальний за випуск серії)	Німеччина / Німеччина	UA/3775/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.
2019	ПСОРІКАП®	Pyrithione zinc	крем, 2 мг/г по 30 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/6396/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2020	ПУЛЬМОБРІЗ®	Comb drug	порошок для оральної суспензії; по 2 г порошку в саше; по 10 або 20 саше у картонній упаковці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Сава Хелскеа Лтд/Медітоп Фармасьютікал Лтд.	Індія/ Угорщина	UA/10212/02/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2021	ПУЛЬМОБРІЗ®	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 9 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці; по 20 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній упаковці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Сава Хелскеа Лтд/Медітоп Фармасьютікал Лтд.	Індія/ Угорщина	UA/10212/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

2022	ПУЛЬМОЛОР®	Comb drug	порошок для оральної суспензії, 1 пляшка з порошком для приготування 60 мл або 100 мл суспензії разом з мірним засобом на кришечці з поліетилену в картонній упаковці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Сава Хелскеа Лтд/Медітоп Фармасьютікал Лтд.	Індія/ Угорщина	UA/10378/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після приготування суспензію зберігати 14 діб при температурі від 2 до 8 °С.
2023	ПУЛЬМОЛОР®	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній упаковці	Мові Хелс ГмбХ	Швейцарія	Сава Хелскеа Лтд/Медітоп Фармасьютікал Лтд.	Індія/ Угорщина	UA/10378/02/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2024	ПУЛЬМОЛОР®	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній упаковці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Сава Хелскеа Лтд/Медітоп Фармасьютікал Лтд.	Індія/ Угорщина	UA/10378/02/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2025	ПУСТИРНИК	Leonurus**	таблетки по 14 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери в пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/14854/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2026	ПУСТИРНИК-ВІШФА	Leonurus**	настойка для орального застосування, по 25 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16833/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2027	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	Leonurus**	настойка для внутрішнього застосування, по 25 мл або 100 мл у флаконах скляних, по 25 мл або по 100мл у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/7318/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2028	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	Leonurus**	настойка для орального застосування по 25 мл або по 50 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3425/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
2029	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	Leonurus**	настойка по 25 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8058/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2030	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	Leonurus**	настойка по 25 мл у флаконах	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8058/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2031	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	Leonurus**	настойка по 25 мл у флаконах-крапельницях скляних або у флаконах полімерних; по 25 мл у флаконі-крапельниці скляному або у флаконі полімерному; по 1 флакону-крапельниці скляному або флакону полімерному в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8404/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2032	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	Leonurus**	настойка по 25 мл у флаконах-крапельницях, по 30 мл у флаконах, по 30 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	UA/6767/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2033	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	Leonurus**	настойка по 25 мл у флаконах полімерних, по 50 мл у флаконах скляних	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Біолік"	Україна	UA/6768/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2034	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	Leonurus**	настойка по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 25 мл або по 50 мл у флаконах; по 25 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 25 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 50 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах полімерних, укупорених кришками з контролем першого розкриття; по 50 мл у флаконах полімерних, укупорених кришками з контролем першого розкриття; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками; по 50 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею та	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6543/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається випадання осаду.
2035	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	Leonurus**	настойка по 25 мл, 40 мл, 50 мл або 100 мл у флаконах	ПП "Кілафф"	Україна	ПП "Кілафф"	Україна	UA/12545/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.

2036	ПУСТИРНИКА ТРАВА	Leonurus**	трава по 50 г, 100 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8287/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.
2037	ПУСТИРНИКА ТРАВА	Leonurus**	трава, по 50 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2266/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.
2038	РАВІСОЛ®	Comb drug	настойка по 100 мл у банці; по 1 банці у пачці з картону; по 100 мл у флаконі полімерному або скляному; по 1 флакону в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/9617/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2039	РАНОСТОП®	Povidone-iodine	мазь 10 %; по 20 г або по 40 г, або по 100 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8650/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2040	РАНОСТОП®	Povidone-iodine	мазь 10 %; по 20 г або по 40 г, або по 100 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8650/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2041	РАНОСТОП®	Povidone-iodine	розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % по 50 мл або 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8650/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2042	РАПІМАКС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у картонній упаковці	ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД	Індія	Бафна Фармасьютікалс Лтд.	Індія	UA/10268/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС, у недоступному для дітей місці.

2043	РАПІМАКС ФОРТЕ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у картонній упаковці	ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД	Індія	Бафна Фармасьютікалс Лтд.	Індія	UA/10270/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС, у недоступному для дітей місці.
2044	РАПІРА® 100	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 100 мг/0,5 г; по 0,5 г у саше; по 10 або 20 саше у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16428/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2045	РАПІРА® 200	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 200 мг/1 г по 1 г у саше; по 10 або 20 саше у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16428/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці
2046	РАПІРА® 600	Acetylcysteine	порошок для орального розчину по 600 мг, по 3,0 г у саше; по 6 або 10 саше у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/16428/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2047	РАПТЕН ГЕЛЬ	Diclofenac	гель 1 % по 40 г у тубі, по 1 тубі в картонній упаковці	"Хемофарм" АД	Сербія	"Хемофарм" АД, Вршац, відділ виробнича дільниця Шабац (виробник готового лікарського засобу, первинне, вторинне пакування, контроль серії)/"Хемофарм" АД (виробник, відповідальний за випуск серії)	Сербія/ Сербія	UA/1785/03/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2048	РАФАХОЛІН Ц	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці	Вроцлавське підприємство лікарських трав "ГЕРБАПОЛЬ" АТ	Польща	Вроцлавське підприємство лікарських трав "ГЕРБАПОЛЬ" АТ	Польща	UA/6770/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2049	РЕ-СОЛЬ	Comb drug	порошок для орального розчину, по 18,9 г порошку у пакеті; по 10 або 20 пакетів у коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/15043/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Готовий розчин зберігати у холодильнику при температурі 2–8 °С протягом 24 годин. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2050	РЕВІТ	Comb drug	драже по 75 або 100 драже у контейнерах	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/3353/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2051	РЕВІТ	Comb drug	драже, по 80 або по 100 драже у контейнерах; по 80 або по 100 драже у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/4068/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2052	РЕВІТ	Comb drug	драже, по 80 драже в контейнерах (баночках); по 80 драже в контейнері (баночці); по 1 контейнеру (баночці) у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/4680/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2053	РЕГІДРАТОН	Comb drug	порошок для орального розчину, по 9,45 г порошку у саше, по 20 саше в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/18964/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Готовий розчин зберігати у холодильнику при температурі 2–8 °С протягом 24 годин.
2054	РЕГІДРАТОН	Comb drug	порошок для орального розчину, по 9,45 г порошку у саше, по 20 саше в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/18964/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Готовий розчин зберігати у холодильнику при температурі 2–8 °С протягом 24 годин.
2055	РЕГІДРОН	Comb drug	порошок дозований по 18,9 г порошку у пакеті; по 20 пакетів у картонній коробці	Оріон Корпорейшн	Фінляндія	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює контроль якості і випуск серій)/ТОВ Рецифарм Паретс (виробник, що здійснює виробництво, пакування, контроль якості і випуск серій)	Фінляндія /Іспанія	UA/2065/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Готовий розчин зберігати у холодильнику при температурі 2–8 °С протягом 24 годин.

2056	РЕГІДРОН ОПТІМ	Comb drug	порошок для орального розчину по 10,7 г порошку у пакеті; по 20 пакетів у картонній коробці	Оріон Корпорейшн	Фінляндія	Оріон Корпорейшн (виробник, що здійснює контроль якості і випуск серій)/Ой Медфайлз Лтд (виробник, що здійснює контроль якості)/ТОВ Рецифарм Паретс (виробник, що здійснює виробництво, пакування, контроль якості та випуск серій)	Фінляндія / Фінляндія /Іспанія	UA/9267/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Готовий розчин зберігати у холодильнику при температурі 2–8 °С протягом 24 годин.
2057	РЕГІСОЛ® ІС	Comb drug	порошок для орального розчину по 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці з картону	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/14661/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Готовий розчин зберігати в холодильнику при температурі від +2 °С до +8 °С протягом 24 годин.
2058	РЕГУЛАКС® ПІКОСУЛЬФАТ КРАПЛІ	Sodium picosulfate	краплі оральні, розчин, 7,5 мг/мл, по 20 мл у флаконі-крапельниці, по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці	Кревель Мойзельбах ГмбХ	Німеччина	Кревель Мойзельбах ГмбХ	Німеччина	UA/2363/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2059	РЕДІ-ТУ-ЮЗ КЛІЗМА	Comb drug	розчин ректальний, 21,4 г/9,4 г в 118 мл, по 133 мл у пластиковій пляшці з наконечником анатомічної форми; по 1 пляшці у коробці з картону	Касен Рекордаті, С.Л.	Іспанія	Касен Рекордаті, С.Л.	Іспанія	UA/10995/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2060	РЕДІ-ТУ-ЮЗ КЛІЗМА	Comb drug	розчин ректальний, 21,4 г/9,4 г в 118 мл; по 133 мл у пластиковій пляшці; по 1 пляшці у коробці з картону	Касен Рекордаті, С.Л.	Іспанія	Касен Рекордаті, С.Л.	Іспанія	UA/10995/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2061	РЕЗІСТОЛ®	Pelargonii radix**	краплі оральні; по 20 мл або по 50 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/13789/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття упаковки – 3 місяці.
2062	РЕЗІСТОЛ®-ТАБ	Pelargonii radix**	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці	ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/19107/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2063	РЕКАРДИН ФОРТЕ	Comb drug	краплі оральні по 25 мл або 50 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/17915/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2064	РЕКУТАН	Matricaria chamomilla**	розчин по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/5120/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2065	РЕКУТАН®	Matricaria chamomilla**	рідина по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці; по 100 мл у банці; по 1 банці в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/8838/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2066	РЕЛАКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ	Comb drug	краплі оральні, по 25 мл або 50 мл у флаконах скляних або полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками полімерними	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	UA/19607/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Під час зберігання можливе випадання осаду. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2067	РЕЛАКСИЛ	Comb drug	капсули тверді; по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/5286/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2068	РЕЛІФ®	Phenylephrine	мазь ректальна, 2,5 мг/г; по 28,4 г в тубі; по 1 тубі разом з аплікатором у картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Фамар А.В.Е. Авлон Плант	Греція	UA/3173/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Розкриття туби і початок застосування препарату не впливає на термін придатності за умови щільного закриття її ковпачком щоразу після застосування. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2069	РЕЛІФ®	Phenylephrine	супозиторії ректальні по 5 мг; по 6 супозиторіїв у пластиковому стрипі; по 2 стрипи у картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Істітуто Де Анжелі С.р.л.	Італія	UA/3173/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Забороняється зберігати супозиторії із розкритою або відсутньою захисною пластиковою оболонкою.
2070	РЕЛІФ® АДВАНС	Benzocaine	мазь ректальна, 200 мг/г; по 28,4 г у тубі; по 1 тубі у комплекті з аплікатором у картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Фамар А.В.Е. Авлон Плант	Греція	UA/1953/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Розкриття туби і початок використання препарату не впливає на термін придатності за умови щільного закриття її ковпачком щоразу після застосування. Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2071	РЕЛІФ® АДВАНС	Benzocaine	супозиторії ректальні по 206 мг; по 6 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у картонній упаковці	ТОВ "Байєр"	Україна	Істітуто Де Анжелі С.р.л.	Італія	UA/7089/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат, якщо відсутня або ушкоджена захисна пластикова оболонка.
2072	РЕЛІФ® ПРО	Comb drug	супозиторії ректальні по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Істітуто де Анжелі С.р.л.	Італія	UA/10318/02/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2073	РЕЛІФ® УЛЬТРА	Comb drug	супозиторії ректальні; по 6 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Істітуто Де Анжелі С.р.л.	Італія	UA/1954/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

2074	РЕМАВІР	Rimantadine	капсули по 100 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці картонній	АТ "Олфа"	Латвія	АТ "Олфа"	Латвія	UA/3777/03/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2075	РЕМАВІР	Rimantadine	таблетки по 50 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній пачці	АТ "Олфа"	Латвія	АТ "Олфа"	Латвія	UA/3777/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2076	РЕМАНТАДИН-КР	Rimantadine	таблетки по 0,05 г, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/5426/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2077	РЕМЕНСУРО	Comb drug	капсули тверді по 10 капсул у блістері; по 3 або 6, або 12 блістерів у картонній коробці; по 20 капсул у блістері з лінією перфорації; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	ТОВ "ПЕРРІГО УКРАЇНА"	Україна	Омега Фарма Меньюфекчерінг ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/16305/01/01	Зберігати при температурі не вище 25° С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, що зазначений на блістерній і картонній упаковках. Термін придатності визначається останнім днем місяця.
2078	РЕМЕНЦИСТО	Arctostaphyos uva-ursi**	таблетки, вкриті плівковою оболонкою 864 мг, по 14 таблеток, вкритих плівковою оболонкою у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "ПЕРРІГО УКРАЇНА"	Україна	Ріхард Біттнер АГ	Австрія	UA/20569/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С.
2079	РЕМІСАР	Nimesulide	гель, 10 мг/г; по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/3980/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2080	РЕМІФЕМІН®	Cimicifugae rhizoma	таблетки по 20 таблеток у блістері, по 3 або по 5 блістерів у картонній коробці	Шапер & Брюммер ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Шапер & Брюммер ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/20470/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати блістер у картонній коробці для захисту від світла. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2081	РЕММАКС-КВ	Comb drug	таблетки жувальні з апельсиновим смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/12125/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2082	РЕММАКС-КВ	Comb drug	таблетки жувальні з м'ятним смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/11362/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2083	РЕММАКС-КВ	Comb drug	таблетки жувальні з малиновим смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/12126/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2084	РЕМОТІВ	Hypericі herba	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	Амакса Лтд	Велика Британія	Макс Целлєр Зьоне АГ (виробництво за повним циклом)/Інтерлабор Белп АГ (контроль якості)/Лабор Цоллінгер АГ (контроль якості)	Швейцарія/ Швейцарія/ Швейцарія	UA/16299/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2085	РЕНАЛГАН®	Pitofenone and analgesics	таблетки, по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"/ПрАТ "Технолог"	Україна/ Україна	UA/1530/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2086	РЕНГАЛІН	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/17860/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2087	РЕНЕЛІКС СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні, по 30 мл, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/13604/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2088	РЕНЕЛЬ Н	Comb drug	таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому; по 1 контейнеру в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/2442/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Закривати контейнер із таблетками негайно після застосування, захищати від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці!
2089	РЕННІ® БЕЗ ЦУКРУ	Comb drug	таблетки жувальні з м'ятним смаком; по 6 таблеток у блістері; по 2 або 4 блістери в картонній коробці; по 12 таблеток у блістері з перфорацією; по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Дельфарм Гайард	Франція	UA/6025/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2090	РЕННІ® 3 АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ	Comb drug	таблетки жувальні; по 12 таблеток у блістері з перфорацією; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці; по 6 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Дельфарм Гайард	Франція	UA/7799/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2091	РЕННІ® 3 МЕНТОЛОВИМ СМАКОМ	Comb drug	таблетки жувальні по 12 таблеток у блістері з перфорацією, по 1 або по 2 блістери в картонній коробці; по 6 таблеток у блістері, по 2 або по 4 блістери в картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Дельфарм Гайард	Франція	UA/7798/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2092	РЕПАРИЛ®-ГЕЛЬ Н	Comb drug	гель; по 40 г гелю в алюмінієвій або ламінатній тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Віатріс Хелскеа ГмбХ	Німеччина	МАДАУС ГмбХ	Німеччина	UA/7224/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
2093	РЕСПИКС Л®	Comb drug	таблетки по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/15503/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2094	РЕСПИКС®	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2, або 4 блістери у пачці з картону	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/15549/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2095	РЕСПИКС®	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2, або 4 блістери у пачці з картону	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/15549/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2096	РЕСПИКС® СПРЕЙ	Ambroxol	розчин оральний, 10 мг/0,2 мл по 13 мл розчину у флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Ай Ті Сі ПРОДАКШН С.Р.Л.	Італія	UA/12305/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°С. Не охолоджувати та не заморожувати. Термін придатності після першого використання – 1 місяць.
2097	РЕСПІБРОН	Comb drug	таблетки сублінгвальні по 10 таблеток у блістері, по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Лаллеманд Фарма АГ	Швейцарія	Брусчеттіні с.р.л.	Італія	UA/17298/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
2098	РЕТИНОЛУ АЦЕТАТ	Retinol (vit A)	розчин нашкірний та оральний, олійний 34,4 мг/мл, по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/5428/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. У недоступному для дітей місці.
2099	РИБ'ЯЧИЙ ЖИР	Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids	рідина оральна по 50 мл або по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з картону; по 50 мл або по 100 мл у банці, по 1 банці в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8747/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2100	РИБ'ЯЧИЙ ЖИР-ТЕВА	Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids	капсули по 500 мг; по 10 капсул у блістері; по 7 або 9 блістерів у картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	АТ Фармацевтичний завод Тева	Угорщина	UA/6681/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
2101	РИМАНТАДИН-ДАРНИЦЯ	Rimantadine	таблетки по 50 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/7736/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

2102	РИНАЗОЛІН®	Oxymetazoline	краплі назальні 0,25 мг/мл по 10 мл у флаконі поліетиленовому, закупореному пробкою-крапельницею і ковпачком (з контролем першого розкриття); або у флаконі поліетиленовому, закупореному дозатором та кришкою з пломбою (контролем першого розкриття); або по 10 мл у флаконі скляному брунатного кольору, закупореному крапельницею, по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/7191/01/02	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2103	РИНАЗОЛІН®	Oxymetazoline	краплі назальні 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі поліетиленовому, закупореному пробкою-крапельницею і ковпачком (з контролем першого розкриття); або у флаконі поліетиленовому, закупореному дозатором та кришкою з пломбою (контролем першого розкриття); або по 10 мл у флаконі скляному брунатного кольору, закупореному крапельницею, по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/7191/01/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2104	РИНАЗОЛІН®	Oxymetazoline	краплі назальні, 0,1 мг/мл, по 10 мл у флаконі поліетиленовому з нагвинченим ковпачком; або по 10 мл у флаконі скляному брунатного кольору, закупореному крапельницею, по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/7191/01/03	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2105	РИНАЗОЛІН®	Oxymetazoline	спрей назальний, 0,5 мг/мл по 15 мл у флаконі поліетиленовому, забезпеченому насадкою з дозатором і захисним ковпачком або по 10 мл у флаконі скляному брунатного кольору, забезпеченому насосом-дозатором з розпилювачем назального призначення; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/7191/02/01	Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°С.
2106	РИНЗА®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки; по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній коробочці; по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній коробочці; по 25 картонних коробочок у картонній коробці; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробочці	ТОВ "Джонсон і Джонсон Україна"	Україна	Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.")	Індія	UA/2078/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці.
2107	РИНІТАЛ	Comb drug	таблетки; по 20 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/6841/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2108	РИНОБАКТ®	Comb drug	спрей назальний, розчин по 10 мл у флаконі із темного скла з насосом розпилювачем, аплікатором та захисним ковпачком, по 1 флакону у картонній коробці	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	UA/20336/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2109	РИНОСТОП	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 1,0 мг/мл, по 10 мл у поліетиленовому контейнері з насосом із розпилювачем у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20110/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2110	РИНОСТОП	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 1,0 мг/мл; по 8 мл або 10 мл, або 12 мл у поліетиленовому контейнері з насосом із розпилювачем у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20110/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2111	РИНОТАЙСС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,1 % по 10 мл у флаконі з розпилювачем, по 1 флакону у картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	UA/17340/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2112	РИНОФЛУІМУЦИЛ	Comb drug	спрей назальний, розчин по 10 мл у флаконі, по 1 флакону з розпилювачем в картонній пачці	Замбон С.П.А.	Італія	Замбон С.П.А.	Італія	UA/8559/01/01	Зберігати при температурі не вище 25° С. Не використовувати після закінчення терміну придатності. Після першого відкриття лікарський засіб слід зберігати не більше 20 днів.

2113	РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® З МЕНТОЛОМ	Oxymetazoline	спрей назальний, 0,5 мг/мл, по 10 мл у флаконі разом з насосом-дозатором з розпилювачем; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/12119/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2114	РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ	Oxymetazoline	спрей назальний, 0,5 мг/мл, по 10 мл у флаконі разом з насосом-дозатором з розпилювачем; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/12120/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2115	РИТМОКОР®	Comb drug	капсули; по 12 капсул у блістері; по 4 або 5 блістерів у пачці; по 12 капсул у блістері	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/3122/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 оС.
2116	РИТМОКОР® ФОРТЕ	Comb drug	таблетки; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/3122/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2117	РИЦИНОВА ОЛІЯ	Castor oil	олія оральна по 30 г або по 100 г у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ТОВ "Фарма Черкас" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/9198/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2118	РИЦИНОВА ОЛІЯ	Castor oil	олія оральна по 30 г або по 100 г у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ТОВ "Фарма Черкас" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/9198/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2119	РИЦИНОВА ОЛІЯ	Castor oil	олія по 30 г або по 50 г, або по 100 г у флаконах скляних; по 30 г у флаконі скляному, по 1 флакону у пачці; по 30 г або по 50 г, або по 100 г у флаконах полімерних в комплекті з кришками; по 30 г або по 50 г, або по 100 г у флаконі полімерному в комплекті з кришкою, по 1 флакону у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7354/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2120	РИЦИНОВА ОЛІЯ	Castor oil	олія по 30 мл, або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах скляних або полімерних	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8737/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2121	РИЦИНОВА ОЛІЯ	Castor oil	олія по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/9248/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2122	РІАБАЛ	Prifinium bromide	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 30 мг, 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.	Йорданія	Зе Араб Фармасьютікал Менуфекчурінг Ко. Лтд.	Йорданія	UA/2908/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2123	РІНАЗАЛ®	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 0,5 мг/мл; по 10 мл у флаконі, по 1 флакону з дозуючим насосом у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/1751/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2124	РІНАЗАЛ®	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 1,0 мг/мл; по 10 мл у флаконі, по 1 флакону з дозуючим насосом у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/1751/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2125	РІНАЗАЛ® ЕКСТРА	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,5 мг/мл, по 10 мл у флаконі з дозувальним насосом; по 1 флакону у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/17751/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона зберігати не більше 2 місяців.
2126	РІНОСАН	Xylometazoline	спрей назальний, розчин, 1 мг/мл; по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній пачці	ТОВ "ІНФАРМА Трейдінг"	Латвійська Республіка	Базік Фарма Мануфактурінг Б.В.	Нідерланди	UA/19254/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття — 1 місяць.
2127	РІОПАН	Magaldrate	суспензія оральна, 800 мг/10 мл; по 10 мл в саше; по 10, або по 20, або по 50 саше картонній коробці	Такеда ГмбХ	Німеччина	Такеда ГмбХ	Німеччина	UA/11741/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати! Зберігати у недоступному для дітей місці!
2128	РІСТ-НОРМА	Comb drug	гранули; по 10 г гранул у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону; або по 10 г гранул у флаконі з кришкою, по 1 флакону в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/4625/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0 С.

2129	РІТОССЕ ПОДОРОЖНИК	Plantago**	сироп по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Фітофарм Кленка С. А.	Польща	UA/17402/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття флакона – 3 місяці.
2130	РІТОССЕ® ПЛЮЩ	Hederae helicis folium	сироп, 7 мг/мл по 100 мл у флаконі, по 1 флакону з мірною ложкою в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/18588/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. У процесі зберігання можливе легке помутніння та незначна зміна присмаку сиропу, що не впливає на терапевтичні властивості лікарського засобу.
2131	РОДІОЛИ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ	Rhodiola rosea**	екстракт рідкий по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону; по 50 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці з картону; по 25 мл у флаконах	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/8839/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2132	РОЗТИРАН	Comb drug	мазь по 25 г в банці; по 1 банці в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/6397/01/01	Зберігати у щільно укупореній тарі при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
2133	РОЗТОРОПШІ ПЛОДИ	Silybum marianum**	плоди по 50 г, 100 г або по 200 г у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/13993/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2134	РОЗТОРОПШІ ПЛОДИ	Silybum marianum**	плоди по 50 г, або по 100 г, або 200 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/3912/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2135	РОЛІНОЗ	Cetirizine	краплі оральні, 10 мг/мл, по 20 мл у скляному флаконі з кришкою-крапельницею; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	АВС Фармачеутічі С.п.А.	Італія	UA/12490/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.

2136	РОЛІНОЗ	Cetirizine	краплі оральні, 10 мг/мл, по 20 мл у скляному флаконі з кришкою-крапельницею; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	АВС Фармачеутічі С.п.А.	Італія	UA/12490/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.
2137	РОЛІНОЗ	Cetirizine	краплі оральні, розчин, 10 мг/мл; 20 мл розчину у флаконі з пробкою-крапельницею з кришкою; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/17107/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2138	РОЛІНОЗ	Cetirizine	краплі оральні, розчин, 10 мг/мл; 20 мл розчину у флаконі з пробкою-крапельницею з кришкою; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/17107/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2139	РОЛІНОЗ	Cetirizine	таблетки, 10 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	АВС Фармачеутічі С.п.А.	Італія	UA/12490/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.
2140	РОЛІНОЗ	Cetirizine	таблетки, 10 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	АВС Фармачеутічі С.п.А.	Італія	UA/12490/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.

2141	РОЛІНОЗ	Cetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг; по 10 таблеток в блістері, по 1 або 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18210/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2142	РОЛІНОЗ	Cetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг; по 10 таблеток в блістері, по 1 або 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18210/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2143	РОМАШКИ КВІТКИ	Matricaria chamomilla**	квітки по 30 г або по 40 г, або по 50 г, або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/6027/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2144	РОМАШКИ КВІТКИ	Matricaria chamomilla**	квітки по 40 г або по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 10 або 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6610/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

2145	РОМАШКИ КВІТКИ	Matricaria chamomilla**	квітки по 40 г або по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону, по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 25 фільтр-пакетів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8288/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.
2146	РОМАШКИ КВІТКИ	Matricaria chamomilla**	квітки по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8886/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 оС до 15 оС не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці!
2147	РОТОКАН	Comb drug	екстракт рідкий по 55 мл або 110 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/4607/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2148	РЯТІВНИК®	Chlorhexidine, combinations	крем по 15 г або по 30 г в тубі; по 1 тубі в пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/5062/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2149	САЛІЦИЛКА-ВІШФА	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, по 40 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/16924/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!
2150	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 40 мл або по 25 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/3506/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2151	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 40 мл у флаконах скляних, укупорених пробками і кришками; по 40 мл у флаконах скляних, укупорених пробками і кришками, по 1 флакону в пачці з картону; по 40 мл у флаконах полімерних, у комплекті з кришками; по 40 мл у флаконах полімерних, у комплекті з кришками, по 1 флакону в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6683/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2152	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, по 25 мл або по 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками або пробками-крапельницями та кришками; по 25 мл або по 50 мл у флаконі скляному, укупореному пробкою та кришкою або пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 мл або по 50 мл у флаконах полімерних, укупорених кришками; по 25 мл або по 50 мл у флаконі полімерному, укупореному кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 40 мл у флаконах скляних, укупорених пробками і кришками; по 40 мл у флаконі скляному, укупореному пробкою і кришкою; по 1 флакону в пачці з	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6683/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2153	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, по 40 мл у флаконах скляних	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРСПЕЦФАРМ"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРСПЕЦФАРМ"	Україна	UA/20021/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2154	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 2 %; по 25 мл або по 40 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18791/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2155	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	Salicylic acid	розчин нашкірний спиртовий, 20 мг/мл, по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/7041/01/01	В захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2156	САЛІЦИЛОВА МАЗЬ	Salicylic acid	мазь 10 % по 25 г у контейнерах; по 20 г або 25 г у тубах; по 20 г або по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці; по 20 г або по 25 г у тубах ламінатних; по 20 г або по 25 г у тубі ламінатній; по 1 тубі в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6683/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2157	САЛІЦИЛОВА МАЗЬ	Salicylic acid	мазь 2 % по 25 г у контейнерах; по 20 г або 25 г у тубах; по 20 г або по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці; по 20 г або по 25 г у тубах ламінатних; по 20 г або по 25 г у тубі ламінатній; по 1 тубі в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6683/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2158	САЛІЦИЛОВА МАЗЬ	Salicylic acid	мазь 5 % по 25 г у контейнерах; по 20 г або 25 г у тубах; по 20 г або по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці; по 20 г або по 25 г у тубах ламінатних; по 20 г або по 25 г у тубі ламінатній; по 1 тубі в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6683/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2159	САЛІЦИЛОВО-ЦИНКОВА ПАСТА	Comb drug	паста по 25 г у контейнерах; по 20 г у тубах алюмінієвих; по 20 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у пачці; по 20 г або по 25 г у тубах ламінатних; по 20 г або по 25 г у тубі ламінатній; по 1 тубі у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6398/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2160	САЛІЦИЛОВО-ЦИНКОВА ПАСТА	Comb drug	паста по 25 г у тубах; по 25 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8495/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2161	САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 40 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8494/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2162	САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %; по 40 мл у флаконах	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8494/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2163	САНГІВА®	Comb drug	розчин для ротової порожнини; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/16981/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2164	САНГІВА®	Comb drug	спрей для ротової порожнини, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону з насадкою-розпилювачем в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/16981/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2165	САНЕТІС®	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований, 0,05 %, по 10 г у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону у пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мікрофарм"	Україна	UA/21128/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2166	САНІДАР®	Decamethoxine	розчин для зовнішнього застосування, 0,2 мг/мл, по 100 мл, по 200 мл або по 400 мл у флаконах; по 100 мл, по 200 мл або по 400 мл у флаконах із захисним ковпачком	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/18909/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2167	САНОРИН	Naphazoline	краплі назальні, емульсія, 1 мг/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону разом із кришкою-крапельницею в коробці	АТ "Фармак"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о./Санека Фармасьютікалз АТ	Чеська Республіка/Словацька Республіка	UA/2455/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

2168	САНОРИН	Naphazoline	краплі назальні, розчин 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі зі скла; по 1 флакону, оснащеному крапельницею та кришкою у картонній коробці	АТ "Фармак"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о./Санека Фармасьютікалз АТ	Чеська Республіка/Словацька Республіка	UA/2455/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від світла. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття – 1 рік.
2169	САНОРИН	Naphazoline	краплі назальні, розчин, 1 мг/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону разом із кришкою-крапельницею в коробці	АТ "Фармак"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о./Санека Фармасьютікалз АТ	Чеська Республіка/Словацька Республіка	UA/2455/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Після першого відкриття препарат зберігати не більше 28 діб при температурі 25 °С.
2170	САНОРИН	Naphazoline	спрей назальний, розчин 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону разом з аплікатором для порожнини носа в коробці	АТ "Фармак"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о. (повний цикл виробництва)/Санека Фармасьютікалз АТ (повний цикл виробництва)	Чеська Республіка/Словацька Республіка	UA/2455/04/02	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла, при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
2171	САНОРИН	Naphazoline	спрей назальний, розчин, 1 мг/мл по 10 мл у флаконі з механічним розпилювачем; по 1 флакону разом з аплікатором для порожнини носа в коробці	АТ "Фармак"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о. (повний цикл виробництва)/Санека Фармасьютікалз АТ (повний цикл виробництва)	Чеська Республіка/Словацька Республіка	UA/2455/04/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

2172	СЕДАВІТ®	Comb drug	розчин оральний по 100 мл у скляному або полімерному флаконі; по 1 флакону у пачці; по 100 мл у скляній банці; по 1 банці в пачці; по 200 мл у скляному флаконі; по 1 флакону у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/8992/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2173	СЕДАВІТ®	Comb drug	таблетки по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/7821/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2174	СЕДАЛГІН ПЛЮС	Metamizole sodium, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2, або 5 блістерів у пачці картонній; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці картонній	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Дупниця АТ	Болгарія	UA/3271/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у місцях, недоступних для дітей.
2175	СЕДАРИСТОН® КАПСУЛИ	Comb drug	капсули; по 10 капсул у блістері; по 3 або 6, або 10 блістерів у картонній коробці	Еспарма ГмбХ	Німеччина	Фарма Вернігероде ГмбХ (контроль якості)/еспарма Фарма Сервісез ГмбХ (вторинне пакування)/Адванс Фарма ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)	Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/13150/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2176	СЕДАСЕН	Comb drug	капсули, по 40 капсул у пластиковому контейнері; по 1 контейнеру в картонній пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	UA/10985/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 о С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2177	СЕДАСЕН ФОРТЕ	Comb drug	капсули, по 20 капсул у пластмасовому контейнері; по 1 контейнеру в картонній пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/5000/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2178	СЕДАФІТОН®	Comb drug	краплі оральні; по 50 мл у флаконах скляних та полімерних, з пробками-крапельницями, кришками полімерними з контролем першого відкриття, по 1 флакону в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/18257/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2179	СЕДАФІТОН®	Comb drug	таблетки; по 12 таблеток у блістері; по 2 або 4, або 8 блістерів у пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/4826/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2180	СЕДАФІТОН®	Comb drug	таблетки; по 12 таблеток у блістері; по 2 або 4, або 8 блістерів у пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/4826/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2181	СЕДАФІТОН® ФОРТЕ	Comb drug	капсули; по 6 капсул у блістері; по 2 або 4, або 8 блістерів у пачці; по 30 капсул у контейнері з кришкою з контролем першого відкриття, по 1 контейнеру в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/4826/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2182	СЕДАФІТОН® ФОРТЕ	Comb drug	капсули; по 6 капсул у блістері; по 2 або 4, або 8 блістерів у пачці; по 30 капсул у контейнері з кришкою з контролем першого відкриття, по 1 контейнеру в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/4826/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2183	СЕДІСТРЕС	Comb drug	таблетки; по 10 таблеток у блістері; по 1, 3 та 6 блістерів у пачці з картону	ТОВ "АСІНО УКРАЇНА"	Україна	ТОВ "Фарма Старт"	Україна	UA/14145/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати препарт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2184	СЕЗОНІЯ	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг по 10 таблеток у блістері, по 1, по 2, по 3 або по 10 блістерів у коробці з картону	ТОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/16127/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2185	СЕКРЕПАТ ФОРТЕ	Ordinary salt combinations	таблетки жувальні зі смаком анісу, по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці	СПЕРКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД	Кіпр	ЛАБОРАТОРІОС АЛКАЛА ФАРМА, С.Л.	Іспанія	UA/7782/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2186	СЕКРЕПАТ ФОРТЕ	Ordinary salt combinations	таблетки жувальні зі смаком м'яти, по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці	СПЕРКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД	Кіпр	ЛАБОРАТОРІОС АЛКАЛА ФАРМА, С.Л.	Іспанія	UA/7783/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2187	СЕНАДЕКСИН	Senna glycosides	таблетки по 70 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 5 або 10 блістерів у пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5432/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2188	СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВ'Я	Senna glycosides	таблетки по 70 мг; по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2, або по 10 блістерів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/5692/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2189	СЕНАДЕКСИН-ФОРТЕ	Senna glycosides	таблетки по 140 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 10 блістерів у пачці; по 10 таблеток у блістері	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/16128/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2190	СЕНАДЕ®	Senna glycosides	таблетки по 13,5 мг № 500: по 20 таблеток у блістері, по 25 блістерів у картонній коробці	Ципла Лтд	Індія	Медітеб Спешиалітіз Лімітед	Індія	UA/6054/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці (блістері) при температурі не вище 25 °С.
2191	СЕНИ ЛИСТЯ	Senna officinalis**	листя по 100 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8887/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений відвар зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2192	СЕНИ ЛИСТЯ	Senna officinalis**	листя по 50 г або по 100 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 2 г у фільтр-пакеті; по 10 або по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/11745/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2193	СЕНИ ЛИСТЯ	Senna officinalis**	листя по 50 г, 100 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 2 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8289/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2194	СЕПТЕФРИЛ	Decamethoxine	таблетки по 0,2 мг; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1, 2, 3, 4 або 5 блістерів у пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"/ТОВ "Агрофарм"	Україна/ Україна	UA/7930/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2195	СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ	Benzydamine	льодяники по 3 мг, зі смаком лимона; по 10 льодяників у блістері; по 2 блістери в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ІНФАРМЕЙД, С.Л. (контроль серії)/Лабораторіо Ечіварне, С.А. (контроль серії (мікробіологічний))/ЛОЗІ'С ФАРМАСЬЮТІКА ЛС С.Л. (виробництво готової продукції, первинне і вторинне пакування, випуск серії)	Іспанія/ Іспанія/ Іспанія	UA/20263/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2196	СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ	Benzydamine	льодяники по 3 мг, зі смаком меду та апельсина; по 10 льодяників у блістері; по 2 блістери в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ІНФАРМЕЙД, С.Л. (контроль серії)/Лабораторіо Ечіварне, С.А. (контроль серії (мікробіологічний))/ЛОЗІ'С ФАРМАСЬЮТІКА ЛС С.Л. (виробництво готової продукції, первинне і вторинне пакування, випуск серії)	Іспанія/ Іспанія/ Іспанія	UA/20262/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2197	СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ	Benzydamine	розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/20609/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого розкриття флакона – 30 діб.
2198	СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ	Benzydamine	розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/20609/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого розкриття флакона – 30 діб.
2199	СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл; по 30 мл у флаконі; по 1 флакону з дозуючою спрей-насадкою у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/20609/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2200	СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл; по 30 мл у флаконі; по 1 флакону з дозуючою спрей-насадкою у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/20609/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2201	СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 3 мг/мл; по 30 мл у флаконі; по 1 флакону з дозуючою спрей-насадкою у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/20609/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2202	СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 3 мг/мл; по 30 мл у флаконі; по 1 флакону з дозуючою спрей-насадкою у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/20609/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2203	СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ	Decamethoxine	таблетки по 0,2 мг; по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 або по 2, або по 4 контурні чарункові упаковки в пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/6210/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2204	СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ	Comb drug	спрей для ротової порожнини, розчин; по 30 мл у пластиковому флаконі з дозуючим пульверизатором; по 1 флакону в картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (виробництво готового лікарського засобу, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій) / КРКА, д.д., Ново место (контроль серій)	Словенія	UA/15458/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат слід використати протягом 12 місяців.
2205	СЕРТАКОНАЗОЛ	Sertaconazole	крем, 20 мг/г по 20 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/(всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна	UA/16266/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2206	СИЛІБОР 35	Silymarin	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 35 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/5114/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2207	СИЛІБОР МАКС	Silymarin	капсули по 140 мг; по 10 капсул у блістері; по 2 або 4 блістери у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/5114/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2208	СИЛІБОР ФОРТЕ	Silymarin	капсули по 70 мг, по 10 капсул у блістері; по 2 або 4 блістери у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/5114/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2209	СИМЕТИКОН	Silicones	таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг, по 7 таблеток у блістері; по 2 блістери у коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/15907/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2210	СИНКОТАЛ	Comb drug	м`які желатинові капсули по 10 капсул в блістері, по 2 або 4 блістери в картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ (відповідальний за випуск серії кінцевого продукту, первинне та вторинне пакування)/Дюлль берг Концентра ГмбХ & Ко. КГ (виробник суміші ефірних олій in bulk)/АЯНДА ГмбХ (виробник, відповідальний за інкапсуляцію)/Віве льхове ГмбХ (виробник, відповідальний за нанесення оболонки, первинне та вторинне пакування)	Німеччина / Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/17367/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2211	СИНТОМІЦИН	Chloramphenicol	лінімент 10 %; по 25 г у тубах; по 1 тубі у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/4683/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2212	СИНТОМІЦИН	Chloramphenicol	лінімент 5 % по 25 г у тубі, по 1 тубі в пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/4683/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після розкриття туби препарат зберігати протягом курсу лікування.

2213	СИНТОМІЦИН	Chloramphenicol	лінімент для зовнішнього застосування, 100 мг/г; по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/15277/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2214	СИНТОМІЦИН	Chloramphenicol	лінімент для зовнішнього застосування, 50 мг/г; по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/15277/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2215	СИНТУС	Butamirate	краплі оральні, розчин 0,5 %, по 20 мл у флаконі з пробкою-крапельницею і кришкою та картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Болгарія	ВЕТПРОМ АД, виробнича дільниця Віфарма	Болгарія	UA/19387/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття флакона – 4 місяці.
2216	СИНТУС	Butamirate	сироп 0,15 % по 200 мл у флаконі, по 1 флакону в комплекті з мірним стаканчиком в картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Республіка Болгарія	ВЕТПРОМ АД, виробнича дільниця Віфарма	Болгарія	UA/19387/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття флакона – 4 місяці.
2217	СИНУПРЕТ®	Comb drug	краплі оральні по 50 мл або по 100 мл розчину у флаконі, з дозуючим крапельним пристроєм зверху, з кришкою, що нагвинчується і кільцем контролю відкриття, по 1 флакону у картонній коробці	Біонорика СЕ	Німеччина	Біонорика СЕ	Німеччина	UA/4373/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця. Після першого відкриття флакона препарат придатний до застосування протягом 3 місяців.

2218	СИРОП ВІД КАШЛЮ ДР. ТАЙССА	Plantago**	сироп по 50 мл, або по 100 мл, або по 250 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком з поліпропілену в картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	UA/2336/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття флакона – 3 місяці.
2219	СИРОП ВІД КАШЛЮ ДР. ТАЙССА З ЕКСТРАКТОМ ПЛЮЩА	Hederae helicis folium	сироп, по 100 мл або по 250 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком у картонній коробці	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	UA/15367/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття флакона – 6 тижнів.
2220	СИРОП ВІД КАШЛЮ ПУЛЬМО	Butamirate	сироп, 1,5 мг/мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з ложкою мірною у коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/16024/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2221	СИРОП ВІД КАШЛЮ ПУЛЬМО	Butamirate	сироп, 1,5 мг/мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з ложкою мірною у коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я", Україна)	Україна	UA/16024/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2222	СИРОП ПОДОРОЖНИКА	Comb drug	сироп, по 130 г у флаконі, по 1 флакону з мірною ложкою в пачці; по 130 г у банці; по 1 банці з мірною ложкою в пачці	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/12768/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності препарату після відкриття флакона – 28 діб.
2223	СІМІДОНА УНО	Cimicifugae rhizoma	таблетки по 6,5 мг; по 30 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Амакса Лтд	Велика Британія	Макс Целлєр Зьоне АГ (виробництво за повним циклом)/Лабор Цоллінгер АГ (альтернативний виробник: контроль якості)/Інтерлабор Белп АГ (альтернативний виробник: контроль серій)	Швейцарія/ Швейцарія/ Швейцарія	UA/14581/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2224	СІМІДОНА ФОРТЕ	Cimicifugae rhizoma	таблетки по 13 мг; по 30 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Амакса Лтд	Велика Британія	Макс Целлєр Зьоне АГ (виробництво за повним циклом)/Лабор Цоллінгер АГ (альтернативний виробник: контроль якості)/Інтерлабор Белп АГ (альтернативний виробник: контроль серій)	Швейцарія/ Швейцарія/ Швейцарія	UA/14582/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2225	СІМІДОНА ФОРТЕ	Cimicifugae rhizoma	таблетки по 13 мг; по 30 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Амакса Лтд	Велика Британія	Макс Целлєр Зьоне АГ (виробництво за повним циклом)/Лабор Цоллінгер АГ (альтернативний виробник: контроль якості)/Інтерлабор Белп АГ (альтернативний виробник: контроль серій)	Швейцарія/ Швейцарія/ Швейцарія	UA/14582/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2226	СІНУМАКС	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,05 %, по 10 г у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону у пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	UA/17382/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2227	СІНУМАКС	Oxymetazoline	спрей назальний, дозований 0,05%, по 10 г у флаконі з розпилювачем, по 1 флакону у пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	ТОВ "Мікрофарм" (виробництво, пакування, контроль якості)/ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (випуск серії)	Україна/ Україна	UA/17382/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2228	СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА	Sulfur	мазь 33 % по 25 г у тубах; по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8407/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2229	СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА	Sulfur	мазь 33 %, по 40 г у тубах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8061/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2230	СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА	Sulfur	мазь 33,3 % по 25 г або по 50 г у контейнерах; по 20 г або по 40 г у тубах алюмінієвих; по 20 г або по 40 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у пачці з картону; по 20 г, по 25 г або по 40 г у тубах ламінатних; по 20 г, по 25 г або по 40 г у тубі ламінатній; по 1 тубі в картонній пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6682/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2231	СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА	Sulfur	мазь 33,3 %, по 25 г у банках; по 40 г у тубах; по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/7192/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2232	СКИПИДАРНА МАЗЬ	Mono	мазь по 25 г у тубах; по 25 г у тубі по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8606/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2233	СКИПИДАРНА МАЗЬ	Mono	мазь, по 30 г у тубах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8177/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2234	СКІН-КАП	Pyrithione zinc	крем 0,2 % по 50 г або 15 г у поліетиленовій тубі; по 1 тубі в картонній упаковці	ХЕМІГРУП ФРАНС	Франція	Б. БРАУН МЕДІКАЛ С.А.	Іспанія	UA/3789/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2235	СКІН КАП	Pyrithione zinc	аерозоль 0,2 % по 50 мл, 100 мл або 200 мл у моноблок-балоні; по 1 моноблок-балону в картонній коробці	ХЕМІГРУП ФРАНС	Франція	Хемінова Інтернасіональ С.А./"РЕСІФАРМ ПАРЕТС, С.Л."	Іспанія/ Іспанія	UA/3789/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25° С у недоступному для дітей місці.
2236	СКІНОРЕН®	Azelaic acid	гель 15 %, по 5 г або по 30 г у тубі; по 1 тубі в картонній пачці	ЛЕО Фарма А/С	Данія	ЛЕО Фарма Мануфактурінг Італі СРЛ	Італія	UA/1074/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2237	СКЛЕРО-ГРАН	Comb drug	гранули, по 10 г у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/4626/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0 С.
2238	СКРІПТА	Comb drug	настойка; по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці з картону; по 100 мл у банці; по 1 банці у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/9641/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

2239	СЛАБІГЕЛЬ-ЗДОРОВ'Я	Docusate sodium	гель ректальний, 0,12 г/10 г; по 10 г у тубі-канюлі; по 1 або 6 туб-канюль у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/18696/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2240	СЛАБІЛАКС-ЗДОРОВ'Я	Sodium picosulfate	краплі оральні, 7,5 мг/мл, по 15 мл або 30 мл у флаконі; по 1 флакону в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/12465/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2241	СЛАБІЛАКС-ЗДОРОВ`Я	Sodium picosulfate	таблетки по 7,5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/12465/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2242	СЛІПДОКС	Doxylamine	таблетки, вкриті оболонкою, по 15 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 або 3 блістери в коробці з картону	ТОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/10819/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2243	СОЛІДАГОРЕН	Comb drug	краплі оральні; по 20 мл, або по 50 мл, або по 100 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в коробці з картону	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/13795/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона – 3 місяці.

2244	СОЛІЗИМ ФОРТЕ	Mono	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 3000 F.I.P. ОД, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/5694/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2245	СОЛІЗИМ®	Mono	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 20000 ЛО; по 10 таблеток у блістері, по 2 або 5 блістерів у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/5184/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2246	СОЛОДКИ КОРЕНЯ СИРОП	Glycyrrhiza**	сироп по 100 г у скляних або полімерних флаконах; по 100 г у скляному або полімерному флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложкою або мірним стаканчиком в пачці; по 200 г у скляних флаконах; по 200 г у скляному флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложкою або мірним стаканчиком в пачці; по 200 г у полімерних флаконах укупорених кришкою з насадкою та без насадки; по 200 г у полімерному флаконі; по 1 флакону укупореному кришкою з насадкою та без насадки разом з мірною ложкою або мірним стаканчиком в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/11622/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

2247	СОЛОДКИ КОРЕНЯ СИРОП	Glycyrrhiza**	сироп по 50 г у флаконі скляному або полімерному, по 1 флакону з мірною ложкою в пачці; по 100 г у банці полімерній, по 1 банці з мірною ложкою в пачці; по 100 г у флаконі полімерному, по 1 флакону з мірною ложкою в пачці	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/9370/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після відкриття флакона зберігати не більше 14 діб при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2248	СОЛОДКИ КОРЕНЯ СИРОП	Glycyrrhiza**	сироп, 250 мг/5 мл по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці зі стаканом мірним та ложкою мірною у пачці з картону; по 100 мл у банці скляній; по 1 банці зі стаканом дозуючим та ложкою мірною у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/17190/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. Термін придатності після першого розкриття упаковки — 6 місяців.
2249	СОЛОДКИ КОРЕНЯ СИРОП	Glycyrrhiza**	сироп, 250 мг/5 мл; по 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з ложкою дозувальною в пачці; по 100 мл у банці; по 1 банці з ложкою дозувальною в пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/3359/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після першого розкриття упаковки препарат можна застосовувати протягом 6 місяців при температурі зберігання не вище 25 °С. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

2250	СОЛПАДЕЇН АКТИВ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки шипучі; по 2 таблетки у багатошаровому стрипі; по 6 стрипів у картонній коробці; по 4 таблетки у багатошаровому стрипі; по 3 стрипи у картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед/Фамар А.В.Е. Антоса плант	Ірландія/ Греція	UA/12392/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.
2251	СОЛПАДЕЇН АКТИВ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки шипучі; по 2 таблетки у багатошаровому стрипі; по 6 стрипів у картонній коробці; по 4 таблетки у багатошаровому стрипі; по 3 стрипи у картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	Халеон Айрленд Дангарван Лімітед	Ірландія	UA/12392/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.
2252	СОЛПАДЕЇН АКТИВ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, вкриті оболонкою; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед	Ірландія	UA/12239/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.
2253	СОЛПАДЕЇН АКТИВ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, вкриті оболонкою; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Халеон ЮК Трейдінг Лімітед	Велика Британія	Халеон Айрленд Дангарван Лімітед	Ірландія	UA/12239/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.
2254	СОЛПАДЕЇН МІГРАСТОП	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Фамар Італія С.п.А.	Італія	UA/9438/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2255	СОЛУМ ОЙЛ	Comb drug	рідина нашкірна по 50 мл, 100 мл у флаконі у картонній коробці № 1	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/17959/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2256	СОЛЬВЕНЦІЙ	Comb drug	розчин оральний, по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/7882/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці.
2257	СОН-НАЙТ	Doxylamine	таблетки шипучі по 15 мг, по 2 таблетки у стрипі; по 5 або 10 стрипів у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/17261/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2258	СОН-НОРМА	Comb drug	гранули; по 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/3828/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
2259	СОНДОКС®	Doxylamine	таблетки по 0,015 г; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/7257/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2260	СОНМІЛ	Doxylamine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 15 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/5288/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2261	СОННІКС®	Doxylamine	таблетки, вкриті оболонкою, по 15 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/21129/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2262	СОНОБАРБОВАЛ	Comb drug	краплі оральні, розчин; по 5 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/17971/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2263	СОРБЕКС®	Medicinal charcoal	капсули по 0,25 г по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2 блістери у пачці з картону; по 2 капсули у блістері; по 100 блістерів у пачці з картону	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	UA/10156/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати окремо від речовин та матеріалів, які виділяють гази та пари. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2264	СОРБЕНТОГЕЛЬ	Mono	гель оральний 0,7 г/г по 135 г або по 270 г, або по 405 г у контейнері; по 1 контейнеру у коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з пакування in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/14843/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не допускати заморожування. Після заморожування втрачає свої властивості. Після розкриття упаковки зберігати у тих же самих умовах у щільно закритій тарі. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2265	СОРБЕНТОГЕЛЬ	Mono	гель оральний 0,7 г/г по 200 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону; по 15 г у саше; по 20 саше у коробці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я», Україна)	Україна	UA/15901/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не допускати заморожування. Після заморожування втрачає свої властивості. Після розкриття упаковки зберігати у тих же самих умовах у щільно закритій тарі. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2266	СОРБЕНТОГЕЛЬ БЕБІ	Mono	гель оральний, 0,7 г/г по 50 г у тубі; по 1 тубі у коробці; по 5 г або по 10 г у саше; по 20 саше у коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (виробництво з продукції in bulk Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна)	Україна	UA/15993/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не допускати заморожування. Після заморожування втрачає свої властивості. Після розкриття упаковки зберігати у тих же самих умовах у щільно закритій тарі. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2267	СОРБЕНТОМАКС	Mono	гель оральний, 0,7 г/г по 135 г у контейнері; по 1 контейнеру в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/13587/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не допускати заморожування. Після заморожування втрачає свої властивості. Після розкриття упаковки зберігати у тих же самих умовах у щільно закритій тарі. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2268	СОРБІПЛЮС	Diosmectite	порошок для оральної суспензії; по 3 г; по 3,76 г порошку у саше; по 10, 20 або 30 саше у пачці	ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/18032/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2269	СОРБОЛОНГ ДЕТОКС	Mono	капсули по 0, 427 г, по 7 капсул у блістері, по 1 або по 2 блістери у коробці з картону; по 10 капсул у блістері, по 1 або по 2 блістери у коробці з картону	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ"	Україна	ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ"	Україна	UA/20000/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
2270	СОРМІН®	Diosmectite	порошок для оральної суспензії по 3 г; по 3,72 г порошку у саше, по 10 або по 30 саше у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20494/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2271	СОРМІН®	Diosmectite	порошок для оральної суспензії по 3 г; по 3,72 г порошку у саше, по 10 або по 30 саше у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20494/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2272	СОСНИ БРУНЬКИ	Pinus**	бруньки по 30 г або по 75 г у пачках або у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/5884/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
2273	СОСНИ БРУНЬКИ	Pinus**	бруньки по 50 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2268/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25° С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.
2274	СОФОРИ ЯПОНСЬКОЇ НАСТОЙКА	Sophora japonica**	настойка по 40 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8445/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2275	СОФОРИ ЯПОНСЬКОЇ НАСТОЙКА	Sophora japonica**	настойка по 40 мл у флаконах	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8445/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2276	СОФОРИ ЯПОНСЬКОЇ НАСТОЙКА	Sophora japonica**	настойка по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8845/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2277	СОФОРИ ЯПОНСЬКОЇ НАСТОЙКА	Sophora japonica**	настойка, по 20 мл або 25 мл, або по 40 мл у флаконах; по 40 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 20 мл або 25 мл, або по 40 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 20 мл або 25 мл, або по 40 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 1 флакону в пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0366/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2278	СПАЗМАЛГОН ДУО	Pitofenone and analgesics	таблетки; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2, або по 5 блістерів у картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Дупниця АТ	Болгарія	UA/7059/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.

2279	СПАЗМІЛ	Pitofenone and analgesics	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	Ветпром АД (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка)/АТ "Софарма" (дозвіл на випуск серії)	Болгарія/ Болгарія	UA/9012/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці (в сухому, захищеному від світла місці) при температурі не вище 25 °С.
2280	СПАЗМОЛІКС	Pitofenone and analgesics	таблетки; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/6840/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2281	СПАСКУПРЕЛЬ	Comb drug	таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому; по 1 контейнеру в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/11194/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Закривати контейнер із таблетками негайно після застосування, захищати від вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2282	СПИРТ КАМФОРНИЙ	Camphora	розчин для зовнішнього застосування 10 %, спиртовий по 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних або полімерних по 40 мл або по 100 мл у флаконі скляному або полімерному по 1 флакону в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/8343/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2283	СПИРТ КАМФОРНИЙ	Camphora	розчин для зовнішнього застосування 10 %, спиртовий по 40 мл у флаконах скляних або полімерних; по 40 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/8343/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2284	СПИРТ КАМФОРНИЙ	Camphora	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10 % по 40 мл у флаконах скляних або полімерних	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/7967/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2285	СПИРТ КАМФОРНИЙ	Camphora	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10 % по 40 мл у флаконах скляних або полімерних	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/7967/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2286	СПИРТ КАМФОРНИЙ	Camphora	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10 % по 40 мл у флаконах; по 40 мл у флаконі; по 1 флакону в коробці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8525/01/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2287	СПИРТ КАМФОРНИЙ	Camphora	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10 %, по 40 мл у флаконах	ТОВ "Фарма Черкас"	Україна	ТОВ "Фарма Черкас"	Україна	UA/18074/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2288	СПИРТ КАМФОРНИЙ	Camphora	розчин нашкірний 10 % по 40 мл у флаконах; по 40 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8498/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2289	СПИРТ КАМФОРНИЙ	Camphora	розчин нашкірний, спиртовий 10 % по 40 мл у флаконах	ПП "Кілафф"	Україна	ПП "Кілафф"	Україна	UA/15714/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2290	СПИРТ МУРАШИНИЙ	Formic acid*	розчин для зовнішнього застосування спиртовий, по 40 мл або 50 мл у флаконах; по 40 мл або 50 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6546/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2291	СПИРТ МУРАШИНИЙ	Formic acid*	розчин для зовнішнього застосування спиртовий; по 40 мл або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками; по 40 мл або по 50 мл, або по 100 мл у флаконі скляному, укупореному пробкою та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 40 мл або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах полімерних, укупорених кришками; по 40 мл або по 50 мл, або по 100 мл у флаконі полімерному, укупореному кришкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 100 мл у флаконах полімерних, укупорених насадками та кришками; по 100 мл у флаконі полімерному, укупореному насадкою та кришкою; по 1 флакону в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6546/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2292	СПИРТ МУРАШИНИЙ	Formic acid*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 50 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/8562/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2293	СПИРТ МУРАШИНИЙ	Formic acid*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 50 мл у флаконах скляних або полімерних	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/7968/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2294	СПИРТ МУРАШИНИЙ	Formic acid*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 50 мл у флаконах скляних або полімерних	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Віола"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/7968/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2295	СПИРТ МУРАШИНИЙ	Formic acid*	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 50 мл у флаконах; по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8420/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2296	СПИРТ МУРАШИНИЙ	Formic acid*	розчин нашкірний спиртовий по 40 мл, 50 мл, 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконах полімерних	ПП "Кілафф"	Україна	ПП "Кілафф"	Україна	UA/15761/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2297	СПИРТ МУРАШИНИЙ	Formic acid*	розчин нашкірний спиртовий, по 50 мл, по 100 мл у флаконах скляних; по 50 мл, по 100 мл у флаконах полімерних	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	UA/17385/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2298	СПОРИШУ ТРАВА	Polygonum aviculare**	трава по 50 г або 100 г у пачках з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/9371/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

2299	СТЕАТЕЛЬ	Levocarnitine	розчин оральний по 1 г/10 мл по 10 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній пачці	ПРОФАРМА Інтернешнл Трейдинг Лімітед	Мальта	ХЕЛП С.А.	Греція	UA/12945/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2300	СТЕРИЛЛІУМ®	Propanol, combinations	розчин нашкірний по 100 мл, 500 мл, 1000 мл у флаконах; по 5 л у каністрах	Боде Хемі ГмбХ	Німеччина	Боде Хемі ГмбХ	Німеччина	UA/4627/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2301	СТЕРИЛЛІУМ®	Propanol, combinations	розчин нашкірний; по 100 мл, або по 500 мл, або по 1000 мл у пластикових флаконах; по 5 л у пластикових каністрах	ТОВ "НВП "ВІЛАН"	Україна	ТОВ "НВП "ВІЛАН" (пакування із "in bulk" фірми БОДЕ Хемі ГмбХ, Німеччина)	Україна	UA/5846/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2302	СТЕРОКОРТ®	Methylprednisolone	крем 0,1 %, по 15 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/7784/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2303	СТЕРОКОРТ®	Methylprednisolone	крем 0,1 %, по 15 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/7784/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2304	СТИЛЕН	Mono	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 60 мг; по 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці	КУПФЕР БІОТЕХ, УАБ	Литовська Республіка	Донг-А СТ Ко., Лтд.	Республіка Корея	UA/15426/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2305	СТИМОЛ®	Citrulline*	порошок шипучий для приготування орального розчину по 1 г в пакетику; по 18 пакетиків в картонній коробці	БІОКОДЕКС	Франція	БІОКОДЕКС	Франція	UA/12606/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2306	СТИМОЛ®	Citrulline*	розчин оральний, 1 г/10 мл, по 10 мл у пакетику; по 18 пакетиків у картонній коробці	БІОКОДЕКС	Франція	БІОКОДЕКС	Франція	UA/6937/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2307	СТИФІМОЛ	Comb drug	капсули тверді, по 10 капсул у блістері; по 10 блістерів у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/6777/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2308	СТОМАТИДИН ®	Hexetidine	розчин для ротової порожнини 0,1 % по 200 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	UA/2792/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.
2309	СТОМАТО-ГЕЛЬ ЗДОРОВ'Я	Comb drug	гель для ясен по 20 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/13651/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2310	СТОМАТОФІТ	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 45 мл, по 50 мл, 100 мл, 120 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	Фітофарм Кленка С. А.	Польща	Фітофарм Кленка С. А.	Польща	UA/8655/01/01	Зберігати в сухому, темному місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2311	СТОМАТОФІТ А	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці, по 25 мл у флаконі з розпилювачем та аплікатором, по 1 флакону в картонній коробці	Фітофарм Кленка С. А.	Польща	Фітофарм Кленка С. А.	Польща	UA/8656/01/01	Зберігати в сухому, темному місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2312	СТОМОЛІК	Hexetidine	розчин для ротової порожнини 0,1 % по 125 мл в банці, по 1 банці в пачці з картону	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/14810/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2313	СТОПАНГІН	Hexetidine	спрей для ротової порожнини, 1,92 мг/мл по 30 мл у флаконі; по 1 флакону з механічним розпилювачем, аплікатором для ротової порожнини та кришкою, яка захищає розпилювач, в коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о.	Чеська Республіка	UA/1831/01/01	Зберігати контейнер у коробці для захисту від світла, при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2314	СТОПЕРАН	Loperamide	капсули тверді по 2 мг, по 4 або 8 капсул у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці	Юнілаб, ЛП	США	ТОВ ЮС Фармація (виробник відповідальний за упаковку, контроль та випуск серії готового продукту)/СвіссКо Сервісез АГ (виробник відповідальний за виробництво, контроль та випуск продукту in bulk)/Страйдс Фарма Сайєнс Лімітед (виробник відповідальний за виробництво, контроль та випуск продукту in bulk)	Польща/ Швейцарія/Індія	UA/4685/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2315	СТОПТУСИН-ТЕВА	Cough suppressants and expectorants	краплі оральні, розчин по 10 мл або 25 мл у флаконі з кришкою-крапельницею; по 1 флакону в коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о.	Чеська Республіка	UA/2447/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці. Не охолоджувати і не заморожувати!
2316	СТОПТУСИН-ТЕВА	Cough suppressants and expectorants	сироп по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірною піпеткою у коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о.	Чеська Республіка	UA/10779/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття – 4 тижні.
2317	СТОПТУСИН-ТЕВА	Cough suppressants and expectorants	таблетки по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о. (виробництво за повним циклом)/ТОВ Тева Оперейшнз Поланд (виробництво за повним циклом)	Чеська Республіка/Польща	UA/2447/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2318	СТОПТУСИН-ТЕВА	Cough suppressants and expectorants	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	ТОВ Тева Оперейшнз Поланд (виробництво за повним циклом)	Польща	UA/2447/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2319	СТРЕПСІЛС® БЕЗ ЦУКРУ, ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА	Comb drug	льодяники по 8 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці; по 12 льодяників у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/4927/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2320	СТРЕПСІЛС® ДЛЯ ДІТЕЙ 6+	Comb drug	льодяники; по 12 льодяників у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/13607/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2321	СТРЕПСІЛС® З ВІТАМІНОМ С ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА	Comb drug	льодяники по 12 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/7436/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2322	СТРЕПСІЛС® З МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ	Comb drug	льодяники по 12 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/6400/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2323	СТРЕПСІЛС® З МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛІПТОМ	Comb drug	льодяники; по 12 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/6401/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2324	СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ	Flurbiprofen	спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза, по 15 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед (випуск серії)/Реккітт Бенкізер Хелскер Мануфекчурінг (Таїланд) Лімітед (виробництво, пакування та первинний випуск готового лікарського засобу)	Велика Британія/ Таїланд	UA/15692/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакона зберігати не більше 6 місяців. Не зберігати в холодильнику та не заморожувати.

2325	СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ БЕЗ ЦУКРУ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА	Flurbiprofen	льодяники по 8,75 мг; по 8 льодяників у блістері з маркуванням українською та англійською мовами, по 2 або 3 блістери у картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами; по 12 льодяників у блістері з маркуванням українською та англійською мовами, по 2 блістери у картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/18831/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2326	СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ З МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ	Flurbiprofen	льодяники по 8,75 мг, по 8 льодяників у блістері; по 2 блістери у коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/7696/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 ° С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2327	СТРЕПСІЛС® ОРИГІНАЛЬНИЙ	Comb drug	льодяники по 12 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/6479/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2328	СТРЕПСІЛС® ПЛЮС	Comb drug	льодяники; по 8 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	UA/3915/01/01	Зберігати при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2329	СТРЕПСІЛС® ПЛЮС	Comb drug	спрей оромукозний; по 20 мл у флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній коробці	Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Велика Британія	Делфарм Бладел Б.В.	Нідерланди	UA/6372/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2330	СТРЕПТОЦИД	Sulfanilamide	лінімент 5 %, по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/4611/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після розкриття туби препарат зберігати протягом курсу лікування.
2331	СТРЕПТОЦИД	Sulfanilamide	порошок нашкірний, по 2 г порошку або 5 г порошку у саше; по 20 саше у картонній коробці; по 15 г порошку у флаконі полімерному; по 1 флакону полімерному у картонній коробці	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	UA/17680/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2332	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 10 %	Sulfanilamide	мазь 10 % по 25 г у тубах; по 25 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/1090/02/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2333	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 10 %	Sulfanilamide	мазь 10 % по 25 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону; по 25 г у тубах алюмінієвих; по 25 г у контейнерах; по 25 г або по 40 у тубі ламінатній; по 1 тубі в пачці з картону; по 25 г або по 40 г у тубах ламінатних	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0385/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2334	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 5 %	Sulfanilamide	мазь 5 % по 25 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону; по 25 г у тубах алюмінієвих; по 25 г у контейнерах; по 25 г або по 40 г у тубі ламінатній; по 1 тубі в пачці з картону; по 25 г або по 40 г у тубах ламінатних	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0385/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2335	СТРЕС-ГРАН	Comb drug	гранули по 10 г гранул у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням; по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/3829/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
2336	СТРУКТУМ®	Chondroitin sulfate	капсули тверді по 500 мг; по 12 капсул у блістері; по 5 блістерів у картонній упаковці; по 20 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці	П'єр Фабр Медикамент	Франція	П'єр Фабр Медикамент Продакшн	Франція	UA/7504/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2337	СУБЕТТА	Comb drug	таблетки по 20 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/18297/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2338	СУБЕТТА	Comb drug	таблетки, по 20 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/18297/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

2339	СУДОКРЕМ	Comb drug	крем для зовнішнього застосування по 45 г або 60 г, або 75 г, або 125 г, або 150 г, або 250 г, або 300 г у поліпропіленовій баночці з контролем першого відкриття	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Троян АТ	Болгарія	UA/4451/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2340	СУЛЬФАРГИН® МІНІ	Silver sulfadiazine	мазь, 10 мг/г; по 15 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в картонній пачці	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ Талліннський фармацевтичний завод	Естонія	UA/20979/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не зберігати у холодильнику та морозильній камері. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2341	СУМІШ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ	Comb drug	розчин, по 40 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/0272/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!
2342	СУПЕРВІТ	Multivitamins and trace elements	таблетки жувальні, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/5698/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2343	СУПРАСТИН®	Chloropyramine	таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	UA/9251/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 о С у недоступному для дітей місці.
2344	СУПРАСТИН®	Chloropyramine	таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС	Угорщина	UA/9251/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 о С у недоступному для дітей місці.

2345	СУПРОСТИЛІН	Chloropyramine	таблетки по 0,025 г, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в пачці з картону	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	Україна	UA/6323/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2346	Т-СЕПТ®	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, розчин, 1,5 мг/мл по 30 мл у флаконі з пристроєм для розпилювання; по 1 флакону в картонній коробці	Амакса ЛТД	Велика Британія	АйСіЕн Польфа Жешув Ес.Ей.	Польща	UA/13494/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2347	ТАБАКУМ-ПЛЮС	Comb drug	гранули, по 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 10 г гранул у флаконі з кришкою, по 1 флакону в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/8408/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25оС.
2348	ТАБЕКС®	Cytisinicline	таблетки, вкриті оболонкою, по 1,5 мг, по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/АТ "Вітаміни" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)	Болгарія/ Україна	UA/2537/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи, при температурі не вище 25 °С.

2349	ТАБЕКС®	Cytisinicline	таблетки, вкриті оболонкою, по 1,5 мг, по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма"	Болгарія	UA/2537/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи, при температурі не вище 25 °С.
2350	ТАЗАЛОК™	Comb drug	краплі оральні, розчин; по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці; по 2 або 3 флакони у картонній коробці із роздільною вставкою	ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА"	Україна	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/8499/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2351	ТАЙЛОЛФЕН® ХОТ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 20 г порошку у пакеті; по 20 г порошку у пакеті; по 6 або 12 пакетів в картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/10897/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2352	ТАМІПУЛ®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	капсули, по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру в картонній пачці	ПРОФАРМА Інтернешнл Трейдинг Лімітед	Мальта	АТ "Гріндекс"/Драгенофарм Апотекер Пюшл ГмбХ	Латвія/ Німеччина	UA/8943/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2353	ТАМІПУЛ®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	капсули, по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру в картонній пачці	ПРОФАРМА Інтернешнл Трейдинг Лімітед	Мальта	АТ "Гріндекс"/Драгенофарм Апотекер Пюшл ГмбХ	Латвія/ Німеччина	UA/8943/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2354	ТАМІСТОЛ®	Myramistin*	супозиторії по 0,015 г, по 5 супозиторіїв у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці	КНВМП "ІСНА"	Україна	ПрАТ "Лекхім - Харків"	Україна	UA/13948/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2355	ТАМІСТОЛ®	Myramistin*	супозиторії по 0,015 г, по 5 супозиторіїв у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці	КНВМП "ІСНА"	Україна	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (випуск серії)/ПрАТ "Лекхім - Харків" (виробництво, пакування, контроль якості)/ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек" (виробництво, пакування, контроль якості)	Україна/ Україна/ Україна	UA/13948/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2356	ТАМІСТОЛ®	Myramistin*	супозиторії по 0,015 г, по 5 супозиторіїв у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"	Україна	ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (випуск серії)/ПрАТ "Лекхім - Харків" (виробництво, пакування, контроль якості)/ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек" (виробництво, пакування, контроль якості)	Україна/ Україна/ Україна	UA/13948/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2357	ТАНАКАН®	Ginkgo folium	таблетки, вкриті оболонкою, по 40 мг; по 15 таблеток у блістері; по 2 або 6 блістерів у картонній коробці	ІПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА, Акціонерне товариство спрощеного типу	Франція	БОФУР ІПСЕН ІНДУСТРІ	Франція	UA/9822/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2358	ТАНТІВЕРТ	Benzydamine	розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, по 120 мл у флаконі зі скла або пластику; по 1 флакону в комплекті з мірним стаканчиком у картонній коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (всі стадії циклу виробництва, крім контролю якості; первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії циклу виробництва крім випуску серії)	Україна/ Україна	UA/16355/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2359	ТАНТІВЕРТ	Benzydamine	розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, по 120 мл у флаконі зі скла або пластику; по 1 флакону в комплекті з мірним стаканчиком у картонній коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (всі стадії циклу виробництва, крім контролю якості; первинне та вторинне пакування, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії циклу виробництва крім випуску серії)	Україна/ Україна	UA/16355/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2360	ТАНТІВЕРТ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, по 30 мл у флаконі зі скла або з пластику; по 1 флакону зі спрей-дозатором у коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (випуск серії; всі стадії циклу виробництва крім контролю якості)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії циклу виробництва крім випуску серії)	Україна/ Україна	UA/16355/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2361	ТАНТІВЕРТ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, по 30 мл у флаконі зі скла або з пластику; по 1 флакону зі спрей-дозатором у коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (випуск серії; всі стадії циклу виробництва крім контролю якості)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії циклу виробництва крім випуску серії)	Україна/ Україна	UA/16355/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2362	ТАНТІВЕРТ	Benzydamine	таблетки зі смаком апельсину по 3 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (всі стадії циклу виробництва, крім контролю якості, первинного та вторинного пакування; первинне та вторинне пакування, випуск серії)/ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії циклу виробництва, крім випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод «ГНЦЛС" (контроль якості)	Україна/ Україна/ Україна	UA/16482/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2363	ТАНТІВЕРТ	Benzydamine	таблетки зі смаком евкаліпту по 3 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (всі стадії циклу виробництва, крім контролю якості, первинного та вторинного пакування; первинне та вторинне пакування, випуск серії)/ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії циклу виробництва, крім випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод «ГНЦЛС" (контроль якості)	Україна/ Україна/ Україна	UA/16484/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2364	ТАНТІВЕРТ	Benzydamine	таблетки зі смаком м'яти по 3 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (всі стадії циклу виробництва, крім контролюякості, первинного та вторинного пакування; первинне та вторинне пакування, випуск серії)/ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії циклу виробництва, крім випуску серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод «ГНЦЛС" (контроль якості)	Україна/ Україна/ Україна	UA/16483/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2365	ТАНТОРИС	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у флаконі зі спрей-насосом та насадкою поворотною; по 1 флакону у пачці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Конарк Інтелмед"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/20815/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2366	ТАНТУМ ВЕРДЕ®	Benzydamine	льодяники з м'ятним смаком по 3 мг; по 10 льодяників у стіку; по 2 або 3 стіки в картонній пачці; по 10 льодяників у блістері; по 2 або 3 блістери в картонній пачці	Азієнде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.	Італія	ДІШ АГ (відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)/П'ЄР ФАБР МЕДІКАМАН ПРОДЮКСЬОН (відповідальний за повний цикл; відповідальний за первинне та вторинне пакування)/Азієнде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А. (Відповідальний за контроль якості та випуск серії)	Швейцарія/ Франція/ Італія	UA/3920/03/01	Зберігати препарат при температурі не вище 25°С. Препарат необхідно зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи (для пакування у стіках). Зберігати у недоступному для дітей місці.

2367	ТАНТУМ ВЕРДЕ®	Benzydamine	льодяники з м'ятним смаком по 3 мг; по 10 льодяників у стіку; по 2 або 3 стіки в картонній пачці; по 10 льодяників у блістері; по 2 або 3 блістери в картонній пачці	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.	Італія	ДІШ АГ (відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)/П'ЄР ФАБР МЕДІКАМАН ПРОДЮКСЬОН (відповідальний за повний цикл; відповідальний за первинне та вторинне пакування)/Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А. (Відповідальний за контроль якості та випуск серії)	Швейцарія/ Франція/ Італія	UA/3920/03/01	Зберігати препарат при температурі не вище 25°С. Препарат необхідно зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи (для пакування у стіках). Зберігати у недоступному для дітей місці.
2368	ТАНТУМ ВЕРДЕ®	Benzydamine	розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, по 120 мл або 240 мл у флаконі з мірним стаканчиком; по 1 флакону у картонній коробці	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.	Італія	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.	Італія	UA/3920/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2369	ТАНТУМ ВЕРДЕ®	Benzydamine	розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл; по 120 мл у флаконі з мірним стаканчиком; по 1 флакону у картонній коробці	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.	Італія	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.	Італія	UA/3920/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2370	ТЕВАЛОР-ТЕВА	Comb drug	таблетки для смоктання по 20 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній пачці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Дупниця АТ/Балканфарма-Разград АТ	Болгарія/ Болгарія	UA/4271/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у місцях, недоступних для дітей!
2371	ТЕМПАЛГІН®	Metamizole sodium, combinations with psycholeptics	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма" (Виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка, дозвіл на випуск серії або виробництво за повним циклом; вторинна упаковка)/АТ "ВІТАМІНИ" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)	Болгарія/ Україна	UA/3553/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2372	ТЕНОТЕН	Comb drug	таблетки, по 20 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/4206/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2373	ТЕНОТЕН ДИТЯЧИЙ	Comb drug	таблетки, по 20 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/8588/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2374	ТЕОБОН-ДИТІОМІКОЦИД	Mono	мазь 5 % по 15 г у тубі; по 1 тубі у пачці	Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України	Україна	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України"	Україна	UA/4171/02/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2375	ТЕПЛОРИН	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 12,75 г у саше, по 10 саше в коробці з картону	ТОВ "БЕРКАНА+"	Україна	ТОВ "Астрафарм"	Україна	UA/20930/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2376	ТЕРАЛІВ®	Naproxen	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 220 мг; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Байєр Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Байєр Біттерфельд ГмбХ	Німеччина	UA/19482/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2377	ТЕРАФЛЕКС АДВАНС®	Comb drug	капсули; по 60 або 120 капсул у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Контракт Фармакал Корпорейшн (виробник, відповідальний за пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за виробництво in bulk)	США	UA/4142/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2378	ТЕРАФЛЕКС®	Comb drug	капсули; по 30, або 60, або 120 або 200 капсул у пластиковому флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "Байєр"	Україна	Контракт Фармакал Корпорейшн (виробник, відповідальний за пакування, контроль та випуск серії; відповідальний за виробництво in bulk)	США	UA/7749/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2379	ТЕРАФЛЮ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину зі смаком лісових ягід; 1 пакет з порошком; 10 пакетів з порошком у картонній коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Халеон ЮС Інк.	США	UA/5436/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2380	ТЕРАФЛЮ ВІД ГРИПУ ТА ЗАСТУДИ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; 1 пакет з порошком; 10 пакетів з порошком у картонній коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	ДЕЛЬФАРМ ОРЛЕАН	Франція	UA/5529/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2381	ТЕРАФЛЮ ЕКСТРА ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; 1 пакет з порошком; 10 пакетів з порошком у картонній коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Халеон Алкала С.А.	Іспанія	UA/5797/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2382	ТЕРБІНАФІН	Terbinafine	крем 1 % по 15 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/6688/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2383	ТЕРБІНОРМ	Terbinafine	спрей нашкірний, розчин, 10 мг/г, по 20 мл у флаконі з розпилювачем та захисним ковпачком, по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18389/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат використати протягом 3 місяців.
2384	ТЕРБІНОРМ	Terbinafine	спрей нашкірний, розчин, 10 мг/г; по 20 мл у флаконі з розпилювачем та захисним ковпачком, по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18389/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. .
2385	ТЕРБІНОРМ	Terbinafine	спрей нашкірний, розчин, 10,08 мг/мл по 20 мл у флаконі з розпилювачем та ковпачком-кришкою, по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л.	Румунія	UA/13367/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2386	ТЕРБІНОРМ	Terbinafine	спрей нашкірний, розчин, 10,08 мг/мл по 20 мл у флаконі з розпилювачем та ковпачком-кришкою, по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л.	Румунія	UA/13367/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2387	ТЕРМІДОЛ	Ibuprofen	капсули м'які по 200 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 3 блістери у пачці; по 12 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18326/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2388	ТЕРМІДОЛ	Ibuprofen	капсули м'які по 200 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 3 блістери у пачці; по 12 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18326/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2389	ТЕРМІДОЛ	Ibuprofen	капсули м'які по 400 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 3 блістери у пачці; по 12 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18326/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2390	ТЕРМІДОЛ	Ibuprofen	капсули м'які по 400 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 3 блістери у пачці; по 12 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/18326/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2391	ТЕСАЛІН	Mono	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 2 або 6 блістерів у картонній коробці	Амакса Лтд	Велика Британія	Макс Целлєр Зьоне АГ (виробництво за повним циклом)/Інтерлабор Белп АГ (контроль якості)/Лабор Цоллінгер АГ (контроль якості)	Швейцарія/ Швейцарія/ Швейцарія	UA/17262/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2392	ТЕТ 36.6® З АРОМАТОМ АКАЦІЇ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 13,1 г в саше-пакеті; по 5 або 10 саше-пакетів у пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків"	Україна	UA/17419/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2393	ТЕТ 36.6® З АРОМАТОМ ЛИМОНУ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 13,1 г в саше-пакеті; по 5 або 10 саше-пакетів у пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"	Україна	UA/17816/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2394	ТЕТ 36.6® МАКСІ 3 АРОМАТОМ ЛИМОНУ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 23 г у саше-пакеті; по 5 або 10 саше-пакетів у пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків"	Україна	UA/17386/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2395	ТЕТ 36.6® МАКСІ 3 АРОМАТОМ МАЛИНИ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 23 г у саше-пакеті; по 5 або 10 саше-пакетів у пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"	Україна	UA/17861/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2396	ТЕТ 36.6® РАПІД 3 АРОМАТОМ АКАЦІЇ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 23 г в саше-пакеті, по 5 або 10 саше-пакетів у пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків"	Україна	UA/17387/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2397	ТЕТ 36.6® РАПІД 3 АРОМАТОМ ЛИМОНУ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 23 г в саше-пакеті; по 5 або 10 саше-пакетів у пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків"	Україна	Приватне акціонерне товариство "Лекхім – Харків"	Україна	UA/17420/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2398	ТЕТРАМОЛ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	капсули по 6 капсул у блістерах; по 6 капсул у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній пачці; по 6 капсул у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці; по 10 картонних пачок у картонному коробі	ПРОФАРМА Інтернешнл Трейдинг Лімітед	Мальта	АТ "Гріндекс"/Драген офарм Апотекер Пюшл ГмбХ	Латвія/ Німеччина	UA/13734/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2399	ТЕТРАМОЛ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	капсули по 6 капсул у блістерах; по 6 капсул у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній пачці; по 6 капсул у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці; по 10 картонних пачок у картонному коробі	ПРОФАРМА Інтернешнл Трейдинг Лімітед	Мальта	АТ "Гріндекс"/Драгенофарм Апотекер Пюшл ГмбХ	Латвія/ Німеччина	UA/13734/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2400	ТИГОФАСТ-120	Fexofenadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 120 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці	Ананта Медікеар Лтд.	Велика Британія	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд./Ананта Медікеар Лімітед	Індія/ Індія/Індія	UA/2730/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.
2401	ТИГОФАСТ-180	Fexofenadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 180 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці	Ананта Медікеар Лтд.	Велика Британія	Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд./Ананта Медікеар Лімітед	Індія/ Індія/Індія	UA/2730/01/02	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.
2402	ТИЗИН® БІО	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,1 %, по 10 мл у флаконі з дозатором для розпилення, що містить срібну спіраль та захисним ковпачком; по 1 флакону у картонній упаковці	МакНіл Продактс Лімітед	Англія	Фамар Хелс Кеар Сервісиз Мадрид, С.А.У.	Іспанія	UA/14228/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого розкриття упаковки – 1 рік.

2403	ТИЗИН® КСИЛО	Xylometazoline	краплі назальні, розчин 0,05 % по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці	МакНіл Продактс Лімітед	Англія	ДЕЛЬФАРМ ОРЛЕАН	Франція	UA/4817/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Термін придатності препарату після розкриття флакона - 24 тижні
2404	ТИЗИН® КСИЛО	Xylometazoline	краплі назальні, розчин 0,1 % по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці	МакНіл Продактс Лімітед	Англія	ДЕЛЬФАРМ ОРЛЕАН	Франція	UA/4817/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Термін придатності препарату після розкриття флакона - 24 тижні.
2405	ТИЗИН® КСИЛО	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,05 % по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці	МакНіл Продактс Лімітед	Англія	Дельфарм Орлеан	Франція	UA/8179/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Термін придатності препарату після розкриття флакона - 24 тижні.
2406	ТИЗИН® КСИЛО	Xylometazoline	спрей назальний, розчин 0,1 % по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці	МакНіл Продактс Лімітед	Англія	Дельфарм Орлеан	Франція	UA/8179/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Термін придатності препарату після розкриття флакона - 24 тижні.
2407	ТИЗИН® ПАНТЕНОЛ	Xylometazoline, combinations	спрей назальний, розчин; по 10 мл у флаконі з дозатором для розпилення, що містить срібну спіраль, та захисним ковпачком; по 1 флакону у картонній упаковці	МакНіл Продактс Лімітед	Англія	МакНіл АБ (контроль якості)/Фамар Хелс Кеар Сервісиз Мадрид, С.А.У. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)	Швеція/ Іспанія	UA/20087/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2408	ТИЗИН® ПАНТЕНОЛ ДИТЯЧИЙ	Xylometazoline, combinations	спрей назальний, розчин; по 10 мл у флаконі з дозатором для розпилення, що містить срібну спіраль та захисним ковпачком; по 1 флакону у картонній упаковці	МакНіл Продактс Лімітед	Англія	МакНіл АБ (контроль якості)/Фамар Хелс Кеар Сервісиз Мадрид, С.А.У. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)	Швеція/ Іспанія	UA/20086/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2409	ТИРОЗУР	Tyrothricin	гель, 1 мг/г; по 5 г або по 25 г гелю у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Енгельгард Арцнаймiттель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Енгельгард Арцнаймiттель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/7786/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття туби – 3 місяці.
2410	ТИРОЗУР	Tyrothricin	порошок нашкірний, 1 мг/г по 5 г або 20 г порошку у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Енгельгард Арцнаймiттель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Енгельгард Арцнаймiттель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/7786/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2411	ТІВОМАКС® А	Arginine aspartate*	розчин оральний, 200 мг/мл по 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою або мірним стаканчиком у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/16994/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після розкриття флакона — 14 діб.
2412	ТІВОРТІН® АСПАРТАТ	Arginine aspartate*	розчин оральний, 200 мг/мл; по 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою у коробці з картону	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	ТОВ "Юрія-Фарм"	Україна	UA/9941/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Термін придатності після розкриття флакона – 14 діб.
2413	ТОКСЕКС СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні, по 30 мл або по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/13608/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2414	ТОКСЕКС СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні, по 30 мл або по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/13608/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2415	ТОНЗИЛЕКС	Comb drug	спрей для ротової порожнини; по 50 мл у флаконі зі спрей-насосом та насадкою горловою; по 1 флакону у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/16727/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2416	ТОНЗИЛОТРЕН	Comb drug	таблетки; по 20 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ (Виробник, відповідальний за кінцевий продукт, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)	Німеччина	UA/3781/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2417	ТОНЗИХЕЛП	Benzydamine	спрей для ротової порожнини, розчин 3 мг/мл, по 30 мл розчину у флаконі з дозуючим пристроєм та розпилювачем, по 1 флакону в коробці	Ананта Медікеар Лтд.	Велика Британія	АТ "Стома"	Україна	UA/19242/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2418	ТОНЗІРИН	Comb drug	льодяники пресовані по 10 льодяників у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній пачці; по 12 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	Адіфарм ЕАД	Болгарія	UA/20447/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С.

2419	ТОС-МАЙ	Comb drug	таблетки по 8 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	СПЕРКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД	Кіпр	ЛАБОРАТОРІОС АЛКАЛА ФАРМА, С.Л.	Іспанія	UA/2104/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2420	ТОТЕМА	Comb drug	розчин оральний; по 10 мл в ампулі; по 10 ампул в чарунковій упаковці; по 2 чарункові упаковки в картонній коробці	ЛАБОРАТОРІЯ ІННОТЕК ІНТЕРНАСЬЙОНАЛЬ	Франція	Іннотера Шузі	Франція	UA/7854/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2421	ТРАНЗІЛАН	Ispaghula (psylla seeds)	порошок для оральної суспензії (40,231 г/100 г) по 7 г у саше № 20, по 140 г у банках № 1	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі	Франція	UA/4084/01/01	Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2422	ТРАУМЕЛЬ С	Comb drug	мазь по 50 г або по 100 г у тубі; по 1 тубі в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/5934/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці!
2423	ТРАУМЕЛЬ С	Comb drug	таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому, по 1 контейнеру в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/5934/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
2424	ТРАХІСАН	Comb drug	таблетки для смоктання; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Альпен Фарма АГ	Швейцарія	Енгельгард Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.КГ/ТОВ "ПІК-ФАРМ" (виробник, що відповідає за ввезення, контроль та випуск серії)	Німеччина /Україна	UA/6121/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, недоступному для дітей місці.

2425	ТРИВАЛУМЕН	Comb drug	капсули по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у пачці	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	UA/3804/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2426	ТРИКАРДИН	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток в блістері; по 2 або по 4 блістери у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/17544/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2427	ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ	Comb drug	краплі оральні по 25 мл у скляному флаконі-крапельниці або у флаконі полімерному з пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці; по 25 мл у скляному флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах скляних або у флаконах полімерних з пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці; по 50 мл у скляному флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8447/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2428	ТРИКОЛД МІКС®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	гранули для орального розчину зі смаком лимона, по 5 г у саше, по 5 або по 10, або по 20 саше у картонній упаковці	Амакса Лтд	Велика Британія	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/19391/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2429	ТРИКОЛД МІКС®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	гранули для орального розчину зі смаком полуниці, по 5 г у саше, по 5 або по 10, або по 20 саше у картонній упаковці	Амакса Лтд	Велика Британія	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/19389/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2430	ТРИКОЛД МІКС®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	гранули для орального розчину зі смаком чорної смородини, по 5 г у саше, по 5 або по 10, або по 20 саше у картонній упаковці	Амакса Лтд	Велика Британія	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/19390/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2431	ТРИМІСТИН®-ДАРНИЦЯ	Triamcinolone and antiseptics	мазь по 14 г у тубі; по 1 тубі у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/6123/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2432	ТРИНЕФРОН-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	капсули по 10 капсул у блістері; по 3 або по 6 блістерів у коробці з картону (для виробника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я»); по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у коробці з картону (для виробника Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП»)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/11689/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2433	ТРИНЕФРОН-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	краплі оральні; по 50 мл або 100 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/11689/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності препарату після розкриття флакона – 6 місяців.
2434	ТРИЦИТРОН	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину у саше; по 10 або 30 саше у картонній коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/19534/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці.
2435	ТРИЦИТРОН ЕКСТРА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 10 або 30 саше у картонній коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/18162/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2436	ТРИЦИТРОН ЕКСТРА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 10 або 30 саше у картонній коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС"	Україна	UA/18162/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2437	ТРІОФОРТЕ®	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	капсули; по 6 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)	Україна	UA/2317/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2438	ТРІОФОРТЕ®	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	капсули; по 6 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)	Україна	UA/2317/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2439	ТРОКСЕВАЗИН ®	Troxerutin	гель 2 % по 40 г у мембранній алюмінієвій або мембранній ламінатній тубі; по 1 тубі в картонній пачці; по 20 г або по 100 г у мембранній ламінатній тубі; по 1 тубі в картонній пачці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Троян АТ	Болгарія	UA/3368/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати! Зберігати у недоступному для дітей місці.
2440	ТРОКСЕВАЗИН ®	Troxerutin	капсули по 300 мг; по 10 капсул у блістері; по 5 або по 10 блістерів у картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Разград АТ	Болгарія	UA/3368/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2441	ТРОКСЕВЕНОЛ	Troxerutin, combinations	гель по 40 г у тубах; по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/7201/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2442	ТРОКСЕГЕЛЬ®	Troxerutin	гель 2 % по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці із картону	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/1083/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2443	ТРОКСЕРУТИН	Troxerutin	гель 2 %; по 40 г або 100 г у тубі, по одній тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/20067/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати! Зберігати у недоступному для дітей місці.
2444	ТРОКСЕРУТИН	Troxerutin	гель, 20 мг/г по 35 г гелю у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/3917/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2445	ТРОКСЕРУТИН	Troxerutin	капсули по 300 мг; по 10 капсул у блістері; по 3 або по 6 блістерів у картонній пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/16133/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

2446	ТРОКСЕРУТИН-ДАРНИЦЯ	Troxerutin	гель, 20 мг/г по 30 г або 50 г в тубі, по 1 тубі у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/4933/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2447	ТРОКСИМЕТАЦИН	Troxerutin	гель 2%; по 40 г в тубі; по 1 тубі в картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Болгарія	ВЕТПРОМ АД, виробнича дільниця Віфарма	Болгарія	UA/20137/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття туби 1 місяць.
2448	ТРОМБО АСС 100 МГ	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці	ТОВ "БАУШ ХЕЛС УКРАЇНА"	Україна	Г.Л. Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за випуск продукту)	Австрія	UA/5373/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2449	ТРОМБОЛІК-КАРДІО	Acetylsalicylic acid	таблетки кишковорозчинні по 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 2, по 3 або по 10 блістерів у картонній пачці	ПрАТ "Технолог"	Україна	ПрАТ "Технолог"	Україна	UA/10697/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2450	ТРОМБОЦИД	Pentosan polysulfate sodium	гель 15 мг/г по 40 г або по 100 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	бене-Арцнаймiттель ГмбХ	Німеччина	С.Р.М. КонтрактФарма ГмбХ (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування)/бене-Арцнаймiттель ГмбХ (Контроль якості; дозвіл на випуск серії)/Лабор фюр аналютіше унд фармацойтіше Хемі Др.Гранер & Партнер ГмбХ (мікробіологічний контроль)	Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/9234/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого розкриття туби – 6 місяців. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2451	ТУСПАН®	Butamirate	сироп 1,5 мг/мл по 100 мл або 200 мл сиропу у флаконах полімерних, закупорених кришками полімерними, по 1 флакону з мірним стаканчиком у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/20023/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Термін придатності після розкриття флакона — 1 місяць.
2452	ТУТУКОН	Comb drug	розчин оральний, по 300 мл або по 600 мл у поліпропіленовому флаконі; по 1 флакону разом з пластиковим мірним стаканчиком у картонній пачці	Гранд Медикал Груп АГ	Швейцарія	Мігуель і Гарріга, С.Л.	Іспанія	UA/13218/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2453	УГРЕСОЛ	Benzoyl peroxide	лосьйон 10 % по 30 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці	Фармасайнс Інк.	Канада	Фармасайнс Інк.	Канада	UA/8219/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2454	УГРИН®	Comb drug	настойка, по 100 мл у флаконі або у банці; по 1 флакону або по 1 банці в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8220/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2455	УКРЕНЗИМ 10000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули тверді з гастрорезистентними гранулами по 150 мг, по 10 капсул у блістері, по 2 або 10 блістерів у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)	Індія/ Україна	UA/20187/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2456	УНДЕВІТ	Comb drug	драже, по 50 драже у контейнері, по 1 контейнеру в пачці з картону; по 50 драже у контейнері	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/5605/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2457	УНДЕВІТ	Comb drug	драже; по 50 драже у контейнерах (баночках); по 50 драже у контейнері (баночці); по 1 контейнеру (баночці) у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/7922/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2458	УНДЕТАБ	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/4834/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2459	УПЕЛВА СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні по 30 мл, 50 мл у флаконі з крапельним дозатором; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/16025/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2460	УПСАРИН УПСА 500 мг	Acetylsalicylic acid	таблетки шипучі по 500 мг; по 4 таблетки у стрипі; по 4 стрипи у картонній коробці	УПСА САС	Франція	УПСА САС	Франція	UA/2308/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2461	УПСАРИН УПСА 3 ВІТАМІНОМ С	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки шипучі; по 10 таблеток у тубі; по 1 або 2 туби у картонній коробці	УПСА САС	Франція	УПСА САС	Франція	UA/7598/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в щільно закритій тубі для запобігання проникненню вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2462	УРЕОТОП®	Carbamide	мазь 12 % по 50 г або по 100 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВ "МІБЕ УКРАЇНА"	Україна	мібе ГмбХ Арцнаймітель	Німеччина	UA/11751/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Після розкриття туби – 6 місяців.

2463	УРО-ГРАН	Comb drug	гранули; по 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 10 г гранул у флаконі з кришкою, по 1 флакону в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/8455/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25оС.
2464	УРОЛЕСАН®	Comb drug	капсули по 10 капсул у блістері; по 4 блістери в пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/10393/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2465	УРОЛЕСАН®	Comb drug	краплі оральні по 25 мл у флаконі-крапельниці, по 1 флакону-крапельниці в пачці; по 25 мл у флаконі-крапельниці, закритому кришкою з контролем першого розкриття, по 1 флакону-крапельниці в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/2727/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2466	УРОЛЕСАН®	Comb drug	сироп по 90 мл у банці; по 1 банці у пачці; по 90 мл або по 180 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці, або по 5 мл в саше, по 15 або 16 саше в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм" (усі стадії виробництва, за винятком первинного пакування в саше)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (первинне пакування в саше)	Україна/ Україна	UA/2727/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після відкриття зберігати не більше 28 діб при температурі від 2 °С до 8 °С. Перед вживанням збовтувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2467	УРОНЕФРОН®	Comb drug	гель; по 100 г у тубі; по 1 тубі у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/11226/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місті.
2468	УРОНЕФРОН®	Comb drug	краплі; по 25 мл або 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/11226/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місті. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2469	УРОНЕФРОН®	Comb drug	сироп по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з дозуючою ложкою у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/11100/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місті.
2470	УРОФЛОКС	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/21249/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2471	УРОХОЛУМ	Comb drug	краплі оральні по 25 мл або по 40 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/11755/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2472	УРОХОЛУМ®	Comb drug	капсули по 50 мг, по 10 капсул у блістері, по 2 або по 4, або по 6, або по 9 блістерів в коробці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18562/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2473	УСПОКОЙ	Comb drug	таблетки; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/7857/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2474	УФАЛАЗА	Comb drug	таблетки; по 20 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	ТОВ "Матеріа Медика-Україна"	Україна	ЗАТ Сантоніка	Литва	UA/18563/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

2475	ФАЗЕКС®	Dimetindene	гель, 0,1 %, по 30 г в алюмінієвій тубі, по 1 тубі у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20481/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття туби препарат зберігати не більше 60 днів.
2476	ФАКОВІТ	Comb drug	таблетки шлунковорозчинні + таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні; по 10 шлунковорозчинних таблеток у блістері та по 10, вкритих оболонкою, кишковорозчинних таблеток у блістері; по 6 блістерів (по три блістери кожного виду таблеток) у картонній коробці; по 30 шлунковорозчинних таблеток у блістері та по 30, вкритих оболонкою, кишковорозчинних таблеток у блістері; по 2 блістери (по одному блістеру кожного виду таблеток) у картонній коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/7664/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2477	ФАНИГАН® ФАСТ	Comb drug	гель по 30 г або по 100 г у алюмінієвій або ламінованій тубі; по 1 тубі у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	Кусум Хелтхкер Пвт Лтд (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)	Індія/ Україна	UA/7665/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2478	ФАРИНГОСЕПТ	Ambazone	льодяники пресовані по 10 мг; по 10 льодяників у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Терапія АТ	Румунія	UA/6511/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2479	ФАРИНГОСЕПТ	Ambazone	льодяники пресовані по 10 мг; по 10 льодяників у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Терапія АТ	Румунія	UA/6511/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2480	ФАРИНГОСЕПТ ЗІ СМАКОМ КОРИЦІ	Ambazone	льодяники пресовані по 10 мг; по 10 льодяників у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Терапія АТ	Румунія	UA/17752/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2481	ФАРИНГОСЕПТ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА	Ambazone	льодяники пресовані по 10 мг, по 10 льодяників у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Терапія АТ	Румунія	UA/0019/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2482	ФАРИНГОСЕПТ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА	Ambazone	льодяники пресовані по 10 мг, по 10 льодяників у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Терапія АТ	Румунія	UA/0019/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2483	ФАРИНГОСЕПТ ЗІ СМАКОМ М'ЯТИ	Ambazone	льодяники пресовані, по 10 мг; по 10 льодяників у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Терапія АТ	Румунія	UA/17721/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2484	ФАРИНГОСЕПТ ЗІ СМАКОМ РОМУ	Ambazone	льодяники пресовані, по 10 мг; по 10 льодяників у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Терапія АТ	Румунія	UA/17771/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2485	ФАРИНГОСЕПТ ЗІ СМАКОМ РОМУ	Ambazone	льодяники пресовані, по 10 мг; по 10 льодяників у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Терапія АТ	Румунія	UA/17771/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2486	ФАРИСІЛ СПРЕЙ ВІД БОЛЮ У ГОРЛІ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком лимону, 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці або по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20108/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2487	ФАРИСІЛ СПРЕЙ ВІД БОЛЮ У ГОРЛІ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком лимону, 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці або по 30 мл, або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20108/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

2488	ФАРИСІЛ СПРЕЙ ВІД БОЛЮ У ГОРЛІ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком лимону, 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці або по 30 мл, або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20108/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2489	ФАРИСІЛ СПРЕЙ ВІД БОЛЮ У ГОРЛІ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком м'яти, 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці або по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20107/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

2490	ФАРИСІЛ СПРЕЙ ВІД БОЛЮ У ГОРЛІ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком м'яти, 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці або по 30 мл, або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20107/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2491	ФАРИСІЛ СПРЕЙ ВІД БОЛЮ У ГОРЛІ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком м'яти, 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці або по 30 мл, або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20107/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

2492	ФАРІ ВЕРДЕ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з поліетиленовою кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці або по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	UA/16539/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2493	ФАРІ ВЕРДЕ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з поліетиленовою кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці або по 30 мл, або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	UA/16539/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2494	ФАРІ ВЕРДЕ	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з поліетиленовою кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці або по 30 мл, або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачції	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	UA/16539/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2495	ФАРІДАМІН	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком лимона 1,5 мг/мл, по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону або по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20396/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2496	ФАРІДАМІН	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком лимона 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону або по 30 мл, або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20396/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2497	ФАРІДАМІН	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком лимона 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону або по 30 мл, або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20396/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2498	ФАРІДАМІН	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком м'яти 1,5 мг/мл, по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону або по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20395/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2499	ФАРІДАМІН	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком м'яти 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону або по 30 мл, або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20395/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2500	ФАРІДАМІН	Benzydamine	спрей для ротової порожнини зі смаком м'яти 1,5 мг/мл; по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону або по 30 мл, або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20395/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2501	ФАРІНГТОН	Comb drug	таблетки для смоктання; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/7230/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2502	ФАРЛІНЕКС	Comb drug	спрей оромукозний, розчин по 30 мл у флаконі; по 1 флакону з насосом-розпилювачем та аплікатором в картонній коробці	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	UA/17111/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2503	ФАРМАДОЛ®	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3, або 5 блістерів у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/8183/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2504	ФАРМАДОЛ®	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3, або 5 блістерів у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/8183/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2505	ФАРМАДОЛ® МАКС	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/20050/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2506	ФАРМАЗОЛІН®	Xylometazoline	краплі назальні 0,05 % по 10 мл у флаконі або у флаконі з дозатором; по 1 флакону в пачці з картону; по 10 мл у флаконі закупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/1880/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат придатний до використання 28 діб. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2507	ФАРМАЗОЛІН®	Xylometazoline	краплі назальні 0,1 % по 10 мл у флаконі або у флаконі з дозатором; по 1 флакону в пачці з картону; по 10 мл у флаконі закупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону.	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/1880/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат придатний до використання 28 діб. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

2508	ФАРМАЗОЛІН® З М`ЯТОЮ ТА ЕВКАЛІПТОМ	Xylometazoline	спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, по 10 мл у флаконі; по 1 флаконі у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/15996/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2509	ФАРМАЗОЛІН® Н	Xylometazoline	спрей назальний, 1 мг/мл; по 15 мл або по 20 мл у флакони поліетиленові; забезпечені насадкою з дозатором і захисним ковпачком; по 1 флакону у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/1881/02/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2510	ФАРМАЛГІН	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/7541/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2511	ФАРМАТЕКС	Benzalkonium	крем вагінальний 1,2 % по 72 г у тубі у комплекті з аплікатором-дозатором, по 1 тубі у картонній коробці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі (виробник відповідальний за вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Лабораторія Шеміно (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії)	Франція/ Франція	UA/1340/04/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

2512	ФАРМАТЕКС	Benzalkonium	супозиторії вагінальні по 18,9 мг, по 5 супозиторіїв у блістері, по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі (виробник відповідальний за вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Юнітер Ліквід Мануфекчурінг (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії)	Франція/ Франція	UA/1340/03/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2513	ФАСПІК	Ibuprofen	таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг; по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній пачці	Замбон С.П.А.	Італія	Замбон С.П.А.	Італія	UA/5137/02/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2514	ФАСТИН	Comb drug	мазь по 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/4614/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2515	ФЕКСОФАСТ	Fexofenadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 120 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Мікро Лабс Лімітед	Індія	Мікро Лабс Лімітед	Індія	UA/5119/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. У недоступному для дітей місці.

2516	ФЕКСОФАСТ	Fexofenadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 180 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Мікро Лабс Лімітед	Індія	Мікро Лабс Лімітед	Індія	UA/5119/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. У недоступному для дітей місці.
2517	ФЕКСОФЕН-САНОВЕЛЬ	Fexofenadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 120 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш.	Туреччина	Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш.	Туреччина	UA/10632/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2518	ФЕКСОФЕН-САНОВЕЛЬ	Fexofenadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 180 мг, по 10 таблеток у блістери; по 1 або 2 блістери у картонній коробці	Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш.	Туреччина	Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш.	Туреччина	UA/10632/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2519	Феліта	Glycine max**	таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1, або 3, або 6 блістерів у картонній упаковці	Біофарм Лтд.	Польща	Біофарм Лтд.	Польща	UA/4448/01/01	Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2520	ФЕМІВАГ	Lactobacillus	капсули вагінальні по 10 капсул в тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	АДМ Данія А/С	Данія	UA/15239/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2521	ФЕМІКЛІН	Dequalinium	таблетки вагінальні по 10 мг; по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/17193/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2522	ФЕМІФУЦИН	Natamycin	песарії по 100 мг, по 3 песарія у стрипі; по 1 або 2 стрипи у картонній пачці	ТОВ "БЕРКАНА+"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/16372/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2523	ФЕНІМАКС	Dimetindene	краплі оральні, 1 мг/мл, по 20 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/20364/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2524	ФЕНКАРОЛ®	Quifenadine	таблетки по 10 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону	АТ "Олфа"	Латвія	АТ "Олфа"	Латвія	UA/3782/01/02	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2525	ФЕНКАРОЛ®	Quifenadine	таблетки по 25 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	АТ "Олфа"	Латвія	АТ "Олфа"	Латвія	UA/3782/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2526	ФЕНКАРОЛ®	Quifenadine	таблетки по 50 мг; по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	АТ "Олфа"	Латвія	АТ "Олфа"	Латвія	UA/3782/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2527	ФЕНОКІТ	Dimetindene	краплі оральні, 1 мг/мл; по 20 мл у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємсво "СПЕРКО УКРАЇНА"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/16281/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2528	ФЕНХЕЛЮ ПЛОДИ	Foeniculum vulgare**	плоди по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/6032/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

2529	ФЕРВЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; 8 саше у картонній коробці	УПСА САС	Франція	УПСА САС	Франція	UA/7600/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
2530	ФЕРВЕКС ДЛЯ ДОРОСЛИХ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 8 саше у картонній коробці	УПСА САС	Франція	УПСА САС	Франція	UA/7741/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2531	ФЕРВЕКС ДЛЯ ДОРОСЛИХ З МАЛИНОВИМ СМАКОМ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; 8 саше у картонній коробці	УПСА САС	Франція	УПСА САС	Франція	UA/3128/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2532	ФЕСТАЛ® НЕО 10 000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні № 20 (20 х 1): по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/14533/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2533	ФІАЛКИ ТРАВА	Herba Violae**	трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2269/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.
2534	ФІРУЛІН 10000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули тверді з гастрорезистентними гранулами по 150 мг; по 10 капсул у блістері, по 2 або 10 блістерів у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20188/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2535	ФІРУЛІН 10000	Multienzymes (lipase, protease etc.)	капсули тверді з гастрорезистентними гранулами по 150 мг; по 10 капсул у блістері, по 2 або 10 блістерів у картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20188/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2536	ФІТОБЕНЕ®	Comb drug	гель для зовнішнього застосування по 20 г або по 40 г, або по 100 г у тубі, по 1 тубі у пачці з картону	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/3922/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2537	ФІТОБРОНХОЛ	Comb drug	збір по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/14186/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2538	ФІТОГАСТРОЛ	Comb drug	збір по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/14230/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2539	ФІТОГЕПАТОЛ	Comb drug	збір по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр пакетів у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/14509/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2540	ФІТОДЕНТ®	Comb drug	настойка по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці з картону; по 100 мл у банці скляній; по 1 банці в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/3681/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2541	ФІТОКАН-ГНЦЛС	Comb drug	рідина; по 50 мл, 100 мл у флаконі; по 1 флакону в коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/9880/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
2542	ФІТОЛІЗИН ПЛЮС	Comb drug	паста по 100 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/4557/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2543	ФІТОЛІЗИН®	Comb drug	паста для приготування суспензії для орального застосування по 100 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А.	Польща	ТОВ Гербаполь Варшава	Польща	UA/0471/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не використовувати препарат після закінчення терміну придатності!
2544	ФІТОЛІТ	Comb drug	капсули, по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/3650/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2545	ФІТОЛІТ	Comb drug	розчин оральний; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом зі шприц-дозатором складеним у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/13118/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2546	ФІТОЛІТ ФОРТЕН	Comb drug	капсули; по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці (для виробника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я»); по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у картонній коробці (для виробника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП", Україна)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/3650/02/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2547	ФІТОНЕФРОЛ	Comb drug	збір по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/14132/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
2548	ФІТОСЕДАН	Comb drug	збір по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр пакетів у пачці з внутрішнім пакетом	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/14454/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2549	ФІТОСЕД®	Comb drug	капсули; по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/7511/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2550	ФІТОСЕД®	Comb drug	настойка, по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці; по 100 мл у банці скляній; по 1 банці в пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/3373/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2551	ФІТУЛВЕНТ ФІТОБАЛЬЗАМ	Comb drug	бальзам, по 200 мл, 250 мл або 500 мл у пляшках; по 100 мл у банках	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/10255/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.
2552	ФЛАВАМЕД® ТАБЛЕТКИ ВІД КАШЛЮ	Ambroxol	таблетки по 30 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2, або по 5 блістерів у картонній коробці	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ	Німеччина	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування та контроль серій)	Німеччина / Німеччина	UA/3591/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2553	ФЛАВАМЕД® ТАБЛЕТКИ ВІД КАШЛЮ	Ambroxol	таблетки по 30 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2, або по 5 блістерів у картонній коробці	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ	Німеччина	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво "in bulk", пакування, контроль та випуск серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво "in bulk", пакування та контроль серій)	Німеччина / Німеччина	UA/3591/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2554	ФЛАВЕНОРМ	Diosmin, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг; по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/20990/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2555	ФЛАВОВІР®	Comb drug	краплі по 10 мл або по 30 мл, або по 50 мл у скляному світлозахисному флаконі, закупореному кришкою для флаконів з пробкою-крапельницею з контролем першого відкриття або кришкою для флаконів з пробкою-крапельницею з контролем першого відкриття та захистом від дітей; по 1 флакону в картонній пачці	ТОВ "НВК "Екофарм"	Україна	ТОВ "НВК "Екофарм"	Україна	UA/5510/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати! Допустимим є утворення гелеподібної структури, яка руйнується при струшуванні. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

2556	ФЛАВОВІР®	Comb drug	сироп по 30 мл, або по 50 мл, або по 60 мл у флаконах з скла або пластику; по 1 флакону разом з дозуючою ємністю у пачці з картону	ТОВ "НВК "Екофарм"	Україна	ТОВ "НВК "Екофарм"	Україна	UA/5510/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Після першого відкриття флакона зберігати його закритим в оригінальній упаковці не більше 30 діб. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2557	ФЛАМІАР СПАГ. ПЄКА	Comb drug	мазь по 35 г у тубі в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/16201/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2558	ФЛАМІДЕЗ ФІТОПЛЮС	Comb drug	мазь, по 20 г у контейнері; по 1 контейнеру в пачці; по 20 г або по 40 г у тубі; по 1 тубі у картонній пачці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Енк`юб Етікалз Прайвіт Лімітед	Індія	UA/1920/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2559	ФЛАМІН-ЗДОРОВ'Я	Helichrysum arenarium**	таблетки по 50 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці; по 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	UA/4615/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2560	ФЛЕБАВЕН® 1000	Diosmin	таблетки, по 1000 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/Нінгбо Меново Тіанканг Фармасьютикалс Ко., Лтд. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)	Словенія/ Китай	UA/16995/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2561	ФЛЕБАВЕН® 500	Diosmin	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг по 15 таблеток у блістері; по 2 або 4 блістери в картонній коробці	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії) / КРКА, д.д., Ново место (контроль серії)/Нінгбо Меново Тіанканг Фармасьютикалс Ко., Лтд. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування)	Словенія/ Китай	UA/16995/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2562	ФЛЕБОДІА 600	Diosmin	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 600 мг; по 15 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі	Франція	UA/8590/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2563	ФЛЕБОТОН	Troxerutin	капсули тверді по 300 мг по 10 капсул у блістері, по 5 блістерів у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма"	Болгарія	UA/0747/02/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи, при температурі не вище 25 °С.
2564	ФЛОГЕНЗИМ	Trypsin, combinations	таблетки, вкриті оболонкою, по 20 таблеток у блістері; по 2, по 5 або по 10 блістерів у картонній коробці; по 800 таблеток у банках	МУКОС Фарма ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	МУКОС Емульсіонсгезелль шафт мбХ	Німеччина	UA/2843/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С! Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. Не заморожувати.
2565	ФЛОНОКСИЛ	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 1,0 мг/мл по 8 мл або 10 мл, або 12 мл у поліетиленовому контейнері з насосом із розпилювачем у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20482/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2566	ФЛОНОКСИЛ	Xylometazoline	спрей назальний, дозований 1,0 мг/мл; по 10 мл у поліетиленовому контейнері з насосом із ропилювачем; по 1 контейнеру у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості)	Україна	UA/20482/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2567	ФЛОРА	Comb drug	еліксир для орального застосування, по 100 мл у флаконі; по 1 флакону у коробці; по 100 мл у пляшці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/6419/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2568	ФЛОРИСЕД-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	капсули, по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/8853/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2569	ФЛОРИСЕД-ЗДОРОВ'Я	Comb drug	сироп, по 50 мл, по 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці; по 10 мл у саше, по 20 саше у картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/8853/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2570	ФЛОРИСЕД-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ	Comb drug	капсули по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	UA/8853/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2571	ФЛОТТО	Comb drug	краплі вушні, по 15 мл розчину у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Ромфарм Компані СРЛ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, випробування контролю якості (хімічні/фізичні показники), випуск серії; вторинне пакування, випробування контролю якості (мікробіологічні показники))	Румунія	UA/15844/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат слід використати протягом 1 місяця.
2572	ФЛУ.НЕТ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	гранули для орального розчину; по 10 саше з гранулами у картонній пачці	ТОВ "ІНФАРМА Трейдінг"	Латвійська Республіка	Лабораторіос Алкала Фарма, С.Л.	Іспанія	UA/19036/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2573	ФЛУ.НЕТ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	гранули для орального розчину; по 10 саше з гранулами у картонній пачці	ТОВ "ІНФАРМА Трейдінг"	Латвійська Республіка	Лабораторіос Алкала Фарма, С.Л.	Іспанія	UA/19036/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2574	ФЛУБАН	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 10 пакетиків у картонній коробці	ВІВ ЛАЙФ ЛЛП	Індія	Вівімед Лабс Лтд	Індія	UA/20495/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2575	ФЛУБАН ФОРТЕ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 10 пакетиків у картонній коробці	ВІВ ЛАЙФ ЛЛП	Індія	Вівімед Лабс Лтд	Індія	UA/20496/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2576	ФЛУБЕР	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 20 г у саше, по 10 саше у коробці з картону	ТОВ "БЕРКАНА+"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/20980/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2577	ФЛУБЕР ФОРТЕ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 20 г у саше, по 10 саше в коробці з картону	ТОВ "БЕРКАНА+"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/20991/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2578	ФЛУБРІКС® СПРЕЙ	Flurbiprofen	спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза, по 15 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/18976/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 ° С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не зберігати в холодильнику та не заморожувати. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. Термін придатності після першого розкриття флакону – 6 місяців.
2579	ФЛУБРІКС® СПРЕЙ	Flurbiprofen	спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза, по 15 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/18976/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не зберігати в холодильнику та не заморожувати.
2580	ФЛУЗАМЕД	Fluconazole	капсули тверді 150 мг, по 1 капсулі в блістері, по 1 блістеру в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/18328/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2581	ФЛУЗАМЕД	Fluconazole	капсули тверді по 150 мг по 1 капсулі у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л.	Румунія	UA/13778/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2582	ФЛУКОНАЗОЛ	Fluconazole	капсули по 150 мг; по 1 капсулі в блістері; по 1 або по 2, або по 3, або по 4 блістери у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/9065/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2583	ФЛУКОНАЗОЛ	Fluconazole	капсули по 150 мг; по 1 капсулі в блістері; по 1 або по 2, або по 3, або по 4 блістери у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/9065/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2584	ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	Fluconazole	капсули по 150 мг по 1 капсулі у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці; по 1 капсулі у контурній чарунковій упаковці, по 2 або 3 контурні чарункові упаковки у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/1153/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2585	ФЛУКОНАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	Fluconazole	капсули тверді по 150 мг, по 1 капсулі в блістері; по 1, 2 або 3 блістери в картонній коробці; по 3 або 7 капсул у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/3938/01/03	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2586	ФЛУКОНАЗОЛ-КР	Fluconazole	капсули по 150 мг, по 1 капсулі у блістері; по 1, або 2, або 4 блістери у пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/14791/01/02	Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2587	ФЛУМІБАКТ® ІС	Dequalinium	таблетки вагінальні по 10 мг; по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/15786/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2588	ФЛУНОЛ®	Fluconazole	капсули, по 150 мг по 1 або 2 капсули у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/3784/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2589	ФЛЮДІТЕК	Carbocisteine	розчин оральний, 750 мг/10 мл; по 10 мл у саше; по 15 саше в картонній коробці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі (виробник відповідальний за випуск серії)/Юнітер Ліквід Мануфекчурінг (виробник відповідальний за "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль серії)/Юнітер Девелоппман Бордо (виробник відповідальний за контроль серії (додатковий))	Франція/ Франція/ Франція	UA/8082/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2590	ФЛЮДІТЕК	Carbocisteine	сироп 2 %; по 125 мл у флаконі; по 1 флакону з дозувальним стаканчиком в картонній упаковці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі (виробник відповідальний за контроль та випуск серії)/Юнітер Ліквід Мануфекчурінг (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії)	Франція/ Франція	UA/8082/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ℃ в недоступному для дітей місці.

2591	ФЛЮДІТЕК	Carbocisteine	сироп 2 %; по 125 мл у флаконі; по 1 флакону з дозувальним стаканчиком в картонній упаковці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі (виробник відповідальний за контроль та випуск серії)/Юнітер Ліквід Мануфекчурінг (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії)	Франція/ Франція	UA/8082/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.
2592	ФЛЮДІТЕК	Carbocisteine	сироп 5 %; по 125 мл у флаконі; по 1 флакону з дозувальним стаканчиком в картонній упаковці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі (виробник відповідальний за контроль та випуск серії)/Юнітер Ліквід Мануфекчурінг (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії)	Франція/ Франція	UA/8082/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС в недоступному для дітей місці.

2593	ФЛЮДІТЕК	Carbocisteine	сироп 5 %; по 125 мл у флаконі; по 1 флакону з дозувальним стаканчиком в картонній упаковці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі (виробник відповідальний за контроль та випуск серії)/Юнітер Ліквід Мануфекчурінг (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії)	Франція/ Франція	UA/8082/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС в недоступному для дітей місці.
2594	ФЛЮЗАК	Fluconazole	таблетки по 150 мг по 1 таблетці у блістері; по 1 або по 3 блістери в картонній коробці	Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед	Індія	ФДС Лімітед	Індія	UA/5495/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2595	ФЛЮКОЛД®-N	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу в паперовому конверті; по 10 таблеток у стрипі; по 1 стрипу у картонній коробці; по 4 таблетки у стрипі; по 3 стрипи у картонній коробці; по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу в паперовому конверті; по 50 конвертів у картонній коробці	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	UA/6266/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

2596	ФЛЮКОЛД® САШЕ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину зі смаком лимона, по 5 г порошку в саше, по 5 або по 10 саше у картонній коробці	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	UA/19169/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2597	ФЛЮКОРИК	Fluconazole	капсули по 150 мг, по 1 капсулі у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	UA/6786/01/03	Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2598	ФЛЮТ АСТЕЗИН®	Benzocaine	супозиторії по 206 мг; по 6 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20871/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2599	ФЛЮТ АСТЕЗИН®	Benzocaine	супозиторії по 206 мг; по 6 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/20871/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2600	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	Folic acid	таблетки по 1 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці з картону; по 25 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/5940/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2601	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	Folic acid	таблетки по 1 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці; по 10 таблеток у блістерах	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/6692/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2602	ФОРВЕН	Comb drug	розчин оральний, по 25 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/20353/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2603	ФОРИСТАЛ	Dimetindene	краплі оральні, розчин, 1 мг/мл; по 20 або 50 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону в картонній упаковці	Гленмарк Фармасьютикалз с.р.о.	Чеська Республіка	МІФАРМ С.П.А.	Італія	UA/21131/01/01	Зберігати у зовнішній картонній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2604	ФОРЛАКС	Macrogol	порошок для приготування розчину для перорального застосування по 10 г; по 10,167 г порошку в пакетику; по 10 або по 20 пакетів у картонній коробці	ІПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА, Акціонерне товариство спрощеного типу	Франція	БОФУР ІПСЕН ІНДУСТРІ	Франція	UA/6852/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2605	ФОРМІДРОН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 50 мл або 100 мл у флаконах скляних, укупорених пробками і кришками; по 100 мл у флаконі скляному, укупореному пробкою і кришкою; по 1 флакону в пачці; по 100 мл у флаконах полімерних з механічним розпилювачем; по 50 мл або 100 мл, або по 200 мл у флаконах полімерних в комплекті з кришками; по 50 мл або 100 мл, або по 200 мл у флаконі полімерному в комплекті з кришкою; по 1 флакону в пачці; по 200 мл у флаконах скляних, укупорених кришками; по 200 мл у флаконі скляному, укупореному кришкою; по 1 флакону в пачці; по 200 мл у флаконах полімерних, укупорених насадками та кришками; по 200	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0597/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2606	ФОРМІДРОН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 50 мл у флаконах, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8411/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2607	ФОРМІДРОН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 50 мл у флакони скляні, укупорені пробками і кришками; по 50 мл у флакони полімерні в комплекті з кришками в пачці або без пачки; по 100 мл у флакони скляні, укупорені пробками і кришками або у флакони полімерні в комплекті з кришками в пачці або без пачки; по 100 мл у флакони полімерні з механічним розпилювачем	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/0597/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2608	ФОРМІДРОН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 50 мл у флаконах полімерних або скляних	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/8184/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2609	ФОРТАКЕЛЬ D5	Mono	краплі для перорального та місцевого застосування; по 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в картонній пачці	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/11529/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після першого відкриття препарат придатний протягом 2 місяців.

2610	ФОРТАЛОР	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл по 30 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20981/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2611	ФОРТАЛОР	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20981/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2612	ФОРТАЛОР	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл; по 30 мл або 35 мл у поліетиленовому контейнері з кришкою та ковпачком в комплекті з пристроєм для розпилювання у пачці з картону	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"	Україна	UA/20981/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2613	ФОРТЕЗА	Benzydamine	льодяники по 3 мг зі смаком апельсина та меду; по 12 льодяників у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	ІНФАРМАДЕ, С.Л. (контроль якості, випуск серії)/ЛАБОРАТОРІО ЕЧЕВАРНЕ, С.А. (контроль якості)/ЛОЗІС ФАРМАЦЕУТІКА ЛЗ С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/П'ЄР ФАБР МЕДИКАМЕНТ ПРОДАКШН (виробництво, первинне та вторинне пакування) /ДР. МЕД. АУФДЕРМОР АГ (виробництво, первинне та вторинне пакування)/КІМОС, С.Л. (контроль якості)	Іспанія/ Іспанія/ Іспанія/ Франція/ Швейцарія/Іспанія	UA/19282/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2614	ФОРТЕЗА	Benzydamine	льодяники по 3 мг зі смаком лимона; по 12 льодяників у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	ІНФАРМАДЕ, С.Л. (контроль якості, випуск серії)/ЛАБОРАТОРІО ЕЧЕВАРНЕ, С.А. (контроль якості)/ЛОЗІС ФАРМАЦЕУТІКА ЛЗ С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/П'ЄР ФАБР МЕДИКАМЕНТ ПРОДАКШН (виробництво, первинне та вторинне пакування) /ДР. МЕД. АУФДЕРМОР АГ (виробництво, первинне та вторинне пакування)/КІМОС, С.Л. (контроль якості)	Іспанія/ Іспанія/ Іспанія/ Франція/ Швейцарія/Іспанія	UA/19283/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2615	ФОРТЕЗА	Benzydamine	розчин для ротової порожнини 0,15 %, по 60 мл або 120 мл розчину у скляному флаконі; по 1 флакону разом з мірним ковпачком у картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	АБДІ ІБРАХІМ Ілач Санаї ве Тіджарет А.Ш.	Туреччина	UA/13797/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

2616	ФОРТЕЗА	Benzydamine	розчин для ротової порожнини 0,15 %; по 60 мл або 120 мл розчину у скляному флаконі; по 1 флакону разом з мірним ковпачком у картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	АБДІ ІБРАХІМ Ілач Санаї ве Тіджарет А.Ш.	Туреччина	UA/13797/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
2617	ФОРТЕЗА	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 0,15 % по 15 мл або 30 мл розчину у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	АБДІ ІБРАХІМ Ілач Санаї ве Тіджарет А.Ш.	Туреччина	UA/13797/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2618	ФОРТЕЗА	Benzydamine	спрей для ротової порожнини 0,15 % по 15 мл або 30 мл розчину у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	АБДІ ІБРАХІМ Ілач Санаї ве Тіджарет А.Ш.	Туреччина	UA/13797/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2619	ФОСФАЛЮГЕЛЬ	Aluminium phosphate	гель оральний (12,38 г 20 % гелю/пакет); по 20 г гелю у пакеті; по 20 пакетів у картонній пачці	ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"	Україна	Фарматіс	Франція	UA/4381/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2620	ФРИНОЛ	Comb drug	краплі оральні; по 50 мл у флаконі по 1 флакону в пачці	ТОВ "ПОЛІМЕТРІЯ, дистрибуція та послуги"	Словенія	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/19074/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності після розкриття упаковки — 6 місяців.
2621	ФРІБРІС	Desloratadine	сироп, 2,5 мг/5 мл по 100 мл у флаконі, по 1 флакону з мірною ложечкою в картонній коробці	Мілі Хелскере Лімітед	Велика Британія	Гракуре Фармасьютікалс ЛТД	Індія	UA/6853/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці.

2622	ФРІФЛО КЛІЗМА	Comb drug	розчин ректальний, 21,4 г/9,4 г в 118 мл, по 133 мл у флаконі з індукційною мембраною, наконечником та ковпачком; по 1 флакону у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/17753/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2623	ФРІФЛО КЛІЗМА	Comb drug	розчин ректальний, 21,4 г/9,4 г в 118 мл, по 133 мл у флаконі з індукційною мембраною, наконечником та ковпачком; по 1 флакону у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/17753/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2624	ФРІФЛО КЛІЗМА	Comb drug	розчин ректальний, 21,4 г/9,4 г в 118 мл, по 133 мл у флаконі з індукційною мембраною, наконечником та ковпачком; по 1 флакону у картонній упаковці	ТОВ "КУСУМ"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/17753/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2625	ФТАЛАЗОЛ	Phthalylsulfathiazole	таблетки по 0,5 г, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 10 блістерів в пачці з картону	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/7925/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2626	ФТАЛАЗОЛ	Phthalylsulfathiazole	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/2310/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2627	ФТАЛАЗОЛ	Phthalylsulfathiazole	таблетки по 500 мг; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 5 або 10 блістерів у пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5442/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2628	ФТАЛАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	Phthalylsulfathiazole	таблетки по 500 мг; по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/6133/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2629	ФТАЛАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я	Phthalylsulfathiazole	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 10 блістерів у картонній коробці; по 10 таблеток у блістерах	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/4692/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2630	ФУКОРЦИН	Comb drug	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 25 мл у флаконах	ПП "Кілафф"	Україна	ПП "Кілафф"	Україна	UA/15715/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

2631	ФУКОРЦИН	Comb drug	розчин нашкірний по 25 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ПП "Кілафф" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/0182/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2632	ФУКОРЦИН	Comb drug	розчин нашкірний по 25 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ПП "Кілафф" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/0182/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2633	ФУКОРЦИН	Comb drug	розчин нашкірний по 25 мл у флаконах	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ПП "Кілафф" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна	UA/0182/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2634	ФУКОРЦИН	Comb drug	розчин нашкірний по 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/0588/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2635	ФУМАРТА®	Comb drug	капсули, по 10 капсул у блістері; по 2 або 3 блістери у пачці	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/17593/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

2636	ФУНГОСЕПТ®	Amorolfine	лак для нігтів лікувальний, 5 %; по 2,5 мл лаку у флаконі, по 1 флакону у комплекті з 10 шпателями для нанесення у картонній коробці	Ядран-Галенський Лабораторій д.д.	Хорватія	Фармаклар (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Ядран-Галенський Лабораторій д.д. (випуск серії)	Франція/ Хорватія	UA/20735/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після першого розкриття флакона застосовувати протягом 6 місяців.
2637	ФУРАСОЛ	Furazidin	обполіскувач, порошок 0,1 г/пакетик; по 1 г препарату у пакетику; по 5 або 15 пакетиків у пачці з картону	АТ "Олфа"	Латвія	АТ "Олфа"	Латвія	UA/1627/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2638	ФУРАЦИЛІН	Nitrofural	краплі вушні, розчин 0,066 %; по 20 мл у флаконах; по 20 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці ; по 20 мл у флаконах, укупорених пробкою та кришкою або пробкою-крапельницею та кришкою; по 20 мл у флаконі укупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону у пачці; по 20 мл у флаконах полімерних, укупорених пробкою-крапельницею та кришкою; по 20 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою; по 1 флакону у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/8351/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2639	ФУРАЦИЛІН-ТЕРНОФАРМ	Nitrofural	порошок для приготування розчину для зовнішнього застосування по 20 мг; по 0,94 г порошку в саше; по 30 саше у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/17847/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2640	ФУРАЦИЛІН®	Nitrofural	порошок для розчину для зовнішнього застосування по 40 мг, по 2 г порошку у саше; по 10 або 20 саше у картонній коробці	ТОВ "Исток-Плюс"	Україна	ТОВ "Исток-Плюс" (повний цикл виробництва)/ПАТ "Київмедпрепарат" (контроль якості лікарського засобу, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/17334/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2641	ФУРАЦИЛІН®	Nitrofural	таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування по 20 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна/ Україна	UA/5187/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2642	ФУЦИС®	Fluconazole	гель, 5 мг/г; по 30 г гелю у тубі; по 1 тубі у картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД	Індія	UA/7617/03/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2643	ФУЦИС®	Fluconazole	таблетки по 150 мг; по 1 або по 2, або по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці	ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"	Україна	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції in bulk)/ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції in bulk)	Індія/ Україна	UA/7617/01/03	Зберігати при температурі не вище 25 °С Зберігати у недоступному для дітей місці.
2644	ХАБІФАК СПАГ. ПЄКА	Comb drug	краплі оральні, по 30 мл, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/13598/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2645	ХВОЩА ПОЛЬОВОГО ТРАВА	Equisetum arvense**	трава по 50 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/9374/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.
2646	ХВОЩА ПОЛЬОВОГО ТРАВА	Equisetum arvense**	трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2270/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

2647	ХЕВЕРТ ПУЛЬМО	Comb drug	таблетки по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній коробці	Хеверт Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Хеверт Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/12771/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2648	ХЕВЕРТ® СИНУСІТІС	Comb drug	таблетки по 10 таблеток у блістері; 4 блістери в картонній коробці	Хеверт Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Хеверт Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/13239/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2649	ХЕДЕНЗА	Comb drug	мазь ректальна, по 20 г у тубі, по 1 тубі разом з аплікатором у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КГаА (виробник нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)	Німеччина	UA/18330/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття туби – 6 місяців.
2650	ХЕДЕНЗА	Comb drug	супозиторії ректальні, по 5 супозиторіїв у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	АМКАФАРМ Фармасьютікал ГмбХ (виробник відповідальний за виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування)/Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КГаА (виробник відповідальний за контроль якості, випуск серії)	Німеччина / Німеччина	UA/18373/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2651	ХЕДЕРАЛ® ПЛЮЩ	Hederae helicis folium	сироп по 115 мл або по 200 мл у флаконі, по 1 флакону з мірним стаканчиком у картонній коробці	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/16495/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

2652	ХЕЛІСКАН®	Comb drug	настойка, по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону; по 100 мл у банці; по 1 банці у пачці з картону	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	UA/9499/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду, який не впливає на ефективність препарату. Перед застосуванням збовтувати.
2653	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки: по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 10 пачок у груповій картонній упаковці; по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 20 пачок у груповій картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 10 пачок у груповій картонній упаковці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Сава Хелскеа Лтд/Медітоп Фармасьютікал Лтд.	Індія/ Угорщина	UA/9824/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

2654	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД DX	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 10 пачок у груповій картонній упаковці; по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 20 пачок у груповій картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 10 пачок у груповій картонній упаковці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Сава Хелскеа Лтд/Медітоп Фармасьютікал Лтд.	Індія/ Угорщина	UA/9825/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2655	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з лимонним смаком; по 4 г порошку в саше; по 10 саше в картонній коробці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Алпекс Фарма СА (виробництво за повним циклом)/Ламп Сан Просперо СПА (первинне та вторинне пакування)	Швейцарія/Італія	UA/15354/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

2656	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з малиновим смаком; по 4 г порошку в саше; по 10 саше в картонній коробці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Алпекс Фарма СА (виробництво за повним циклом)/Ламп Сан Просперо СПА (первинне та вторинне пакування)	Швейцарія/Італія	UA/15355/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2657	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО ДЛЯ ДІТЕЙ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з малиновим смаком, по 2,5 г порошку в саше; по 6 саше у картонній пачці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Алпекс Фарма СА (виробництво за повним циклом)/Ламп Сан Просперо СПА (первинне та вторинне пакування)	Швейцарія/Італія	UA/17806/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2658	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО ІМБИР	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину; по 4 г порошку в саше; по 10 саше у картонній пачці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Алпекс Фарма СА (виробництво за повним циклом)/Ламп Сан Просперо СПА (первинне та вторинне пакування)	Швейцарія/Італія	UA/17630/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2659	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО ІМБИР БЕЗ ЦУКРУ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину по 2,5 г порошку в саше, по 10 саше у картонній пачці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Алпекс Фарма СА	Швейцарія	UA/17631/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2660	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО МАКС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з лимонним смаком, по 4 г порошку в саше; по 10 саше у картонній пачці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Алпекс Фарма СА (повний цикл виробнитцва)/Ламп Сан Просперо СПА (первинне та вторинне пакування)	Швейцарія/Італія	UA/16014/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

2661	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО МАКС	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину з малиновим смаком, по 4 г порошку в саше; по 10 саше у картонній пачці	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Алпекс Фарма СА (повний цикл виробнитцва)/Ламп Сан Просперо СПА (первинне та вторинне пакування)	Швейцарія/Італія	UA/16015/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2662	ХЕЛПЕКС® ЕФЕКТ	Comb drug	мазь по 20 г або 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Мові Хелс"	Україна	Сава Хелскеа Лтд	Індія	UA/11390/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2663	ХЕЛПЕКС® ЛАР	Comb drug	обполіскувач для горла, розчин; по 200 мл розчину у пляшці; по 1 пляшці з мірним стаканчиком у картонній коробці	Мові Хелс ГмбХ	Швейцарія	Дева Холдинг А.С.	Туреччина	UA/18887/02/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2664	ХЕЛПЕКС® ЛАР	Comb drug	обполіскувач для горла, розчин; по 200 мл розчину у пляшці; по 1 пляшці з мірним стаканчиком у картонній коробці	Мові Хелс ГмбХ	Швейцарія	Дева Холдинг А.С.	Туреччина	UA/18887/02/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2665	ХЕЛПЕКС® ЛАР	Comb drug	спрей для ротової порожнини, розчин, по 30 мл розчину у флаконі з розпилювачем у картонній коробці	Мові Хелс ГмбХ	Швейцарія	Дева Холдинг А.С. (повний цикл виробництва; вторинне пакування)	Туреччина	UA/18887/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
2666	ХЕЛПЕКС® ЛАР	Comb drug	спрей для ротової порожнини, розчин; 30 мл розчину у флаконі з розпилювачем у картонній коробці	Мові Хелс ГмбХ	Швейцарія	Дева Холдинг А.С. (повний цикл виробництва; вторинне пакування)	Туреччина	UA/18887/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

2667	ХЕПЕЛЬ	Comb drug	таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому; по 1 контейнеру в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/7887/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
2668	ХЕПІДЕРМ-ЗДОРОВ'Я	Dexpanthenol	крем для зовнішнього застосування 5 %, по 15 г, по 30 г або по 100 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/11691/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2669	ХЕПІДЕРМ-ЗДОРОВ'Я АЕРОЗОЛЬ	Dexpanthenol	піна нашкірна, 50 мг/г; по 58,5 г або по 117,0 г у балоні; по 1 балону в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/11691/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2670	ХЕПІДЕРМ ПЛЮС	Comb drug	крем по 20 г, по 40 г або по 100 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/13321/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2671	ХЕПІДЕРМ ФОРТЕ АЕРОЗОЛЬ	Comb drug	піна нашкірна, по 58,5 г або по 117,0 г у балоні; по 1 балону в картонній коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	UA/11691/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2672	ХЕПІЛОР®	Comb drug	розчин для ротової порожнини; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/10910/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2673	ХЕПІЛОР®	Comb drug	спрей для ротової порожнини по 20 мл або по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/10910/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2674	ХЄСУП СПАГ. ПЄКА	Comb drug	супозиторії ректальні по 5 супозиторіїв у стрипі по 2 стрипи у картонній упаковці	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ	Німеччина	UA/15360/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2675	ХІЛО-КЕА®	Artificial tears and other indifferent preparations	краплі очні; по 10 мл у багатодозовому контейнері з повітронепроникним насосом та ковпачком; по 1 контейнеру в картонній коробці	УРСАФАРМ Арцнаймітель ГмбХ	Німеччина	УРСАФАРМ Арцнаймітель ГмбХ	Німеччина	UA/9732/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат можна застосовувати протягом 6 місяців після першого відкриття контейнера.
2676	ХІЛО-КОМОД®	Hyaluronic acid	краплі очні, 1 мг/мл; по 10 мл у багатодозовому контейнері, оснащеному повітронепроникним насосом та закритому ковпачком; по 1 контейнеру в картонній коробці	УРСАФАРМ Арцнаймітель ГмбХ	Німеччина	УРСАФАРМ Арцнаймітель ГмбХ	Німеччина	UA/7443/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Препарат можна застосовувати протягом 6 місяців після першого відкриття контейнера.

2677	ХІЛО-КОМОД® ФОРТЕ	Hyaluronic acid	краплі очні, 2 мг/мл; по 10 мл у багатодозовому контейнері, оснащеному повітронепроникним насосом та закритому ковпачком; по 1 контейнеру в картонній коробці	УРСАФАРМ Арцнаймітель ГмбХ	Німеччина	УРСАФАРМ Арцнаймітель ГмбХ	Німеччина	UA/7443/01/02	Зберігати при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Препарат не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Препарат можна застосовувати протягом 6 місяців після першого відкриття контейнера.
2678	ХІТОЗАН-ГЕНТА	Gentamicin	гель 0,1 % по 5 г у пакетах; по 15 г, 30 г, 100 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ТОВ "ЄВРАЗІЯ"	Україна	ТОВ "ЄВРАЗІЯ"	Україна	UA/7305/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2679	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	песарії по 16 мг, по 5 песаріїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/17204/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2680	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл у флаконі полімерному, по 1 флакону в пачці, по 100 або по 200 мл у флаконі полімерному	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/14616/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2681	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 50 мл, 100 мл, 200 мл у флаконах	ТОВ "Славія 2000"	Україна	ТОВ "Славія 2000"	Україна	UA/13263/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2682	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	розчин для зовнішнього застосування 0,05 %, по 100 мл у флаконах полімерних з уретральною насадкою, по 1 л у флаконах полімерних, по 5 л у каністрах полімерних	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	ТОВ "МЕДЛЕВ"	Україна	UA/18075/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2683	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	розчин для зовнішнього застосування 0,05 %, по 100 мл, 200 мл у флаконах	ТОВ "Фарма Черкас"	Україна	ТОВ "Фарма Черкас"	Україна	UA/16324/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2684	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	розчин для зовнішнього застосування 0,05 %; по 100 мл у флаконі полімерному в пачці або без пачки; по 200 мл або по 500 мл, або по 1000 мл у флаконах полімерних	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/14616/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2685	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	розчин для зовнішнього застосування 0,05 %; по 100 мл, 200 мл у флаконах, по 1 л у флаконах або каністрах	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/14746/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці.

2686	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	розчин для зовнішнього застосування 0,05% по 100 мл у флаконах з кришкою-крапельницею і кришкою; по 200 мл у флаконах з кришкою	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/18239/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2687	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	розчин для зовнішнього застосування, 0,05 % по 100 мл або 200 мл у полімерних флаконах з насадкою для спрямованого введення лікарського засобу	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ТОВ "Фарма Черкас" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)/ПП "Кілафф" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна/ Україна	UA/18022/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2688	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	розчин для зовнішнього застосування, 0,05 % по 100 мл або 200 мл у полімерних флаконах з насадкою для спрямованого введення лікарського засобу	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/ТОВ "Фарма Черкас" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)/ПП "Кілафф" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості)	Україна/ Україна/ Україна	UA/18022/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2689	ХЛОРГЕКСИДИН	Chlorhexidine	розчин нашкірний, 0,05 % по 100 мл або 200 мл у банках скляних або флаконах полімерних	ТОВ "ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН"	Україна	ПП "Кілафф"	Україна	UA/5492/01/01	Зберігати в захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

2690	ХЛОРГЕКСИДИН-ЗДОРОВ'Я	Chlorhexidine	розчин 0,5 мг/мл по 50 мл або по 100 мл у флаконах полімерних	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/10769/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2691	ХЛОРГЕКСИДИН-КР	Chlorhexidine	розчин для зовнішнього застосування 0,05 %, по 100 мл у контейнері з насадкою для спрямованого введення; по 1 контейнеру у пачці з картону; по 100 мл у контейнері з насадкою для спрямованого введення; по 100 мл у контейнері з насадкою для спрямованого введення лікарського засобу у комплекті з вагінальним аплікатором зі зрошувальною пляшечкою об’ємом 100 мл та пилозахисним ковпачком, у пачці з картону; по 200 мл у флаконі з насадкою; по 1 флакону в пачці з картону; по 200 мл у флаконі з насадкою	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/9766/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2692	ХЛОРГЕКСИДИН-ФАРМЕКС	Chlorhexidine	песарії по 16 мг; по 5 песаріїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я"	Україна	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна	UA/17610/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2693	ХЛОРОФІЛІПТ	Chlorophyllipt *	розчин в олії, 20 мг/мл; по 20 мл у флаконі; по 1 флакону в коробці	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії; всі стадії виробництва, окрім контролю якості та випуску серії)	Україна/ Україна	UA/1556/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2694	ХЛОРОФІЛІПТ	Chlorophyllipt*	спрей; по 15 мл у контейнері зі скла або пластмаси, по 1 контейнеру у пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/1556/03/01	При температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Захищати від впливу прямих сонячних променів. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2695	ХЛОРОФІЛІПТ	Chlorophyllipt*	таблетки по 12,5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону; по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/1556/01/02	При температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2696	ХЛОРОФІЛІПТ	Chlorophyllipt *	таблетки по 25 мг; по 40 таблеток у контейнерах пластмасових; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону; по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)	Україна/ Україна	UA/1556/01/01	При температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2697	ХЛОРОФІЛІПТ® АРТЕРІУМ	Chlorophyllipt *	розчин олійний, 20 мг/мл, по 25 мл або 30 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці	ПАТ "Галичфарм"	Україна	ПАТ "Галичфарм"	Україна	UA/4551/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2698	ХОЛЕ-ГРАН	Comb drug	гранули; по 10 г гранул у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону; або по 10 г гранул у флаконі з кришкою, по 1 флакону в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"	Україна	UA/8456/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25оС.

2699	ХОЛЕДІУС	Comb drug	розчин оральний, по 25 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці з картону	ТОВ "Українська фармацевтична компанія"	Україна	ПрАТ "Біолік"	Україна	UA/9107/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2700	ХОЛЕЛЕСАН®	Comb drug	капсули; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	ПАТ "Київмедпрепарат"	Україна	UA/15899/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2701	ХОЛІСАЛ	Comb drug	гель для ротової порожнини, по 10 г гелю у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	ТОВ "БАУШ ХЕЛС"	Україна	Фармзавод Єльфа А.Т.	Польща	UA/7298/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2702	ХОЛОСАС	Rosa**	сироп, по 130 г у банках полімерних; по 130 г у банці полімерній; по 1 банці у пачці з картону; по 130 г у банці полімерній; по 1 банці з мірною ложкою у пачці з картону; по 130 г у флаконах полімерних; по 250 г у флаконах полімерних; по 130 г у флаконі полімерному; по 1 флакону у пачці з картону; по 250 г у флаконі полімерному; по 1 флакону у пачці з картону; по 130 г у флаконі полімерному; по 1 флакону з мірною ложкою у пачці з картону; по 250 г у флаконі полімерному; по 1 флакону з мірною ложкою у пачці з картону	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	АТ "ВІТАМІНИ"	Україна	UA/0584/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2703	ХОЛОСАС - ТЕРНОФАРМ	Rosa**	сироп по 130 г або по 250 г у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/15909/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2704	ХОМВІОКОРИН	Comb drug	таблетки, по 25 таблеток у блістері, по 4 блістери в коробці	Хомвіора Арцнаймиттель Др. Хагедорн ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	Мауерманн – Арцнаймиттель КГ	Німеччина	UA/20937/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2705	ХОМВІОТЕНЗИН®	Comb drug	таблетки по 25 таблеток у блістері, по 4 блістери в коробці	Хомвіора Арцнаймиттель Др. Хагедорн ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	Мауерманн – Арцнаймиттель КГ	Німеччина	UA/7743/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
2706	ХОНДРА-СИЛА®	Comb drug	капсули; по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/7515/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2707	ХОНДРА-СИЛА®	Chondroitin sulfate	мазь 5 % по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/6033/01/01	Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2708	ХОНДРА-СИЛА® ЗІГРІВАЮЧА	Comb drug	мазь по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/14163/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2709	ХОНДРОІТИН®-ФІТОФАРМ	Chondroitin sulfate	емульгель для зовнішнього застосування, 5 %; по 25 г або 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/17346/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2710	ХОНДРОІТИН® КОМПЛЕКС	Comb drug	капсули; по 30 або 60 капсул у контейнері, по 1 контейнеру в пачці або по 6 капсул у блістері, по 5 або 10 блістерів у пачці	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ" (виробник відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль та випуск серії; виробник, відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії)/АТ "Лубнифарм" (виробник, відповідальний за виробництво, первинне, вторинне пакування, контроль якості)	Україна/ Україна	UA/17345/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2711	ХОНДРОЇТИНОВА МАЗЬ	Chondroitin sulfate	мазь 5 %; по 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/6983/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2712	ХОНДРОФЛЕКС	Chondroitin sulfate	мазь, 50 мг/г; по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/10741/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

2713	ХОФІТОЛ	Cynara scolymus**	розчин оральний по 120 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	Лабораторії Майолі Спіндлер	Франція	Лабораторії Майолі Спіндлер (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості, відповідальний за випуск серії)	Франція	UA/8704/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
2714	ХОФІТОЛ	Cynara scolymus**	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг, по 30 таблеток у блістері; по 2 або 6 блістерів у картонній коробці	Лабораторії Майолі Спіндлер	Франція	Лабораторії Галенік Вернін (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості, відповідальний за випуск серії)	Франція	UA/8704/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
2715	ЦЕЛІСТА®	Myramistin*	розчин для ротової порожнини, 0,1 мг/мл; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/16403/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2716	ЦЕЛІСТА®	Myramistin*	спрей для ротової порожнини, 0,1 мг/мл; по 50 мл у флаконі; по 1 флакону з насадкою-розпилювачем у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма"Дарниця"	Україна	UA/16494/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2717	ЦЕЛІСТА® ДУО	Comb drug	таблетки для розсмоктування, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 4 блістери в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/19330/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2718	ЦЕЛЬ Т	Comb drug	мазь по 50 г у тубі; по 1 тубі в коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/0020/03/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.
2719	ЦЕЛЬ Т	Comb drug	таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому, по 1 контейнеру у коробці з картону	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ	Німеччина	UA/0020/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.
2720	ЦЕТИРИЗИН	Cetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 або 3 блістери в пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/20745/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2721	ЦЕТИРИЗИН-АСТРАФАРМ	Cetirizine	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/7700/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2722	ЦЕТИРИЗИН-АСТРАФАРМ	Cetirizine	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/7700/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2723	ЦЕТЛО®	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери у картонній пачці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/16177/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2724	ЦЕТЛО® ПЛЮС	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці	ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І)	ОАЕ	Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед	Індія	UA/15638/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці
2725	ЦЕТРИЛЕВ НЕО	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картоній коробці; по 10 картонних коробок у картонній коробці	Гетеро Лабз Лімітед	Індія	Гетеро Лабз Лімітед	Індія	UA/15063/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2726	ЦЕФАНЕЙРО	Comb drug	таблетки; по 20 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери у картонній коробці	Цефак КГ	Німеччина	Цефак КГ	Німеччина	UA/14251/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2727	ЦИКЛОДИНОН®	Agni casti fructus	краплі оральні по 50 мл або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	Біонорика СЕ	Німеччина	Біонорика СЕ	Німеччина	UA/0267/01/01	Зберігати для захисту від світла в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Після першого відкриття флакона препарат придатний до застосування протягом 6 місяців. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.
2728	ЦИКЛОЖЕН	Ciclopirox	лак для нігтів лікувальний 80 мг/г по 3 г лаку у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці	ПРОФАРМА Інтернешнл Трейдинг Лімітед	Мальта	СЕРРА ПАМІЕС, С.А.	Іспанія	UA/17436/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в захищеному від світла місці. Зберігати у вертикальному положенні. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2729	ЦИКОТИН®ІС	Cytisinicline	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1,5 мг; по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"	Україна	UA/20300/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2730	ЦИНАБСИН	Comb drug	таблетки; по 20 таблеток у блістері; по 3 або по 5 блістерів у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ (Виробник, відповідальний за кінцевий продукт, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серій)	Німеччина	UA/6790/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
2731	ЦИНКОВА МАЗЬ	Zinc oxide*	мазь 10 % по 20 г у тубах	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/0406/01/01	Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2732	ЦИНКОВА МАЗЬ	Zinc oxide*	мазь 10 % по 25 г у контейнерах; по 20 г або по 30 г у тубах; по 20 г або по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону; по 20 г або по 30 г у тубах ламінатних; по 20 г або по 30 г у тубі ламінатній; по 1 тубі в пачці з картону	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/6626/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2733	ЦИНКУ МАЗЬ	Zinc oxide*	мазь 10%, по 25 г або по 40 г у банках зі скла; по 25 г або по 40 г у банці зі скла; по 1 банці в пачці з картону; по 25 г у тубах; по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5724/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2734	ЦИСТИНОЛ АКУТ	Arctostaphyos uva-ursi**	таблетки, вкриті оболонкою, по 15 таблеток у блістері; по 2 блістера у картонній коробці, по 20 таблеток у блістері, по 2 або 3, або 5 блістерів у картонній коробці	Шапер & Брюммер ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Шапер & Брюммер ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	UA/12007/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2735	ЦИСТО-АУРИН®	Solidago virgaurea**	таблетки по 300 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 6 блістерів у картонній коробці	Еспарма ГмбХ	Німеччина	Фарма Вернігероде ГмбХ (контроль якості)/еспарма Фарма Сервісез ГмбХ (вторинне пакування)/Адванс Фарма ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)	Німеччина / Німеччина / Німеччина	UA/13325/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.
2736	ЦИТЕАЛ	Chlorhexidine, combinations	розчин для зовнішнього застосування по 250 мл у флаконах поліетиленових	П'єр Фабр Медикамент	Франція	П'єр Фабр Медикамент Продакшн	Франція	UA/6404/01/01	Зберігати у недоступному для дітей і захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
2737	ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 6 або по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках; по 6 або по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці; по 10 таблеток в контурній чарунковій упаковці, по 6 або по 12 контурних чарункових упаковок в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/6550/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

2738	ЦИТРАМОН-М	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки: по 6 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері; по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 10 блістерів в пачці	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА"	Україна	UA/8592/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2739	ЦИТРАМОН-Ф	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки; по 6 або по 10 таблеток у блістерах; по 6 таблеток у блістері; по 20 блістерів в пачці	ТОВ "ФАРМІС ЛТД"	Україна	ПРАТ "ФІТОФАРМ"	Україна	UA/2317/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2740	ЦИТРАМОН-ФОРТЕ	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/12823/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місцію.
2741	ЦИТРАМОН В	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки по 6 або 10 таблеток у стрипах; по 6 або 10 таблеток у блістерах; по 6 таблеток у стрипі; по 2 або 10 стрипів у пачці з картону; по 10 таблеток у стрипі; по 2 або 10 стрипів у пачці з картону; по 6 таблеток у блістері; по 2, по 5 або по 10 блістерів у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 2 або 10 блістерів у пачці з картону	ПАТ "Монфарм"	Україна	ПАТ "Монфарм"	Україна	UA/7359/01/01	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

2742	ЦИТРАМОН ЕКСТРА	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/3984/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2743	ЦИТРАМОН МАКСІ®	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1, по 2 або по 5 контурних чарункових упаковок у пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/17370/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2744	ЦИТРАМОН У	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки по 6 таблеток у блістерах; по 6 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 10 блістерів у пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/5535/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2745	ЦИТРІК®	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	порошок для орального розчину, по 13,60 г в саше; по 10 саше в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/15885/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
2746	ЦИТРОПАК® - ДАРНИЦЯ	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 6 або по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці; по 6 або по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	UA/3002/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2747	ЦМИНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ	Helichrysum arenarium**	квітки по 20 г, 40 г, 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2478/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготований відвар зберігати у прохолодному місці не більше 2-х діб.
2748	ЦМИНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ	Helichrysum arenarium**	квітки по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/14435/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений відвар зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2749	ШАВЛІЇ ЛИСТЯ	Salvia officinalis**	листя по 40 г або по 50 г в пачках з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/8566/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2750	ШАВЛІЇ ЛИСТЯ	Salvia officinalis**	листя по 50 г або по 60 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,0 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,0 г у фільтр-пакеті по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	ПрАТ "Ліктрави"	Україна	UA/5809/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2751	ШАВЛІЇ ЛИСТЯ	Salvia officinalis**	листя по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8897/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.

2752	ШАВЛІЇ ЛИСТЯ	Salvia officinalis**	листя, по 40 г або по 50 г, або по 60 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2356/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.
2753	ШАВЛІЇ НАСТОЙКА	Salvia officinalis**	настойка по 40 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 40 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/6793/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
2754	ШАВЛІЇ НАСТОЙКА	Salvia officinalis**	настойка, по 25 мл або 40 мл у флаконах	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/19780/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
2755	ШИПШИНИ ОЛІЯ	Rosa**	олія по 50 мл або 100 мл у флаконах; по 50 мл або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	UA/5662/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2756	ШИПШИНИ ПЛОДИ	Rosa**	плоди по 100 г або по 130 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 3 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	UA/2271/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С; приготовлений відвар – у прохолодному місці, не більше 2 діб.
2757	ШИПШИНИ ПЛОДИ	Rosa**	плоди по 100 г, 150 г у пачках з внутрішнім пакетом	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/9376/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

2758	ШИПШИНИ ПЛОДИ	Rosa**	плоди, по 130 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/14079/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 до 15 °С не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2759	ШЛУНКОВИЙ ЗБІР	Comb drug	збір по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 25 фільтр-пакетів у пачці; по 50 г у пакетах; по 50 г у пакетах з плівки в пачці	АТ "Лубнифарм"	Україна	АТ "Лубнифарм"	Україна	UA/12584/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
2760	ШЛУНКОВІ КРАПЛІ	Comb drug	краплі оральні по 25 мл у скляному флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону; по 25 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону в пачці з картону; по 25 мл у скляних флаконах-крапельницях; по 25 мл у флаконах полімерних	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8740/01/01	ЗЗберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2761	ЮНІВІТ	Multivitamins and other minerals, incl. combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Україна	UA/5450/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

2762	ЮНІЕНЗИМ® 3 МПС	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, № 100: по 10 таблеток у стрипі; по 2 стрипи у картонній коробці; по 5 коробок в упаковці; № 2: по 2 таблетки у стрипі; по 1 стрипу у картонній коробці; № 20: по 10 таблеток у стрипі; по 2 стрипи у картонній коробці	Юнікем Лабораторіз Лімітед	Індія	Юнікем Лабораторіз Лімітед	Індія	UA/5663/01/01	Зберігати в сухому, темному і недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 оС.