

Інформаційна картка для жінок щодо застосування лікарських засобів (ЛЗ) ВІБІН та ВІБІН МІНІ

РИЗИК УТВОРЕННЯ ТРОМБІВ НА ФОНІ ПРИЙОМУ КОМБІНОВАНИХ ГОРМОНАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ

Всі комбіновані гормональні контрацептиви (КГК) підвищують рідкісний, але серйозний ризик утворення тромбів, що в виключних випадках може призвести до летального наслідку. Тому дуже важливо, щоб Ви були обізнані, в яких випадках підвищується ризик утворення тромбу, на які ознаки та симптоми Вам необхідно звернути увагу і яких заходів вжити.

В яких випадках ризик утворення тромбів може бути вищим?

- протягом першого року застосування КГК (в тому числі, якщо Ви поновлюєте їх використання після перерви тривалістю 4 тижні або довше)
- у Вас надлишкова маса тіла
- Ваш вік старше 35 років
- у Вашого близького родича (наприклад, матері/батька чи брата/сестри) виник тромб у відносно молодому віці (наприклад, у віці до 50 років)
- якщо Ви народили дитину протягом останніх декількох тижнів

Якщо Ви курите і Ваш вік старше 35 років, Вам наполегливо рекомендується кинути курити або користуватися негормональними засобами контрацепції.

Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо у Вас виник будь-який з нижченаведених симптомів:

- Сильний біль або набряк у ногах, що може супроводжуватися підвищеною чутливістю, відчуттям тепла або змінами кольору шкіри, наприклад, блідістю, почервонінням або посинінням. Ці симптоми можуть бути характерними для **тромбозу глибоких вен**.
- Раптова незрозуміла задишка або пришвидшення дихання; сильний біль у грудній клітці, який може посилюватися при глибокому диханні; раптовий кашель без очевидної причини (в тому числі кашель з кров'ю). Ці симптоми можуть бути характерними для тяжкого ускладнення тромбозу глибоких вен, яке називається **легеневою емболією**. Це явище виникає, коли тромб з током крові потрапляє з кінцівки до легень.
- Біль у грудній клітці, часто гострий, але іноді може виникати лише відчуття дискомфорту, тиску, важкості, дискомфорту у верхній частині тіла, що іррадіює у спину, щелепу, горло, руку; відчуття переповнення шлунку, підвищене потовиділення, нудота, блювання або запаморочення. Ці симптоми можуть бути характерними для **інфаркту**.

- Онiмiннiя або слабкiсть м'язiв обличчя, руки або ноги, особливо з одного боку тiла; проблеми з мовою (раптова неспроможнiсть говорити i розумiти мову), сплутана свiдомiсть; раптова втрата чи розмитiсть зору; сильний головний бiль, бiльш iнтенсивний, нiж зазвичай або мiгрень. Цi симптоми можуть бути характерними для **iнсульту**.

Будьте уважнi щодо симптомiв тромбозу, особливо якщо Ви:

- нещодавно перенесли операцiю
- тривалий час iмобiлiзованi (через хворобу, травму або гiпс на нижнiй кiнцiвцi)
- подорожуєте протягом тривалого часу (довше 4 годин)

Не забудьте повiдомити своєму лiкарю або медсестрi, що ви приймаєте КГК, якщо:

- Ви запланували або нещодавно перенесли операцiю
- Спецiалiст охорони здоров'я запитує, якi лiкарські засоби Ви наразi приймаєте

iнформацiя, зазначена в данiй iнформацiйнiй картцi, є лише коротким викладом найбiльш важливої iнформацiї щодо застережень при застосуваннi КГК. З повним текстом iнструкцiї для медичного застосування можна ознайомитись за посиланням <http://www.drlz.com.ua/>

iнформацiя щодо iнформування про побiчнi реакцiї:

Якщо Ви пiдозрюєте, що у Вас виникла побiчна реакцiя, пов'язана iз застосуванням лiкарського засобу, повiдомте про це свого лiкаря, Державний експертний центр МОЗ України, заповнивши карту–повiдомлення за посиланням <https://aisf.dec.gov.ua>,

Контактнi данi власника реєстрацiйного посвiдчення для можливостi отримання додаткової iнформацiї, повiдомлення про побiчнi реакцiї, тощо

ТОВ «Польфарма ЮА».

Адреса: 04070, м. Київ, вул. Iлiнська, 8, 11 вхiд, поверх 5.

Web: <https://www.polpharma.ua/>

Тел.: +380 44 498 90 07.

Факс: +380 44 498 93 87.

E-mail: info.ukraine@polpharma.com