

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА

<p>ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА Лікарський засіб КСЕЛЬЯНЗ (тофацитиніб)</p> <p>Ця Пам'ятка містить важливу інформацію про безпеку лікарського засобу (ЛЗ) КСЕЛЬЯНЗ.</p> <p>Якщо Ви не розумієте цієї інформації, будь ласка, попросіть свого лікаря/фармацевта пояснити її Вам. Носіть цю пам'ятку з собою та показуйте її лікарям та фармацевтам, які надають Вам допомогу. Якщо ви припинили приймати ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ, носіть цю карту з собою щонайменше 2 місяці після прийому останньої дози ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ.</p> <p>Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції для медичного застосування ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ.</p> <p>ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ слід застосовувати згідно з рекомендаціями інструкції для медичного застосування.</p> <p>Повідомте вашому лікарю про ВСІ лікарські засоби, які ви приймаєте, включаючи рецептурні та безрецептурні лікарські засоби, вітаміни та харчові добавки. Одночасне застосування ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ із деякими лікарськими засобами може підвищити ризик побічних реакцій, імуносупресії та інфекцій.</p> <p>Лікування ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ може підвищити ризик виникнення інфекцій та злоякісних новоутворень (включаючи рак легень, лімфому та немеланомний рак шкіри).</p> <table border="1" data-bbox="256 1709 857 1892"><tr><td>ПІБ пацієнта</td><td></td></tr><tr><td>ПІБ лікаря</td><td></td></tr><tr><td>Телефон лікаря</td><td></td></tr><tr><td>Дата початку прийому ЛЗ</td><td></td></tr></table>	ПІБ пацієнта		ПІБ лікаря		Телефон лікаря		Дата початку прийому ЛЗ		<p>Негайно повідомте вашому лікарю, якщо у Вас:</p> <ul style="list-style-type: none">• Під час прийому ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ виникла несподівана задишка або утруднене дихання, біль у грудях чи біль у верхній частині спини, набряк ноги або руки, біль або болючість у ногах, почервоніння чи знебарвлення шкіри ноги або руки, оскільки це можуть бути симптомами тромбу у легенях або венах;• виникли симптоми інфекції, такі як лихоманка, постійний кашель, втрата ваги або надмірна втомлюваність;• виникли будь-які симптоми оперізувального герпесу, такі як болючі висипання на шкірі або пухирі;• ви тісно контактували із хворим на туберкульоз;• виникли: сильний біль у грудях або відчуття стискання (що може поширюватися на руки, щелепу, шию і спину), задишка, холодний піт, слабке або несподіване запаморочення, оскільки це можуть бути симптоми серцевого нападу;• виникли: будь-який набряк лімфатичних вузлів шиї, під пахвами або в паху; постійне відчуття втоми; гарячка; нічна пітливість; постійний кашель або кашель, що погіршується; утруднене дихання; захриплість або хрипи; втрата ваги без очевидної причини;• ви помітили будь-яке новоутворення на шкірі або будь-які зміни наявних родимок або плям;
ПІБ пацієнта									
ПІБ лікаря									
Телефон лікаря									
Дата початку прийому ЛЗ									

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

КСЕЛЬЯНЗ	
<p>Пацієнти віком 65 років і старше можуть мати підвищений ризик інфекцій, серцевих нападів та певних типів раку. Ваш лікар може вирішити, що ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ вам не підходить.</p>	<ul style="list-style-type: none">• виникли симптоми інтерстиціальної хвороби легень, такі як задишка;• виникли ознаки і симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, такі як біль у шлунку, біль у животі, кров у випорожненнях, або будь-які зміни випорожнень, що супроводжуються лихоманкою;• жовта шкіра, нудота або блювання;• ви маєте отримати щеплення. Під час прийому ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ не слід вакцинуватися певними типами вакцин;• вагітність, або Ви плануєте вагітність;• ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ не можна застосовувати під час вагітності. Жінки з репродуктивним потенціалом (здатні до народження дітей) повинні використовувати ефективні методи контрацепції під час терапії та протягом щонайменше 4 тижнів після застосування останньої дози ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ;• жінки не повинні годувати груддю під час лікування ЛЗ КСЕЛЬЯНЗ.