

# КАРТКА-ПАМ'ЯТКА ПАЦІЄНТА

**Прадакса®**

Дабігатрану етексилат

- ТРИМАЙТЕ ЦЮ КАРТКУ ВЕСЬ ЧАС З СОБОЮ
- Необхідно зберігати лише останню версію Картки-пам'ятки



12.2025

## Шановний Пацієнте,

Ваш лікар призначив Вам лікарський засіб Прадакса® (далі ЛЗ Прадакса®), дабігатрану етексилат. Для того, щоб застосування ЛЗ Прадакса® було безпечним, будь ласка, зверніть увагу на важливу інформацію в інструкції для медичного застосування в упаковці.

Оскільки Картка-пам'ятка містить важливу інформацію, будь ласка, **тримайте її при собі весь час** для того, щоб інформувати працівників системи охорони здоров'я про застосування ЛЗ Прадакса®.



## Прадакса®: інформація для пацієнта

### Щодо призначеного Вам лікування:

- ЛЗ Прадакса® розріджує кров, чим запобігає утворенню небезпечних тромбів.
- Виконуйте вказівки лікаря під час застосування ЛЗ Прадакса®. Ніколи не пропускайте прийом чергової дози та не припиняйте застосування ЛЗ Прадакса® без консультації з Вашим лікарем, який його призначив.
- Поінформуйте Вашого лікаря, який призначив ЛЗ Прадакса®, про всі лікарські засоби, які Ви приймаєте в даний час.
- Повідомте попередньо Вашого лікаря про те, що Ви застосовуєте ЛЗ Прадакса®, якщо Вам необхідне хірургічне/ оперативне втручання.
- ЛЗ Прадакса® можна застосовувати незалежно від вживання їжі. Капсулу слід ковтати цілою, запиваючи склянкою води для полегшення потрапляння в шлунок. Не слід розламувати, жувати чи висипати гранули з капсули.

### Коли потрібно звернутись до лікаря

- Застосування ЛЗ Прадакса® може збільшувати ризик виникнення кровотечі. негайно зверніться до Вашого лікаря, який призначив ЛЗ Прадакса®, у разі появи ознак та симптомів кровотечі, а саме: набряк, дискомфорт, незвичний біль або головний біль, запаморочення, блідість, слабкість, нетипові синці, носові кровотечі, кровотечі ясен, незвичні довгі кровотечі після порізу, ненормальні менструальні виділення чи вагінальна кровотеча, кров у сечі, яка може набути рожевого або коричневого забарвлення, червоний / чорний кал, кашель з кров'ю, блювання кров'ю чи масою, що схожа на кавову гущу.
- Якщо під час лікування ЛЗ Прадакса® Ви впали чи поранили себе, особливо якщо Ви травмували голову, будь ласка, НЕГАЙНО зверніться за невідкладною медичною допомогою.
- Не припиняйте застосування ЛЗ Прадакса® без консультації з Вашим лікарем, який призначив ЛЗ Прадакса®, якщо у вас печія, нудота, блювання, дискомфорт у шлунку, здуття живота або біль у верхній частині живота.

## Прадакса®: інформація для працівників системи охорони здоров'я

- Прадакса® – пероральний антикоагулянт (прямий інгібітор тромбіну).
- У разі потреби хірургічного чи оперативного втручання необхідно завчасно припинити застосування ЛЗ Прадакса®.
- У разі значної кровотечі негайно припиніть лікування ЛЗ Прадакса®.
- Специфічний реверсивний агент (ідаруцизумаб) доступний для призначення (для більш детальної інформації див. інструкції для медичного застосування лікарських засобів Прадакса® та ідаруцизумаб).
- ЛЗ Прадакса® головним чином виводиться нирками; необхідно підтримувати відповідний діурез. ЛЗ Прадакса® піддається діалізу.

Ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Прадакса® за посиланням

<http://www.drlz.com.ua/>

### Повідомлення про випадки побічних реакцій

Для звітування про побічні реакції та з питаннями щодо якості та помилок при застосуванні лікарських засобів компанії «Берінгер Інгельхайм», що мають відношення до викладеного вище, слід звертатись за телефоном: **+380 44 494 12 75**, або моб. **+ 380 98 163 7650**, або факсом **+380 44 494 12 71**, або електронною поштою

**PV\_local\_Ukraine@boehringer-ingenlheim.com**; або через сайт компанії <https://www.boehringer-ingenlheim.com/ua/>

Питання стосовно медичної інформації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу:

**MEDUABIMedicalInformation.KBP@boehringer-ingenlheim.com**

Про побічні реакції слід також повідомити Державний експертний центр МОЗ України за посиланням:

<https://aisf.dec.gov.ua/>

Будь ласка, заповніть цей розділ або зверніться до лікаря з цим проханням.

## Інформація про пацієнта

Прізвище та ім'я пацієнта

Дата народження

Показання для призначення антикоагулянту

Доза ЛЗ Прадакса®