

Важливі контактні дані

Моє ім'я та прізвище:

Моя контактна особа для екстрених ситуацій (ім'я та номер тел.):

Ім'я та прізвище лікаря, який призначив препарат Венклікто®:

Контактний номер телефону лікаря:

Редакція 1.0 від 7 квітня 2021 року

Дана картка не є рекламним матеріалом.

abbvie

UA-VNCLY-260005. Затверджено: лютий 2026 р.



Важлива інформація **для медичних працівників** щодо безпеки препарату Венклікто® та СЛП

Цей пацієнт приймає препарат Венклікто® для лікування ХЛЛ, що може спричинити синдром лізису пухлини (СЛП) у перші 5 тижнів лікування.

- Оцініть біохімічний аналіз крові: калій, сечова кислота, фосфор, кальцій та креатинін.
- Терміново усуньте відхилення від норми біохімічних показників крові. **Якщо не лікувати, це може призвести до летального випадку.**
- При підозрі на СЛП негайно зверніться до лікуючого лікаря, зазначеного у цій картці.

Будь-ласка, ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування або зверніться до компанії «ЕббВі» за номером +380 (44) 498 08 00 для отримання детальної інформації або якщо Вам необхідні додаткові копії картки пацієнта.

Картка пацієнта

Інформація щодо безпеки препарату Венклікто® (венетоклакс) для хворих на хронічний лімфоцитарний лейкоз (ХЛЛ)

Препарат Венклікто® застосовують для лікування хворих на ХЛЛ. У цій картці міститься те, що Вам слід знати про синдром лізису пухлини та препарат Венклікто®.



- Завжди носіть цю картку з собою.
- Показуйте цю картку усім лікарям, які надають Вам медичну допомогу або якщо Ви звертаєтесь до відділення невідкладної допомоги.
- Завжди приймайте препарат Венклікто® точно за вказівками Вашого лікаря

Що я маю знати про СЛП?

Під час лікування у Вас може виникнути високий рівень деяких солей (таких як калій і сечова кислота) у крові. Це може призвести до стану під назвою синдром лізису пухлини (СЛП) протягом перших 5 тижнів лікування.

Симптоми СЛП:

- лихоманка або озноб
- нудота або блювання
- сплутаність свідомості
- відчуття задишки
- серцева аритмія
- темна або каламутна сеча
- відчуття незвичайної втоми
- біль у м'язах або суглобах
- напади або судоми
- біль у животі та здуття живота

Що мені робити при симптомах СЛП?

Якщо під час лікування у Вас виникнуть симптоми СЛП, Вам слід:

-  **Негайно зателефонувати своєму лікарю або звернутися по медичну допомогу та**
-  **Припинити застосування препарату Венклікто®**

Прочитайте інструкцію для медичного застосування лікарського засобу для отримання детальної інформації.

Як мені знизити ризик розвитку СЛП?



Пийте від **1,5 до 2 літрів води** щодня:

- починайте за 2 дні до застосування першої дози, та
- у день застосування першої дози, і
- щодня протягом перших 5 тижнів лікування.

Вживання великої кількості води допоможе знизити високий рівень солей у крові, які будуть виведені із сечею.



Приходьте на заплановані **прийоми для проведення аналізів крові**, вони допоможуть Вашому лікарю виявити СЛП.



Перед початком лікування препаратом Венклікто®, за вказівками лікаря, почніть приймати інші ліки, які запобігають підвищенню рівню солі (сечової кислоти) у крові.