

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

Калькулятор доз для лікарського засобу Парацетамол Б.Браун 10 мг/мл, розчин для інфузій

Ризик виникнення медичних помилок під час застосування лікарського засобу, які можуть призвести до випадкового передозування

Будьте обережні, призначаючи та вводячи лікарський засіб Парацетамол Б.Браун 10 мг/мл, розчин для інфузій, щоб уникнути помилок у дозуванні через плутанину між міліграмом (мг) і мілілітром (мл), що може призвести до випадкового передозування та смерті. Випишуючи рецепти, вказуйте як дозу в міліграмах, так і еквівалентний об'єм у мілілітрах. Доза та об'єм залежать від маси тіла пацієнта.

Також були зафіксовані помилки, пов'язані з випадковим передозуванням у дорослих з масою тіла ≤ 50 кг (яким необхідна доза 60 мг/кг, що не перевищує 3 г), що призвело до серйозної гепатотоксичності.

Показання

Короткочасне лікування помірною болі, особливо після операції та гарячки.
Див. також інструкцію для медичного застосування лікарського засобу (ІМЗ) Парацетамол Б.Браун 10 мг/мл, розчин для інфузій.

	Для доношених новонароджених, немовлят та дітей з масою тіла до 10 кг	Для дітей з масою тіла більше ніж 10 кг і до 33 кг	Для дітей, підлітків та дорослих з масою тіла більше ніж 33 кг і до 50 кг	Для дітей, підлітків та дорослих з масою тіла більше ніж 50 кг без додаткових факторів ризику гепатотоксичності	Для дітей, підлітків та дорослих з масою тіла більше ніж 50 кг з додатковими факторами ризику гепатотоксичності (див. ІМЗ)
Доза на одне введення	7,5 мг/кг	15 мг/кг	15 мг/кг	1000 мг	1000 мг
Об'єм на одне введення	0,75 мл/кг	1,5 мл/кг	1,5 мл/кг	100 мл	100 мл
Максимальна добова доза	30 мг/кг (еквівалентно 3 мл/кг), але не більше 300 мг	60 мг/кг (еквівалентно 6 мл/кг), але не більше 2000 мг	60 мг/кг (еквівалентно 6 мл/кг), але не більше 3000 мг	4000 мг (еквівалентно 400 мл)	3000 мг (еквівалентно 300 мл)
Флакон/ампула для внутрішньовенного введення для доз	Ампула для внутрішньовенного введення об'ємом 10 мл	Флакон для внутрішньовенного введення об'ємом 50 мл	Флакон для внутрішньовенного введення об'ємом 100 мл		

Розчин вводять шляхом 15-хвилинної внутрішньовенної інфузії. Інтервал між введенням повинен становити щонайменше 4 години. Протягом 24 годин можна вводити не більше 4 доз.

Для пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю слід враховувати інформацію, наведену в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Зазначена максимальна добова доза наведена лише для пацієнтів, які не отримують інші лікарські засоби, що містять парацетамол.

Детальнішу інформацію про приготування, розведення та проведення інфузії можна знайти в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Калькулятор доз для лікарського засобу Парацетамол Б.Браун 10 мг/мл, розчин для інфузій

Спеціальні інструкції для новонароджених, немовлят та дітей із масою тіла до 10 кг

1 мл розчину для інфузій містить 10 мг парацетамолу.

Протягом 24 годин можна вводити не більше ніж 4 дози

Доза на одне введення становить 7,5 мг/кг, що еквівалентно 0,75 мл/кг маси тіла. Необхідний об'єм може бути дуже малим. Приклади наведено в таблиці. Об'єм на одне введення ніколи не повинен перевищувати 7,5 мл. Максимальна добова доза становить 30 мг/кг (що еквівалентно 3 мл/кг).

Оригінальний флакон/ампулу для внутрішньовенного введення не слід використовувати безпосередньо для інфузії.

Об'єм, який необхідно ввести, потрібно вилучити з флакону/ампули та розвести у розчині натрію хлориду 9 мг/мл (0,9 %) або у розчині глюкози 50 мг/мл (5 %) до 1/10 (одна десята об'єму лікарського засобу Парацетамол Б.Браун 10 мг/мл в дев'яти десятих розчинника). Для вимірювання дози, що вводиться, слід використовувати шприц на 5 мл або 10 мл. Також можна використовувати шприцевий насос.

Маса тіла пацієнта	Доза на одне введення	Об'єм на одне введення
3 кг	22 мг*	2,2 мл*
4 кг	30 мг	3,0 мл
5 кг	37 мг*	3,7 мл*
6 кг	45 мг	4,5 мл
7 кг	52 мг*	5,2 мл*
8 кг	60 мг	6,0 мл
9 кг	67 мг*	6,7 мл*
10 кг	75 мг	7,5 мл

* Розраховані дози округлені до значень, зручних для практичного застосування

Навчальний матеріал погоджено Державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я України (ДЕЦ МОЗ України)

Якщо у вас є додаткові питання, звертайтеся за адресою:

Компанія ТОВ «Б.Браун Медікал Україна», 03124, м. Київ, бул. В. Гавела, 6з (БЦ «Престиж»), Тел.: +38 (044) 351-11-30.

Адреса електронної пошти: pharmacovigilance.ua@bbraun.com