

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

Червень 2026

Парацетамол-Бакстер (розчин для інфузій, 10 мг/мл по 100 мл у флаконі, по 25 флаконів у картонній коробці)

Інформаційний лист-звернення до фахівців системи охорони здоров'я щодо інструменту дозування з метою мінімізації виникнення медикаментозної помилки, що призводить до випадкового передозування через плутанину між одиницями вимірювання мг та мл

Шановні фахівці системи охорони здоров'я!

ТОВ «Бакстер Україна», на підставі довіреності від Бакстер Холдінг Бі.Ві., Нідерланди, заявника та власника реєстраційного посвідчення лікарського засобу **Парацетамол-Бакстер, розчин для інфузій, 10 мг/мл по 100 мл у флаконі, по 25 флаконів у картонній коробці** (далі - **Парацетамол-Бакстер**) та за погодженням з Державним Експертним Центром МОЗ України, хотіли б проінформувати вас про заходи з мінімізації ризику щодо безпечного застосування лікарського засобу.

Парацетамол-Бакстер показаний пацієнтам з масою тіла >33 кг (див. таблицю дозування нижче).

Маса тіла пацієнта	Одноразова доза	Об'єм на одне введення	Максимальний об'єм лікарського засобу на одне введення відповідно до верхніх меж маси тіла для групи (мл)*	Максимальна добова доза
> 33 кг до ≤ 50 кг	15 мг/кг	1,5 мл/кг	75 мл	60 мг/кг, не перевищуючи 3 г
> 50 кг, за наявності факторів ризику розвитку гепатотоксичності	1 г	100 мл	100 мл	3 г
> 50 кг, за відсутності факторів ризику розвитку гепатотоксичності	1 г	100 мл	100 мл	4 г

* Пацієнти з нижчою масою тіла потребують менших об'ємів

Існує ризик медикаментозної помилки, що може призвести до випадкового передозування внаслідок застосування **не скоригованої за масою тіла дози** дітям та дорослим з недостатньою масою тіла від >33 до ≤50 кг.

Для того, щоб мінімізувати цей ризик, було створено інструмент дозування для розрахунку дози на основі маси тіла для пацієнтів з масою тіла від >33 до 50 кг.

Цей лист та інструмент дозування призначені для фахівців системи охорони здоров'я, які можуть призначати або брати участь у відпуску та застосуванні лікарського засобу Парацетамол-Бакстер і мають бути розповсюджені серед них у відповідних лікарнях.

Ми надаємо вам інструмент дозування, описаний вище, з кожною поставкою лікарського засобу **Парацетамол-Бакстер**. Якщо вам потрібна більша кількість інструментів дозування, будь ласка, зв'яжіться з компанією «Бакстер», написавши на адресу ukraine@baxter.com, подзвонивши за телефоном +38 044 594 80 50 або факсом +38 044 594 80 51, щоб домовитися про відвантаження

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

додаткової необхідної кількості.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу на сайті: <http://www.driz.com.ua>.

Повідомлення про побічні реакції

Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340, слід повідомляти про усі підозрювані побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>. Щоб повідомити про підозрювані побічні реакції безпосередньо в компанію «Бакстер», надішліть електронного листа на адресу CE_Drug_Safety@baxter.com.

Контакти ТОВ «Бакстер Україна»

У разі виникнення запитань щодо безпеки та ефективності застосування лікарських засобів, просимо звертатись за адресою: вул. Березняківська, 29, м. Київ, 02098, або по телефону: +38 044 594 80 50, або електронною поштою: ukraine@baxter.com.