

**КАРТКА ПАЦІЄНТА,**

який застосовує лікарський засіб АЛЬТІОЗА, розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл  
по 2 мл у флаконі (тіоколікозид для системного застосування)

Тіоколікозид — діюча речовина лікарського засобу АЛЬТІОЗА, який призначений для системного застосування (розчин для внутрішньом'язових ін'єкцій), використовується у дорослих та дітей віком від 16 років як додаткова терапія болісних м'язових контрактур у випадках гострих патологій хребта.

Перед початком застосування лікарського засобу АЛЬТІОЗА слід знати наступне:

Дослідження на тваринах показали, що деякі речовини, які утворюються в організмі після застосування лікарського засобу можуть впливати на поділ клітин. Це означає, що при певних рівнях концентрації вони можуть спричинити зміни у кількості хромосом. Для людини це є фактором ризику для ненародженої дитини, для чоловічої фертильності та потенційним фактором ризику розвитку раку.

Лікарський засіб АЛЬТІОЗА НЕ СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ, якщо:

- Ви вагітні або думаєте, що можете бути вагітними.
- Ви годуєте немовля груддю.
- Ви є жінкою з репродуктивним потенціалом (яка може завагітніти) та не застосовуєте ефективних методів контрацепції під час лікування лікарським засобом та протягом 1 місяця після припинення лікування.
- Ви є чоловіком, з репродуктивним потенціалом та не застосовуєте ефективних методів контрацепції під час лікування лікарським засобом та протягом трьох місяців після припинення лікування.

**НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ РЕКОМЕНДОВАНІ ДОЗИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЛІКУВАННЯ, А САМЕ:**

- 4 мг кожні 12 годин (тобто 8 мг на день) для внутрішньом'язового введення. Лікування не повинно перевищувати 5 днів поспіль.

Представлені дані є лише коротким викладом найбільш важливої інформації щодо мінімізації ризиків, пов'язаних із застосуванням лікарського засобу. Будь ласка, ознайомтесь із інструкцією для медичного застосування перед застосуванням лікарського засобу АЛЬТІОЗА (затверджений текст інструкції доступний на сайті Державного реєстру лікарських засобів України за посиланням <http://www.drlz.com.ua/>).

*Негайно зверніться до лікаря при підозрі вашої вагітності або вагітності вашої партнерки (якщо ви чоловік) під час лікування препаратом або протягом 3 місяців після припинення застосування тіоколікозиду!*

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРЮВАНІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ**

Якщо у Вас виникли будь-які побічні реакції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не зазначених у інструкції для медичного застосування.

Ви можете повідомити про побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>

У разі виникнення побічних реакцій при застосуванні лікарського засобу АЛЬТІОЗА або з будь-яких додаткових питань звертайтеся за адресою: 11700, Житомирська обл., Звягельський р-н, місто Звягель, вул. Житомирська, будинок 38, або за тел.: +380504634681, або за електронною адресою: [vmi@novofarm.com.ua](mailto:vmi@novofarm.com.ua), або заповніть карту повідомлення: <https://novofarm.com.ua/farmakonaglyad/>

З повагою,  
Уповноважена особа,  
відповідальна за фармаконагляд

**Віта ІГНАТЮК**