
РЕЗЮМЕ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЛЯ РОЛІНОЗ КРАПЛІ ОРАЛЬНІ, РОЗЧИН, 10 МГ/МЛ (ЦЕТИРИЗИН)

Це резюме плану управління ризиками (ПУР) для лікарського засобу (ЛЗ) РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл. ПУР надає детальну інформацію щодо важливих ризиків ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл, як ці ризики можна мінімізувати та як буде відстежуватися подальша інформація щодо ризиків та невизначених даних (відсутня інформація) ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл.

Для ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл, наявна коротка характеристика препарату (КХП) та інструкція для медичного застосування, що надають медичним працівникам та пацієнтам основну інформацію як слід застосовувати ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл.

I. Лікарський засіб та його призначення

ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл, містить діючу речовину цетиризин та призначений для перорального застосування.

Лікарський засіб призначений для

- симптоматичної терапії назальних та очних симптомів сезонного та цілорічного алергічного риніту;
- симптоматичної терапії хронічної ідіопатичної кропив'янки.

II. Ризики, асоційовані з лікарським засобом та заходи з мінімізації або подальшої характеристики ризиків

Важливі ризики ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл, разом із заходами для мінімізації таких ризиків та пропонувані дослідження для подальшого вивчення ризиків ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл, представлено нижче.

Заходами з мінімізації ризиків, виявлених для лікарського засобу, можуть бути:

- спеціальна інформація, така як застереження, запобіжні заходи та поради з правильного застосування в інструкції для медичного застосування та КХП для пацієнтів та медичних працівників;
- важливі поради на упаковці лікарського засобу;
- затверджений розміру пакування – кількість лікарського засобу розраховується таким чином, щоб гарантувати правильне застосування лікарського засобу;
- умови відпуску лікарського засобу – як пацієнт може отримати лікарський засіб

(за рецептом або без рецепту).

Разом ці заходи становлять **рутинні заходи мінімізації ризиків**.

Крім цих заходів, здійснюється постійний моніторинг та аналіз інформації про побічні реакції, включаючи оцінку регулярно оновлюваних звітів з безпеки, для впровадження негайних заходів у разі необхідності.

Ці заходи становлять **рутинні заходи з фармаконагляду**.

У разі наявності невизначених даних, що можуть вплинути на безпечне застосування ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл, їх представлено нижче у «Відсутня інформація».

II.A Перелік важливих ризиків та відсутньої інформації

Важливі ризики ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл – це ризики, що потребують спеціальних заходів з управління ризиками для подальшого дослідження або мінімізації ризиків, щоб лікарський засіб можна було «призначати» та «приймати» безпечно. Важливі ризики можуть бути виявленими або потенційними. Виявлені ризики – проблеми, для яких існує достатнє підтвердження їх взаємозв'язку з застосуванням ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл. Потенційні ризики – це проблеми, для яких можливість взаємозв'язку із застосуванням цього лікарського засобу підтверджено на основі наявних даних, але остаточно ще не встановлено та потребує подальшої оцінки.

До відсутньої інформації належить інформація щодо безпеки лікарського засобу, якої наразі немає, та яку ще необхідно відстежити (наприклад, тривале застосування лікарського засобу).

Таблиця. Перелік важливих ризиків та відсутньої інформації

| | |
|------------------------------------|----------|
| Важливі виявлені ризики | Відсутні |
| Важливі потенційні ризики | Відсутні |
| Важлива відсутня інформація | Відсутні |

II.B Резюме важливих ризиків

Дані щодо безпеки, представлені в інформації про лікарський засіб, узгоджені з референтним препаратом.

II.C План післяреєстраційних досліджень ефективності

II.V.1 Дослідження, які є умовою реєстраційного посвідчення

Для ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл, не вимагається досліджень, які є умовою реєстраційного посвідчення або становлять специфічні зобов'язання.

II.V.2 Інші дослідження плану післяреєстраційних досліджень ефективності

Для ЛЗ РОЛІНОЗ краплі оральні, розчин, 10 мг/мл, не заплановано проведення післяреєстраційних досліджень ефективності.

