

### Картка пацієнта

для застосування Метотрексату «Ебеве» у вигляді таблеток 2,5 мг, 5 мг та 10 мг.

Помилки у дозуванні.

**ЦЯ КАРТКА ПАЦІЄНТА ПРИЗНАЧЕНА ТІЛЬКИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО МІСТЯТЬ МЕТОТРЕКСАТ, ЯК:**

- **Протиревматичну терапію.** Ревматоїдний артрит в активній формі у дорослих пацієнтів, яким показане лікування хворобо-модифікуючими протиревматичними препаратами (ХМПРП).
- **Лікування псоріазу.** Тяжкі та поширені форми псоріазу вульгарного, особливо бляшкового типу, у дорослих пацієнтів при неефективності традиційної терапії, наприклад, фотолікування, PUVA терапії та застосування ретиноїдів.

**ЯКЩО ВИ ЗАСТОСОВУЄТЕ МЕТОТРЕКСАТ ЗА ОДНИМ З ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ ПОКАЗАНЬ, ПРЕПАРАТ СЛІД ПРИЙМАТИ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ НА ТИЖДЕНЬ!**

Запишіть день тижня прийому препарату тут: \_\_\_\_\_

Ніколи не перевищуйте призначену дозу!

Передозування може призвести до серйозних побічних ефектів і мати летальний наслідок. Симптомами передозування є, наприклад, біль у горлі, лихоманка, виразки у роті, діарея, блювання, шкірні висипання, кровотечі або незвична слабкість. Якщо ви думаете, що випадково перевищили призначену дозу, негайно зверніться до лікаря.

Завжди показуйте цю картку медичним працівникам, які не знайомі з вашим режимом застосування метотрексату, щоб повідомити їх про необхідність приймати препарат один раз на тиждень (наприклад, у разі госпіталізації, зміни догляду).

Додаткову інформацію дивіться в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу.