

Показуйте цю картку усім медичним працівникам, які надають Вам медичну допомогу - наприклад, стоматологу чи лікарю швидкої допомоги.

▼ Цей лікарський засіб підлягає додатковому контролю. Щоб повідомити про будь-які побічні ефекти, зв'яжіться з представництвом ЕббВі Біофармасьютикалз ГмбХ в Україні: тел.: +380 (44) 498 0800 (#6151), email: ua_ppd_pv_mailbox@abbvie.com. Про побічні реакції слід також повідомити Державний експертний центр МОЗ України заповнивши повідомлення за посиланням <https://aisf.dec.gov.ua>.

Ваше прізвище та ім'я:

Прізвище та ім'я лікаря, який призначив РІНВОК®:

Номер телефону лікаря:

Дата початку лікування препаратом РІНВОК®:

Версія 1.0. Дата затвердження 17 жовтня 2019 року.
www.dec.gov.ua



abbvie

Картка-пам'ятка для пацієнта

Зберігайте цю картку постійно при собі

Інформація для пацієнтів щодо безпеки препарату РІНВОК® ▼(упадацитиніб)

- Ця картка містить важливу інформацію з безпеки, яку вам слід знати до та під час лікування препаратом РІНВОК®.
- Для отримання додаткової інформації прочитайте інструкцію для медичного застосування

Ризик інфекцій

РІНВОК® може погіршити перебіг існуючої інфекції або підвищити ймовірність зараження новою інфекцією – наприклад, туберкульозом, оперізуючим герпесом або вірусним гепатитом.

Негайно повідомте лікаря, якщо ви помітите такі ознаки інфекції, як:

- Лихоманка, пітливість, озноб, втрата ваги або тривалий кашель – це можуть бути ознаки туберкульозу
- Болючий висип на шкірі з пухирцями – це може бути ознакою оперізуючого герпесу
- Відчуття втоми або задишки – це можуть бути ознаки пневмонії.

Вакцини – використовуються для профілактики інфекцій

Під час лікування та безпосередньо перед початком лікування препаратом РІНВОК® не слід застосовувати живі вакцини (наприклад, вакцина проти грипу у формі назального спрею).

Перш ніж застосовувати будь-які вакцини, поговоріть зі своїм лікарем – він знатиме, які вакцини вам **не** слід застосовувати до або під час лікування РІНВОКом®.

Холестерин

Під час лікування РІНВОКом® ваш лікар перевірятиме у вас рівень холестерину з тим, щоб вирішити чи потрібно вам приймати ліки для зниження рівня холестерину.

Контрацепція, вагітність та грудне вигодовування

РІНВОК® не можна застосовувати під час вагітності.

- Використовуйте ефективну контрацепцію під час лікування препаратом РІНВОК® та протягом 4 тижнів після прийому останньої дози препарату. Поговоріть зі своїм лікарем щодо ефективної контрацепції.
- Негайно повідомте вашого лікаря, якщо ви хочете завагітніти або завагітніли.
- Не годуйте грудьми під час застосування РІНВОКу®.

Тромбоз глибоких вен (ТГВ) та легенева емболія (ЛЕ)

Негайно повідомте свого лікаря, якщо у вас з'явилися ознаки ТГВ або ЛЕ, такі як болючий набряк ніг або біль у грудях.